

ENCYCLOPÉDIE
METHODIQUE,
OU

PAR ORDRE DE MATIÈRES;
PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;

*Précédée d'un Vocabulaire universel , servant de Table pour tout
l'Ouvrage , ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT ,
premiers Éditeurs de l'Encyclopédie.*


ENCYCLOPEDIE MÉTHODIQUE.

HISTOIRE NATURELLE. INSECTES.

P A R M. O L I V I E R ,

Docteur en Médecine, de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Marseille, Correspondant de la Société Royale d'Agriculture de Paris.

T O M E C I N Q U I E M E.



A P A R I S ,

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins.

M. D C C. X C.

C H A R A N S O N .

C U R C U L I O . L I N . G E O F F . F A B .

C A R A C T E R E S G É N É R I Q U E S .

ANTENNES coudées : premier article long ; les trois derniers en masse ovale.

Tête plus ou moins allongée en forme de trompe.

Bouche placée à l'extrémité de la trompe , & pourvue de mandibules , de mâchoires , d'antennules & d'une lèvre inférieure.

Quatre antennules courtes , sétacées : les antérieures composées de quatre , & les postérieures de trois articles.

Quatre articles aux tarses : les deux premiers courts , triangulaires ; le troisième large , bilobé.

E S P E C E S .

* Trompe mince , allongée : cuisses simples.

1. CHARANSON géant.

Longirostre ; corcelet & élytres raboteux , nébuleux ; extrémité des antennes blanche.

2. CHARANSON colosse.

Longirostre , noirâtre ; pattes longues ; trompe tuberculée.

3. CHARANSON palmiste.

Longirostre , très - noir , velouté ; corcelet ovale , aplati ; élytres courtes , striées.

4. CHARANSON ensanglanté.

Longirostre , très-noir ; corcelet avec deux lignes ; élytres avec deux points sanguins.

5. CHARANSON longipède.

Longirostre , d'un brun noirâtre ; élytres ferrugineuses , striées ; trompe échancrée ; pattes antérieures longues , velues antérieurement.

6. CHARANSON ferrugineux.

Longirostre , brun ; corcelet lisse , taché de noir ; élytres striées.

7. CHARANSON bordé.

Longirostre , noir ; corcelet & élytres bordés de ferrugineux.

8. CHARANSON sanguinolant.

Longirostre , noir , velouté ; élytres striées , avec une bande d'un rouge sanguin à la base.

CHARANSON. (Insectes.)

9. CHARANSON fascié.

Longirostre, noir; élytres striées, avec une bande rouge, interrompue.

10. CHARANSON indien.

Longirostre, noir, corcelet presque ovale, avec des points enfoncés; élytres fillonnées, raboteuses; jambes épineuses.

11. CHARANSON villageois.

Longirostre, grisâtre, obscur sur le dos, avec quatre taches arquées, cendrées; trompe avec deux fillons.

12. CHARANSON Éléphant.

Longirostre obscur; corcelet & élytres variolés; élytres postérieurement épineuses.

13. CHARANSON morbilleux.

Longirostre, cendré; élytres avec des tubercules élevés, noirs, rangés en stries.

14. CHARANSON hémiptère.

Longirostre, d'un brun ferrugineux; élytres courtes, striées, tachées de noir.

15. CHARANSON bariolé.

Longirostre, mélangé de noir & de rougeâtre; trompe noire à l'extrémité.

16. CHARANSON noirâtre.

Longirostre, noir, glabre; corcelet ovale, déprimé; élytres presque striées, plus courtes que l'abdomen.

17. CHARANSON cafre.

Longirostre, noir; élytres striées, plus courtes que l'abdomen; jambes ciliées.

18. CHARANSON mélanocarde.

Longirostre, cendré; élytres avec une tache commune, obscure.

19. CHARANSON porte-croix.

Longirostre, noir; corcelet presque épineux, avec des lignes blanches; élytres avec une croix blanche postérieurement.

20. CHARANSON striolé.

Longirostre, noir; élytres soyeuses, striées, d'un brun noirâtre; pattes brunes.

21. CHARANSON rubétra.

Longirostre, noir, lisse, sans taches; cuisses cannelées.

22. CHARANSON du Pin.

Longirostre; élytres d'un brun ferrugineux, avec des bandes interrompues blanchâtres.

23. CHARANSON de l'Onoporde.

Longirostre, noir, avec un duvet cendré; trompe très-noire, avec un fillon court, de chaque côté de la base.

24. CHARANSON cannelé.

Longirostre, d'un brun ferrugineux, rayé de blanc; trompe noire, cannelée de chaque côté de sa base.

25. CHARANSON de la Jacée.

Longirostre, noir, couvert d'un léger duvet cendré; élytres avec un point blanc à la base.

26. CHARANSON pointillé.

Longirostre, mélangé de jaune & de noirâtre; abdomen cendré, pointillé de noir.

C H A R A N S O N. (Insectes.)

27. CHARANSON de l'Artichaut.
Longirostre, noir, couvert d'un duvet verdâtre; trompe noire, presque carenée.
28. CHARANSON colon.
Longirostre, grisâtre; corcelet avec une ligne blanche de chaque côté; élytres avec un point blanc au milieu.
29. CHARANSON bimaculé.
Longirostre, obscur; élytres avec un point cendré; trompe & pattes noires.
30. CHARANSON bimoucheté.
Longirostre, noir; élytres avec un point élevé; abdomen & pattes postérieures jaunes.
31. CHARANSON bilinéé.
Longirostre, obscur; élytres avec deux rangées de points blancs.
32. CHARANSON échiquier.
Longirostre, cendré; élytres avec cinq lignes blanches à l'extrémité, pointillées de noir.
33. CHARANSON bossu.
Longirostre, ovale, noir; élytres tuberculées, cendrées postérieurement.
34. CHARANSON de la Prêle.
Longirostre; élytres muriquées, noires, avec deux points à l'extrémité blancs.
35. CHARANSON racourci.
Longirostre, noir; corcelet un peu aplati, pointillé; élytres courtes, striées & pointillées.
36. CHARANSON mélanocéphale.
Longirostre, presque globuleux, noirâtre; tête & trompe noires.
37. CHARANSON Crapaud.
Longirostre, obscur en-dessus, blanc en-dessous; élytres avec une bande blanche.
38. CHARANSON couleur-de-poix.
Longirostre, noir, luisant; élytres avec des stries pointillées.
39. CHARANSON jayet.
Longirostre ovale, noir, luisant, sans taches; élytres avec des stries pointillées, peu marquées.
40. CHARANSON mendiant.
Longirostre, ovale, cendré, sans taches; élytres striées.
41. CHARANSON bicolor.
Longirostre, noir; corcelet & élytres fauves.
42. CHARANSON miparti.
Longirostre, noir; élytres striées, rouges.
43. CHARANSON attirostre.
Longirostre, cendré; trompe arquée, noire.
44. CHARANSON tête-bleue.
Longirostre, violet, luisant; corcelet & élytres testacés.
45. CHARANSON cuivreux.
Longirostre, bronzé obscur en-dessus, plus obscur en-dessous.

CHARANSON. (Insectes.)

46. CHARANSON du Tragia.

Longirostre, bronzé; trompe & pattes noires.

47. CHARANSON bronzé.

Longirostre, noir; élytres bronzées.

48. CHARANSON cuivirostre.

Longirostre, noir, luisant; trompe arquée; élytres striées, d'un brun noirâtre.

49. CHARANSON du Prunier.

Longirostre, noir; antennes ferrugineuses; corcelet bituberculé.

50. CHARANSON quadrituberculé.

Longirostre, corcelet noir, quadrituberculé; élytres striées, mélangées de noirâtre & de cendré.

51. CHARANSON de la Campanule.

Longirostre, noir, ovale; élytres striées, avec des lignes cendrées.

52. CHARANSON fuscirostre.

Longirostre gris, pattes fauves; trompe & base des cuisses noires.

53. CHARANSON du Roure.

Longirostre; trompe & corcelet fauves; élytres violettes.

54. CHARANSON cupirostre.

Longirostre, oblong; d'un vert bronzé, brillant; élytres striées; trompe cuivreuse.

55. CHARANSON nigrirostre.

Longirostre, vert; trompe très-noire.

56. CHARANSON variable.

Longirostre, testacé pâle; corcelet avec trois lignes vertes; extrémité de la trompe noirâtre.

57. CHARANSON rufirostre.

Longirostre, noir; moitié de la trompe & pattes fauves.

58. CHARANSON picirostre.

Longirostre, oblong, noir; couvert d'un duvet argenté; moitié de la trompe & pattes brunes.

59. CHARANSON de la Salicaire.

Longirostre, noir; base des antennes, disque des élytres & pattes testacés, pâles.

60. CHARANSON péricarpe.

Longirostre, presque globuleux, nébuleux; élytres avec une tache blanche, en cœur.

61. CHARANSON du Sisymbrium.

Longirostre, mélangé de blanc & d'obscur; élytres avec un point élevé à la base; trompe noire.

62. CHARANSON caprier.

Longirostre, noir; élytres avec deux bandes courtes, ondules, blanches.

63. CHARANSON Grenouille.

Longirostre; corcelet obscur, avec le bord testacé; élytres testacées, avec trois bandes ondules, cendrées.

CHARANSON. (Insectes.)

64. CHARANSON du Velar.
Longirostre, noir; corcelet bituberculé, verdâtre; élytres bleues.
65. CHARANSON quadrimaculé.
Longirostre, noirâtre; élytres avec quatre taches blanches.
66. CHARANSON bifascié.
Longirostre noir; élytres avec deux bandes cendrées: celle de la base, plus grande, ondulée.
67. CHARANSON unifascié.
Longirostre, obscur en-dessus; élytres avec une large bande cendrée au milieu.
68. CHARANSON du Lythrum.
Longirostre, très-noir; élytres avec une bande blanche, courte au milieu, & un point blanc à l'extrémité; pattes jaunes.
69. CHARANSON acridule.
Longirostre brun; abdomen ovale.
70. CHARANSON dorsal.
Longirostre; élytres striées, rouges, avec suture noire.
71. CHARANSON du Chêne.
Longirostre, cendré; dos du corcelet obscur; élytres testacées, avec des bandes ondulées, cendrées.
72. CHARANSON sutural.
Longirostre, ovale, obscur en-dessus, avec une ligne longitudinale blanche.
73. CHARANSON en-croix.
Longirostre, noir; corcelet avec deux points à la base; élytres avec la suture & quelques points blancs.
74. CHARANSON exclamation.
Longirostre, noir; élytres avec un point & une ligne longitudinale vers l'extrémité, blancs.
75. CHARANSON gracieux.
Longirostre, obscur; corcelet & élytres rayés de blanc; pattes testacées.
76. CHARANSON du Plantain.
Longirostre; élytres cendrées, avec une tache obscure cendrée au milieu.
77. CHARANSON de l'Oseille.
Longirostre, gris, taché de noir; antennes obscures.
78. CHARANSON du Blé.
Longirostre, allongé, brun; corcelet pointillé, de la longueur des élytres.
79. CHARANSON du Riz.
Longirostre, oblong, d'un brun noirâtre; élytres avec quatre taches ferrugineuses.
80. CHARANSON anal.
Longirostre, oblong, noir; élytres striées, ferrugineuses à l'extrémité.
81. CHARANSON bituberculé.
Longirostre ferrugineux; corcelet de la longueur des élytres, avec deux petits points élevés.

CHARANSON. (Insectes.)

82. CHARANSON paraplectique.

Longirostre, cylindrique, cendré; élytres mucronées.

83. CHARANSON Serpent.

Longirostre, cylindrique, blanchâtre, rayé de noir; élytres mucronées.

84. CHARANSON huit-lignes.

Longirostre, noir; élytres mucronées, avec quatre lignes longitudinales blanches.

85. CHARANSON sémiponctué.

Longirostre, cylindrique, noirâtre; corcelet avec des lignes, élytres avec des points blancs.

86. CHARANSON des Ombelles.

Longirostre; corcelet noir, rayé de gris; élytres grises, mucronées.

87. CHARANSON filiforme.

Longirostre, cylindrique, cendré; corcelet avec trois lignes obscures.

88. CHARANSON cylindrique.

Longirostre, cylindrique, noirâtre en-dessus; élytres pointues, avec une bande cendrée.

89. CHARANSON noté.

Longirostre; corcelet obscur avec quatre points blancs; élytres obscures, avec deux lignes testacées.

90. CHARANSON mucroné.

Longirostre, cylindrique obscur; corcelet avec trois lignes cendrées; élytres mucronés.

91. CHARANSON barbiostre.

Longirostre, noir; trompe velue; jambes antérieures tridentées.

92. CHARANSON rétréci.

Longirostre, cylindrique, noir, couvert d'un léger duvet cendré; élytres obtuses, pointillées.

93. CHARANSON de la Bardane.

Longirostre, cylindrique, couvert d'un duvet gris; pattes antérieures allongées.

94. CHARANSON d'Ascanius.

Longirostre, cylindrique, noirâtre; côtés du corcelet & des élytres d'un blanc azuré.

95. CHARANSON linéole.

Longirostre, cylindrique, noir; élytres avec une raie testacée.

96. CHARANSON linéaire.

Longirostre, allongé, noir; antennes & pattes brunes; trompe amincie à la base.

97. CHARANSON crassipède.

Longirostre, noir, sans taches; cuisses antérieures un peu renflées.

98. CHARANSON de l'Atriplex.

Longirostre, allongé, noir; corcelet luisant; élytres striées, obtuses.

99. CHARANSON Algérien.

Longirostre, presque cylindrique, obscur, couvert de petits points élevés.

CHARANSON. (Insectes.)

100. CHARANSON quadripustulé.

Longirostre, noir; cuisses simples; élytres avec deux taches ferrugineuses.

101. CHARANSON marron.

Longirostre, oblong, noir en-dessous, marron en-dessus; élytres avec une petite gibbosité & des stries pointillées.

102. CHARANSON bai.

Longirostre, noir; pattes brunes.

103. CHARANSON scabre.

Longirostre, cendré; pattes fauves; élytres raboteuses.

104. CHARANSON T blanc.

Longirostre, noir; côtés de l'abdomen & extrémité blancs.

105. CHARANSON ruficolle.

Longirostre ferrugineux; élytres & base de la tête d'un noir bleuâtre.

106. CHARANSON du Lychnis.

Longirostre presque arrondi, cendré; corcelet & élytres d'un vert cendré.

107. CHARANSON uniponctué.

Longirostre, cendré; élytres avec une tache noire; jambes jaunâtres.

108. CHARANSON cinq-taches.

Longirostre gris; élytres avec cinq taches blanches.

109. CHARANSON de l'Ajonc.

Longirostre, cendré; abdomen ovale, antennes, tarses, jambes & cuisses antérieures fauves.

110. CHARANSON cendré.

Longirostre, cendré; corcelet & élytres avec des lignes longitudinales plus claires.

111. CHARANSON marbré.

Longirostre, noir; élytres testacées, avec des bandes obliques, obscures.

112. CHARANSON spinifère.

Longirostre, obscur; corcelet & élytres muriquées.

113. CHARANSON denticulé.

Longirostre noir; écusson blanchâtre; élytres avec des stries dentelées.

114. CHARANSON Souris.

Longirostre, couvert d'un duvet cendré; écusson blanchâtre.

115. CHARANSON floral.

Longirostre, noir en-dessus, cendré en-dessous; élytres striées.

116. CHARANSON bandé.

Longirostre, globuleux, fauve; élytres avec trois bandes blanches.

117. CHARANSON transversal.

Longirostre globuleux, noir, élytres striées, avec une bande blanche.

CHARANSON. (Insectes.)

118. CHARANSON pygmée.

Longirostre, presque arrondi, noir; corcelet épineux de chaque côté, avec trois lignes longitudinales blanches.

119. CHARANSON large.

Longirostre, noir, déprimé, couvert d'une poussière jaunâtre; corcelet granulé.

120. CHARANSON cyanocéphale.

Longirostre, noir, velu; tête bleue; corcelet rouge; élytres d'un brun marron.

121. CHARANSON strié.

Longirostre couvert d'un duvet cendré; corcelet rayé de blanc; élytres rayées de noir.

122. CHARANSON gris-blanc.

Longirostre, presque globuleux, couvert d'un duvet grisâtre; élytres courtes.

123. CHARANSON porte-croix.

Longirostre, très-noir; base des antennes & tarses obscurs; élytres striées, courtes, tachées de blanc.

124. CHARANSON Alouete.

Longirostre, cendré, presque globuleux; corcelet & élytres, avec des taches transversales noires.

125. CHARANSON urticaire.

Longirostre, obscur, avec des bandes velues, blanchâtres, ondées; pattes fauves.

126. CHARANSON point-blanc.

Longirostre, très-noir en-dessus, avec les

côtés & le dessous jaunâtres; antennes fauves, point-blanc au milieu de la future.

*** Trompe mince, allongée. Cuisses dentées.*

127. CHARANSON bident.

Longirostre; cuisses postérieures dentées, noir; élytres avec une épine élevée.

128. CHARANSON jamaïquois.

Longirostre, obscur, raboteux; corcelet avec un tubercule fasciculé de chaque côté élytres striées.

129. CHARANSON miliaire.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; corcelet & élytres, couverts de tubercules arrondis, noirs, luisans.

130. CHARANSON cyanicolle.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet bleu, latéralement raboteux; élytres raboteuses, striées.

131. CHARANSON valide.

Longirostre, cuisses & les quatre jambes antérieures dentées; corcelet & élytres raboteux.

132. CHARANSON couronné.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet arrondi, muni antérieurement de plusieurs épines arquées.

133. CHARANSON Taureau.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet & élytres, avec des tubercules élevés; trompe avec deux cornes arquées.

CHARANSON. (Insecte.)

134. CHARANSON cornu.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet arrondi, tuberculé; trompe avec une corne droite de chaque côté.

135. CHARANSON moisi.

Longirostre, cuisses antérieures & intermédiaires, dentées; élytres bossues vers l'extrémité, & couvertes d'une poussière jaunâtre.

136. CHARANSON page.

Longirostre; cuisses intermédiaires & postérieures dentées; élytres noires, avec une ligne sinuée, grisâtre.

137. CHARANSON spinipède.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet avec deux lignes, élytres avec quatre petites bandes blanches; jambes antérieures épineuses.

138. CHARANSON bombine.

Longirostre, cuisses dentées, d'un brun ferrugineux; élytres striées, avec des tubercules élevés noirs.

139. CHARANSON vaginal.

Longirostre, cuisses dentées; élytres striées, tuberculées: tubercules épineux vers l'extrémité.

140. CHARANSON variéux.

Longirostre; cuisses dentées, noir, cendré en-dessus; élytres mucronées, avec des stries pointillées & un tubercule arrondi.

141. CHARANSON Scorpion.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet

plat, cendré à la base; élytres cendrées au milieu, avec des tubercules presque épineux.

142. CHARANSON raboteux.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet lisse, carené; élytres mucronées, striées, tuberculées.

143. CHARANSON moucheté.

Longirostre, cuisses presque dentées, noir; corcelet lisse, avec deux taches postérieures, jaunâtres; élytres tuberculées, avec des taches jaunes.

144. CHARANSON fasciculé.

Longirostre, cuisses dentées, noir; élytres raboteuses, couvertes de faisceaux de poils; pattes mélangées de noir & de cendré.

145. CHARANSON fix-taches.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet arrondi & raboteux; élytres avec des stries pointillées & six taches fauves.

146. CHARANSON mutiqué.

Longirostre, cuisses dentées, d'un noir cendré; élytres striées, verruqueuses.

147. CHARANSON histrix.

Longirostre, cuisses dentées, noir; élytres avec des stries crénelées & quatre taches d'un gris jaunâtre.

148. CHARANSON trifascié.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet avec une ligne latérale blanche; élytres avec d.s. points blancs & deux taches brunes.

149. CHARANSON urbain.

Longirostre, cuisses dentées, d'un vert

CHARANSON. (Insectes.)

foncé; bords latéraux du corcelet & des élytres jaunes.

150. CHARANSON cylindrirostre.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet raboteux; élytres avec deux tubercules postérieurs.

151. CHARANSON stigmaté.

Longirostre, cuisses dentées, cendré; élytres avec une tache grande, latérale, ferrugineuse.

152. CHARANSON hébété.

Longirostre, cuisses légèrement dentées; corcelet raboteux; élytres sillonnées, tuberculées; bouche barbue.

153. CHARANSON dentipède.

Longirostre, cuisses & jambes antérieures dentées, couvert d'un duvet blanchâtre; élytres striées, noires, avec deux raies rapprochées blanches.

154. CHARANSON annulé.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet & élytres avec des bandes linéaires, noires.

155. CHARANSON à-zones.

Longirostre, cuisses dentées, noir, luisant; corcelet avec une grande tache de chaque côté; élytres avec trois bandes blanchâtres.

156. CHARANSON caligineux.

Longirostre, cuisses dentées, oblong; élytres avec des stries pointillées, rapprochées.

157. CHARANSON douteux.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet lisse; élytres striées, raboteuses.

158. CHARANSON pulvéruent.

Longirostre, cuisses légèrement dentées, oblong, mélangé d'obscur & de cendré; élytres avec des stries pointillées.

159. CHARANSON parfumé.

Longirostre, cuisses dentées, parfumé de points fauves; pattes antérieures allongées.

160. CHARANSON lanipède.

Longirostre, cuisses dentées, noir; élytres avec des stries crénelées; pattes antérieures longues, velues à l'extrémité.

161. CHARANSON Panthère.

Longirostre, cuisses dentées, brun; trompe noirâtre; corcelet & élytres avec des points & des taches jaunâtres.

162. CHARANSON brun.

Longirostre, cuisses dentées, d'un brun ferrugineux; trompe noirâtre; élytres avec des stries pointillées.

163. CHARANSON Hibou.

Longirostre, cuisses dentées, noirâtre; élytres parfumées d'une poussière fauve; abdomen coupé, avec deux grandes taches oculées, atrés.

164. CHARANSON du Sapin.

Longirostre, cuisses dentées; élytres noirâtres, avec des bandes linéaires, interrompues, grisâtres.

165. CHARANSON réticulé.

Longirostre, cuisses dentées, oblong, d'un brun noirâtre; élytres réticulées, avec des

CHARANSON (Insectes.)

bandes obliques pâles; jambes antérieures épineuses.

166. CHARANSON chinois.

Longirostre, cuisses dentées, noir, raboteux; corcelet, base & extrémité des élytres, tachés de ferrugineux & de cendré.

167. CHARANSON CONVEXE.

Longirostre, cuisses dentées, noir, élevé; élytres avec des points enfoncés & une bande linéaire postérieure, interrompue, grisé.

168. CHARANSON latéral.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet & élytres un peu raboteux, cendrés, obscurs; élytres avec une tache latérale noire.

169. CHARANSON multi-moucheté.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet & élytres avec des points jaunes.

170. CHARANSON pupillaire.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; corcelet & élytres tuberculés; élytres avec une tache latérale cendrée, marquée d'un point noir.

171. CHARANSON de la Patience.

Longirostre, cuisses bidentées, mélangé de noir & de blanc; corcelet & élytres muriqués.

172. CHARANSON irroté.

Longirostre, cuisses dentées, blanc en-dessous, obscur & tacheté de blanc en-dessus; cuisses avec un anneau obscur.

173. CHARANSON six-moucheté.

Longirostre, cuisses dentées, noir; élytres avec trois taches blanches sur chaque.

174. CHARANSON luride.

Longirostre, cuisses dentées, ovale, d'un noir obscur; élytres avec des stries pointillées.

175. CHARANSON stolide.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; jambes postérieures arquées, dentées.

176. CHARANSON frigide.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; élytres striées, presque tuberculées, mélangées de ferrugineux.

177. CHARANSON méditatif.

Longirostre, cuisses dentées; élytres striées, très-pointues à leur extrémité.

178. CHARANSON stupide.

Longirostre, cuisses dentées, noir; côtés du corcelet arrondis; élytres presque épineuses.

179. CHARANSON du Manglier.

Longirostre, cuisses dentées, grisâtre; corcelet avec une ligne & deux points blancs.

180. CHARANSON solâtre.

Longirostre, cuisses dentées, grisâtre; élytres avec une tache commune, en croissant, cendrée; trompe très-noire.

181. CHARANSON oculé.

Longirostre, cuisses dentées, noir; élytres avec une tache oculée, atri, veloutée.

182. CHARANSON squalide.

Longirostre, cuisses dentées, couvertes d'un duvet grisâtre; trompe testacée.

CHARANSON. (Insectes.)

183. CHARANSON germain.

Longirostre, cuisses dentées, noir, luisant; corcelet avec deux points testacés de chaque côté.

184. CHARANSON charbonier.

Longirostre, cuisses dentées, oblong, noir; élytres striées.

185. CHARANSON de la Scrophulaire.

Longirostre, presque globuleux; élytres avec deux taches dorsales noires.

186. CHARANSON du Verbascum.

Longirostre, cuisses dentées, noir; côtés du corcelet jaunâtres; élytres avec des rangées de points alternes blancs & noirs.

187. CHARANSON grave.

Longirostre, cuisses dentées, noir; élytres mélangées de ferrugineux; cuisses canelées.

188. CHARANSON cinq-points.

Longirostre, cuisses dentées; élytres avec la suture & deux taches blanches sur chaque.

189. CHARANSON gouttelette.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet tuberculé, noir; élytres striées, avec un point blanc postérieur.

190. CHARANSON didyme.

Longirostre, cuisses dentées, noirâtre en-dessus; élytres striées, avec une tache latérale, transversale, blanche.

191. CHARANSON hémorrhoidal.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet obscur, avec les côtés cendrés; élytres avec la suture postérieurement & l'extrémité ferrugineuses.

192. CHARANSON trimaculé.

Longirostre, cuisses dentées; élytres noires, avec trois taches cendrées, la postérieure commune en croissant.

193. CHARANSON petite-ligne.

Longirostre, cuisses dentées, mélangé de noir & de blanc; trompe très-noire.

194. CHARANSON velu.

Longirostre, cuisses dentées, velu, griffâtre; écusson & bande postérieure sur les élytres, blancs.

195. CHARANSON du Beccabunga.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; élytres rougeâtres, avec le bord & l'anus obscurs.

196. CHARANSON troglodite.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; corcelet avec une ligne dorsale cendrée; élytres & pattes testacées.

197. CHARANSON très-atre.

Longirostre, cuisses dentées, atre; élytres luisantes, avec des stries pointillées.

198. CHARANSON du Cerisier.

Longirostre, cuisses dentées, très-noir,

CHARANSON. (Insectes.)

oblong; corcelet avec une épine avancée, de chaque côté.

199. CHARANSON violet.

Longirostre, cuisses dentées, violet; trompe noire, de la longueur du corcelet.

200. CHARANSON varié.

Longirostre, cuisses dentées, d'un brun ferrugineux, parsemé de points cendrés; trompe & pattes ferrugineuses; cuisses avec une tache noire.

201. CHARANSON des Noisettes.

Longirostre, cuisses dentées, d'un gris fauve; trompe presque de la longueur du corps.

202. CHARANSON phalangiste.

Longirostre, cuisses dentées, ferrugineux, pubescent; pattes antérieures longues.

203. CHARANSON naillard.

Longirostre, cuisses dentées; élytres cendrées, fauves à l'extrémité; trompe brune, de la longueur du corps.

204. CHARANSON longue-trompe.

Longirostre, cuisses dentées, grisâtre; trompe mince, plus longue que le corps.

205. CHARANSON trompette.

Longirostre, cuisses dentées, marron; élytres striées; trompe mince, deux fois plus longue que le corps.

206. CHARANSON agréable.

Longirostre, cuisses dentées, noir; corcelet avec deux, élytres avec cinq points blancs.

207. CHARANSON des Cerifes.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; écusson & bande sur les élytres peu marqués, cendrés.

208. CHARANSON bicolore.

Longirostre, cuisses fortement dentées; tête bidentée.

209. CHARANSON tenuirostre.

Longirostre, cuisses dentées, noir; élytres avec des bandes peu marquées, blanches; antennes fauves.

210. CHARANSON des Baies.

Longirostre, cuisses dentées; trompe rouge, élytres testacées, avec des bandes peu marquées.

211. CHARANSON du Frêne.

Longirostre, cuisses dentées, ferrugineuses, obscur; tête & dos noirs.

212. CHARANSON déprimé.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet déprimé, avec les côtés presque anguleux.

213. CHARANSON des Vergers.

Longirostre, cuisses antérieures dentées; corps d'un gris cendré, nébuleux.

CHARANSON. (Insectes.)

214. CHARANSON rouleur.

Longirostre, cuisses dentées; corps testacé; poitrine noirâtre.

215. CHARANSON du Tremble.

Longirostre, cuisses dentées, noirâtre; élytres striées, couvertes de poils grisâtres.

216. CHARANSON tubané.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet noir, avec les bords antérieurs & postérieurs fauves; élytres pâles, tachetées de noir.

217. CHARANSON allongé.

Longirostre, cuisses dentées; corcelet allongé; jambes antérieures bidentées.

218. CHARANSON de l'Orme.

Longirostre, cuisses dentées, d'un brun fauve; trompe noire; élytres avec une tache noirâtre.

219. CHARANSON de Forster.

Longirostre, cuisses dentées, pattes antérieures longues; corps brun, couvert d'un duvet cendré.

220. CHARANSON hispide.

Longirostre, cuisses dentées; élytres filonnées, couvertes de poils hérissés.

221. CHARANSON pédiculaire.

Longirostre, cuisses dentées; corps rougeâtre; élytres avec des bandes blanches peu marquées.

222. CHARANSON poudreux.

Longirostre, cuisses dentées; élytres applaties, courtes; abdomen & bord des élytres, couverts d'une poussière cendrée.

223. CHARANSON écussonné.

Longirostre, cuisses dentées, obscur; écusson blanc; élytres avec une tache fauve.

224. CHARANSON vierge.

Longirostre, cuisses dentées, oblong, obscur, couvert d'un duvet grisâtre.

225. CHARANSON du Chardon.

Longirostre, cuisses dentées, cendré obscur; corcelet tuberculé; écusson, ligne sur les élytres, & points jaunes.

*** *Trompe allongée; cuisses postérieures renflées.*

226. CHARANSON de l'Aulne.

Longirostre, cuisses renflées; élytres testacées, avec deux taches obscures.

227. CHARANSON poiléux.

Longirostre, cuisses renflées, noir, mélangé de cendré.

228. CHARANSON éperonné.

Longirostre, cuisses renflées, unidentées, noir; antennes & tarsi testacés.

229. CHARANSON du Saule.

Longirostre, cuisses dentées; élytres noires, avec deux bandes blanches.

CHARANSON. (Insectes.)

230. CHARANSON de l'Osier.

Longirostre, cuisses renflées ; corps testacé, sans taches.

231. CHARANSON de l'Yeuse.

Longirostre, cuisses renflées, noirâtre ; élytres striées, mélangées de cendré.

232. CHARANSON iöta.

Longirostre, cuisses renflées, noir ; élytres striées, suture blanche à la base.

233. CHARANSON du Hêtre.

Longirostre, cuisses renflées, corps noir ; cuisses pâles.

234. CHARANSON céréal.

Longirostre, cuisses renflées, corps brun ; élytres oblongues.

*** *Trompe courte ; cuisses simples.*

235. CHARANSON fastueux.

Brévirostre, d'un vert foncé ; élytres avec des points enfoncés brillans, en stries, & des taches dorées.

236. CHARANSON impérial.

Brévirostre, d'un vert noirâtre ; élytres avec des stries élevées & des points enfoncés, en stries, d'un vert doré.

237. CHARANSON noble.

Brévirostre, d'un vert doré ; élytres avec des stries élevées, crénelées, d'un vert noirâtre.

238. CHARANSON somptueux.

Brévirostre ; élytres grisâtres, avec beaucoup de points élevés, d'un noir verdâtre.

239. CHARANSON chrysis.

Brévirostre, blanchâtre ; élytres avec deux bandes & quatre points dorés.

240. CHARANSON argyrien.

Brévirostre, corps d'un vert argenté, avec des taches dorées.

241. CHARANSON royal.

Brévirostre, corps d'un vert brillant ; élytres avec des bandes onnées, d'un rouge doré.

242. CHARANSON marginé.

Brévirostre, obscur ; suture des élytres & bords de l'abdomen d'un vert doré.

243. CHARANSON dix-neuf-points.

Brévirostre, d'un blanc azuré ; corcelet avec quatre, élytres avec dix neuf points noirs.

244. CHARANSON seize-points.

Brévirostre, bleuâtre ; corcelet avec quatre, élytres avec douze points noirs.

245. CHARANSON décoré.

Brévirostre, obscur en-dessus ; corcelet & élytres avec deux raies d'un vert doré.

246. CHARANSON nitidule.

Brévirostre, entièrement couvert d'écaillés

CHARANSON. (Insectes.)

vertes dorées; élytres avec des stries pointillées.

247. CHARANSON candide.

Brévirostre; élytres presque épineuses, blanches, avec une tache latérale, obscure.

248. CHARANSON blanc-de-neige.

Brévirostre; trompe & dos du corcelet obscurs; élytres presque épineuses & terminées en pointe.

249. CHARANSON blanc-de-lait.

Brévirostre, blanc, avec un reflet doré; élytres filonnées, terminées en pointe.

250. CHARANSON émeraude.

Brévirostre verdâtre; élytres pointillées, avec une épine antérieure & postérieure, élevée, forte.

251. CHARANSON octotuberculé.

Brévirostre, mélangé de cendré & d'obscur; élytres pointillées, avec huit tubercules & une gibbosité postérieure.

252. CHARANSON précieux.

Brévirostre; corps jaune verdâtre, brillant; élytres avec quelques épines.

253. CHARANSON serf.

Brévirostre, tête & corcelet d'un brun ferrugineux; élytres obscures, avec des taches blanches.

254. CHARANSON modeste.

Brévirostre, cendré; corcelet & élytres avec des taches obscures.

255. CHARANSON jaunâtre.

Brévirostre, obscur; côtés du corcelet & des élytres jaunes; extrémité des élytres pointue.

256. CHARANSON vert.

Brévirostre, verdâtre; côtés du corcelet & des élytres jaunes.

257. CHARANSON porte-bosse.

Brévirostre, d'un blanc verdâtre; élytres unidentées à leur base, bossues vers leur extrémité.

258. CHARANSON fauve.

Brévirostre, fauve, base de la tête & pattes obscures; trompe échancrée.

259. CHARANSON mantelé.

Brévirostre, obscur; bord du corcelet & des élytres cendré.

260. CHARANSON aurifère.

Brévirostre; corps ferrugineux, avec des lignes & des taches d'un vert doré.

261. CHARANSON cyanipède.

Brévirostre, blanc; élytres avec uneraie élevée, dentée, bleuâtre; pattes bleues.

262. CHARANSON du Tamaris.

Brévirostre, d'un vert brillant; élytres mélangées de vert, de ferrugineux, de noirâtre & de cendré.

CHARANSON. (Insectes.)

263. CHARANSON splendidule.

Brévirostre, d'un vert brillant ; disque des élytres d'un gris cuivreux, avec une bande noire.

264. CHARANSON curvipède.

Brévirostre noirâtre, couvert de quelques écailles argentées ; jambes postérieures arquées, dentées & ciliées.

265. CHARANSON nébuleux.

Brévirostre, oblong, grisâtre ; élytres avec des bandes obliques noires.

266. CHARANSON fulcirostre.

Brévirostre, oblong, cendré, un peu nébuleux ; trompe sillonnée.

267. CHARANSON tigré.

Brévirostre, cendré ; élytres avec quatre bandes courtes, blanches ; trompe tricarénée.

268. CHARANSON plissé.

Brévirostre, cendré ; corcelet avec des rides longitudinales ; élytres avec deux bandes ondulées, cendrées, peu marquées.

269. CHARANSON échancré.

Brévirostre, oblong, obscur ; dos des élytres cendré, avec deux lignes de points noirs enfoncés.

270. CHARANSON perlé.

Brévirostre, noir ; abdomen blanc, avec des points élevés glabres, noirs ; trompe sillonnée.

271. CHARANSON glauque.

Brévirostre ; corcelet inégal, obscur ; élytres glauques, avec un point postérieur, élevé ; trompe carénée.

272. CHARANSON blanchâtre.

Brévirostre, oblong, obscur ; élytres blanchâtres, avec une bande au milieu, une petite ligne à la base & à l'extrémité, obscures.

273. CHARANSON portugais.

Brévirostre, oblong, obscur en-dessus ; élytres avec une tache obscure à la base & les bords latéraux blanchâtres.

274. CHARANSON crénelé.

Brévirostre, cendré ; élytres avec trois lignes élevées, crénelées, noires.

275. CHARANSON ponctulé.

Brévirostre, noir ; élytres avec des points noirs, blancs, soyeux, alternes, rangés en stries.

276. CHARANSON caréné.

Brévirostre, obscur ; corcelet caréné ; élytres avec des lignes élevées, un peu tuberculées.

277. CHARANSON à-côtes.

Brévirostre, cendré ; corcelet noir, avec quatre lignes longitudinales cendrées.

278. CHARANSON barbaresque.

Brévirostre, obscur, couvert d'une poussière ferrugineuse ; yeux noirs, entourés d'un cercle blanc.

CHARANSON. (Insectes.)

279. CHARANSON ophthalmique.

Brévirostre, d'un gris obscur; élytres avec six points gris.

280. CHARANSON tabide.

Brévirostre, obscur, parsemé de ferrugineux; corcelet avec deux lignes, élytres avec le bord & deux points cendrés.

281. CHARANSON grammique.

Brévirostre, obscur; corcelet avec une ligne de chaque côté, élytres avec un point à la base, cendrés.

282. CHARANSON de Bonsdorff.

Brévirostre, blanchâtre; corcelet avec le dos, élytres avec trois taches transversales, noirs.

283. CHARANSON interrompu.

Brévirostre, obscur; élytres avec une bande interrompue blanche.

284. CHARANSON scutellaire.

Brévirostre, noir; élytres avec des stries crénelées; pattes antérieures allongées.

285. CHARANSON longimane.

Brévirostre, obscur; corcelet avec le bord & deux points ferrugineux; pattes antérieures allongées.

286. CHARANSON rauque.

Brévirostre, noirâtre; élytres grises, avec des points cendrés.

287. CHARANSON cotoneux.

Brévirostre, obscur; corcelet avec une tache latérale blanche; élytres tuberculées blanches, avec une tache obscure de chaque côté.

288. CHARANSON porte-épine.

Brévirostre, cendré, parsemé de points obscurs; corcelet avec une épine aiguë de chaque côté.

289. CHARANSON du Polygonum.

Brévirostre, cendré; corcelet rayé de blanc; suture des élytres blanche, avec des points noirs.

290. CHARANSON gris.

Brévirostre, d'un gris obscur en-dessus, cendré en-dessous; trompe cannelée.

291. CHARANSON trimoucheté.

Brévirostre, noirâtre; élytres grises, avec deux taches blanches, la postérieure plus grande & commune.

292. CHARANSON géminé.

Brévirostre cendré; corcelet rayé; élytres avec des stries nombreuses, obscures, disposées par paires.

293. CHARANSON diadème.

Brévirostre, couvert d'un duvet jaune; trompe coupée, noire à l'extrémité.

294. CHARANSON du Coudrier.

Brévirostre, mélangé de cendré & d'obscur; suture noire, de la base au milieu.

CHARANSON. (Insectes.)

295. CHARANSON linéé.

Brévirostre, gris; corcelet avec trois lignes longitudinales pâles.

296. CHARANSON lunulé.

Brévirostre; élytres avec des stries élevées; une bande semi-circulaire, une tache postérieure blanche, & une autre en croissant, noire.

297. CHARANSON fulvipède.

Brévirostre; couvert d'un duvet verdâtre; pattes testacées.

298. CHARANSON ruficolle.

Brévirostre, testacé; tête & élytres striées, d'un gris obscur.

299. CHARANSON ondé.

Brévirostre, obscur; extrémité des élytres pâle, avec une ligne transversale ondé, obscure.

300. CHARANSON hispidule.

Brévirostre, obscur; corcelet avec des raies cendrées; élytres hérissées, avec des rangées de points obscurs.

301. CHARANSON scabricule.

Brévirostre cendré; élytres presque globuleuses, hérissées.

302. CHARANSON cervine.

Brévirostre, grisâtre; base des antennes fauve.

303. CHARANSON hérissé.

Brévirostre, ferrugineux, abdomen globuleux; élytres avec des poils roides, hérissés.

304. CHARANSON strié.

Brévirostre, obscur; élytres avec des stries cendrées, pointillées de noir.

305. CHARANSON Lézard.

Brévirostre, grisâtre; élytres striées; extrémité des antennes noire.

306. CHARANSON écailleux.

Brévirostre, grisâtre; élytres avec des stries pointillées.

307. CHARANSON sombre.

Brévirostre, mélangé d'obscur & de cendré; élytres avec des stries pointillées.

308. CHARANSON agile.

Brévirostre, velu, noir; élytres avec le bord, un point à la base, une bande interrompue & un point à l'extrémité, blancs.

309. CHARANSON ruficorne.

Brévirostre, noir; antennes rouges; corcelet avec deux tubercules de chaque côté.

310. CHARANSON chloropède.

Brévirostre, noir; antennes & pattes fauves.

311. CHARANSON aitre.

Brévirostre, oblong, très-noir; antennes fauves.

C H A R A N S O N. (Insectes.)

312. CHARANSON triste.

Brévirostre, noir; élytres cendrées, striées.

313. CHARANSON saupoudré.

Brévirostre, très-noir; élytres tachetées de blanc postérieurement.

314. CHARANSON ponctué.

Brévirostre, obscur; élytres avec des points soyeux, élevés, noirs, & le bord latéral, jaune.

315. CHARANSON obscur.

Brévirostre, ovale, d'un brun ferrugineux, sans taches.

316. CHARANSON noir.

Brevirostre, ovale, raboteux, noir; pattes fauves.

317. CHARANSON variolé.

Brévirostre, noir; corcelet carené, variolé; élytres striées.

318. CHARANSON stictique.

Brévirostre; corcelet & élytres variolés, noirs, pointillés de blanc.

319. CHARANSON cagneux.

Brévirostre, noir, luisant; élytres avec des stries pointillées; cuisses avec un anneau cendré.

320. CHARANSON marginelle.

Brévirostre, noir; bord du corcelet & des élytres blanc; élytres avec une ligne longitudinale, interrompue, blanche.

321. CHARANSON à bandelettes.

Brévirostre, noir; élytres avec des raies courtes, blanches & rouges.

322. CHARANSON de Spengler.

Brévirostre; élytres d'un blanc jaunâtre, avec des lignes élevées, courtes, noires, lisses.

323. CHARANSON birayé.

Brévirostre, noir; élytres avec des stries pointillées, une raie marginale & une autre dorsale, interrompue, jaunâtres.

324. CHARANSON livide.

Brévirostre, gris; corcelet & élytres avec des taches cendrées & noires.

325. CHARANSON superbe.

Brévirostre; élytres noires, avec six raies longitudinales, courtes, rapprochées, blanches.

326. CHARANSON Caméléon.

Brévirostre, bronzé; élytres avec la suture & une bande courtes, d'un vert doré.

327. CHARANSON histrionique.

Brévirostre, gris; corcelet avec des lignes

CHARANSON. (Insectes.)

latérales & fauves; élytres blanches avec des taches noires & fauves.

328. CHARANSON de Rohr.

Brévirostre; élytres pointues, grises, avec le bord extérieur jaunâtre à la base.

329. CHARANSON famélique.

Brévirostre, noirâtre; élytres pointues, avec des stries pointillées.

330. CHARANSON imprimé.

Brévirostre noir; corcelet & élytres avec des points enfoncés, blancs.

331. CHARANSON albipède.

Brévirostre, noirâtre; corcelet anguleux; élytres tuberculées, cendrées à la base & à l'extrémité; jambes grises.

332. CHARANSON riverain.

Brévirostre, noirâtre; corcelet avec une ligne enfoncée & des taches d'un gris rougeâtre; élytres striées, avec trois raies enfoncées, cendrées.

333. CHARANSON verruqueux.

Brévirostre, d'un noir bronzé, avec des points élevés; extrémité des élytres verruqueuse.

334. CHARANSON six-rayé.

Brévirostre, noir; corcelet & élytres avec six raies blanches.

335. CHARANSON du Cap.

Brévirostre, noir; corcelet élevé, pointillé, élytres avec des stries crénelées.

336. CHARANSON Veau.

Brévirostre noir; front bidenté; élytres raboteuses, avec une épine vers l'extrémité.

337. CHARANSON inégal.

Brévirostre gris; corcelet inégal, relevé antérieurement; élytres sillonnées, bidentées postérieurement; trompe avec trois sillons.

338. CHARANSON aigu.

Brévirostre, cylindrique, obscur; extrémité des élytres pointue.

339. CHARANSON emmufelé.

Brévirostre, obscur; élytres pointues, avec des stries crénelées; trompe sillonnée.

340. CHARANSON émérite.

Brévirostre, noir; corcelet & élytres épineux; tête avec deux petits enfoncements.

341. CHARANSON crispé.

Brévirostre; corcelet raboteux; élytres avec trois lignes élevées, dentées.

342. CHARANSON tranchant.

Brévirostre; corcelet avec deux tubercules comprimés; élytres tuberculées, cendrées à leur partie postérieure.

CHARANSON. (Insectes.)

243. CHARANSON tribule.

Brévirostre, cendré; corcelet raboteux, enfoncé antérieurement; élytres épineuses.

344. CHARANSON quadrident.

Brévirostre, cendré; corcelet raboteux; élytres épineuses, épines postérieures longues.

345. CHARANSON quadriépineux.

Brévirostre, blanchâtre; trompe noirâtre; élytres avec quatre épines élevées.

346. CHARANSON clavellé.

Brévirostre, blanchâtre; corcelet cannelé; élytres épineuses, avec trois petites lignes à la base rouges.

347. CHARANSON noduleux.

Brévirostre; corcelet avec six lignes noduleuses; élytres épineuses.

348. CHARANSON rubifère.

Brévirostre, cendré; corcelet raboteux; élytres avec des tubercules presque épineux, rougeâtres.

349. CHARANSON globulifère.

Brévirostre; corcelet raboteux; élytres épineuses, pointues à l'extrémité.

350. CHARANSON pillulaire.

Brévirostre; corcelet épineux, tuberculé; élytres pointues, avec plusieurs rangées de tubercules.

351. CHARANSON frontal.

Brévirostre, noir; front rétus; corcelet & élytres, avec plusieurs rangées de tubercules.

352. CHARANSON court.

Brévirostre, obscur; élytres grisâtres, avec des stries courtes, noires, glabres, élevées.

353. CHARANSON indérien.

Brévirostre, grisâtre; corcelet épineux de chaque côté; élytres avec des stries pointillées.

354. CHARANSON nomade.

Brévirostre, blanchâtre; corcelet raboteux; élytres avec des lignes obliques obscures.

355. CHARANSON candidat.

Brévirostre, mélangé de blanc & d'obscur; dos du corcelet cendré, avec une ligne & deux points blancs.

356. CHARANSON arrosé.

Brévirostre, blanchâtre; dessus du corps avec des lignes & des points élevés, noirs; trompe avec une ligne élevée.

357. CHARANSON Cenchrus.

Brévirostre, blanchâtre; corcelet & élytres avec des lignes confluentes, cendrées, pointillées de noir; trompe avec une ligne élevée.

CHARANSON (Insectes.)

358. CHARANSON quadrilinéé.

Brévirostre , cendré ; corcelet obscur , avec quatre lignes blanches ; élytres avec quatre petites lignes noires.

359. CHARANSON rayure-noire.

Brévirostre , blanchâtre ; corcelet avec une ligne noire de chaque côté ; trompe carenée.

360. CHARANSON marqué.

Brévirostre , cylindrique , blanc ; corcelet & élytres avec une raie noire de chaque côté.

361. CHARANSON fenestré.

Brévirostre , blanc ; élytres avec six taches rhomboïdales obscures.

362. CHARANSON tête-jaune.

Brévirostre , blanchâtre ; tête jaunâtre ; corcelet & élytres avec des lignes blanches & obscures , alternes.

363. CHARANSON peint.

Brévirostre , blanc ; corcelet avec trois lignes , élytres avec une bande arquée , obscures.

364. CHARANSON yeux-noirs.

Brévirostre , presque cylindrique , blanc , sans taches ; yeux noirs.

365. CHARANSON ténébrioïde.

Brévirostre aptère , noir , glabre ; élytres lisses.

366. CHARANSON ténébreux.

Brévirostre , noir luisant ; corcelet arrondi , un peu raboteux ; élytres réunies , avec des stries pointillées.

367. CHARANSON fabricant.

Brévirostre , noir ; antennes obscures ; élytres réunies , avec huit rangées de points enfoncés.

368. CHARANSON majeur.

Brévirostre , noir , couvert d'un duvet cendré ; corcelet raboteux , pointillé ; élytres avec des stries pointillées.

369. CHARANSON globuleux.

Brévirostre , obscur ; élytres globuleuses , avec des raies cendrées & des taches peu marquées blanches.

370. CHARANSON singulier.

Brévirostre , cendré ; élytres avec des rangées de points enfoncés : point élevé au milieu de chaque enfoncement.

371. CHARANSON américain.

Brévirostre , blanc ; élytres avec cinq rangées blanches , pointillées de noir ; écusson jaunâtre.

372. CHARANSON grifette.

Brévirostre , fauve ; tête noirâtre ; élytres avec des stries pointillées.

373. CHARANSON térécolle.

Brévirostre , ovale oblong ; tête & cor-

CHARANSON (Insectes.)

celet cylindrique ; élytres cendrées , avec de petites lignes noirâtres.

374. CHARANSON linéelle.

Brévirostre , oblong ; d'un gris obscur ; corcelet avec trois lignes pâles ; élytres avec une ligne longitudinale blanchâtre , de chaque côté.

375. CHARANSON tronçonné.

Brévirostre , noir , abdomen presque globuleux ; trompe très courte ; antennes & pattes fauves.

376. CHARANSON clavipède.

Brévirostre ; ovale oblong , noir ; pattes longues , fauves ; cuisses renflées.

377. CHARANSON obtus.

Brévirostre , ovale , postérieurement obtus ; corcelet obscur , un peu carené ; antennes & pattes noirâtres.

378. CHARANSON entrecoupé.

Brévirostre , obscur ; corcelet & élytres avec des raies bronzées.

379. CHARANSON quadrille.

Brévirostre , cendré ; élytres avec quatre points noirs.

***** *Trompe courte. Cuisses dentées.*

380. CHARANSON admirable.

Brévirostre , cuisses dentées ; corps mélangé de vert brillant & de noir.

381. CHARANSON renflé.

Brévirostre , cuisses antérieures dentées ; corps élevé , noirâtre ; corcelet avec des lignes ; élytres avec deux bandes linéaires & une ligne à l'extrémité , jaunâtres.

382. CHARANSON trident.

Brévirostre , cuisses dentées , cendré ; élytres avec trois dents & l'extrémité échan-crée.

383. CHARANSON tête-obscur.

Brévirostre , cuisses un peu dentées , noir ; corcelet & élytres lisses , avec des taches obscures.

384. CHARANSON de la Liveche.

Brévirostre , cuisses dentées ; corps d'un gris obscur ; élytres légèrement chagrinées.

385. CHARANSON nubile.

Brévirostre , cuisses dentées , gris ; élytres avec beaucoup de points obscurs.

386. CHARANSON nègre.

Brévirostre , cuisses dentées , d'un noir obscur ; corcelet chagriné ; élytres avec des stries crénelées.

387. CHARANSON fillonné.

Brévirostre , cuisses dentées , noir ; élytres striées , avec de petites taches rouil-lées.

388. CHARANSON gemmifère.

Brévirostre , cuisses dentées , noir luisant ;

CHARANSON (Insectes.)

corcelet chagriné ; élytres avec des points d'un vert blanchâtre.

389. CHARANSON picipède.

Brévirostre, cuisses dentées, gris; élytres nébuleuses; cuisses postérieures fauves.

390. CHARANSON morio.

Brévirostre, cuisses dentées, noir luisant; élytres glabres, lisses.

391. CHARANSON bifilloné.

Brévirostre, cuisses dentées, noir; bord des élytres cendré; trompe avec deux fillons.

392. CHARANSON arenaire.

Brévirostre, cuisses dentées, noir glabre; élytres avec des stries pointillées; base des antennes brune.

393. CHARANSON du Poirier.

Brévirostre, cuisses dentées; corps bronzé; élytres striées.

394. CHARANSON argenté.

Brévirostre, cuisses dentées; corps d'un vert argenté.

395. CHARANSON du Pommier.

Brévirostre, cuisses dentées, un peu pubescent, obscur; antennes & pattes testacées.

396. CHARANSON des arbrisseaux.

Brévirostre, cuisses antérieures dentées;

corps cendré; élytres avec des stries pointillées.

397. CHARANSON verdelet.

Brévirostre, cuisses dentées, vert; bouche & antennes noires; yeux très-noirs.

398. CHARANSON oblong.

Brévirostre, cuisses dentées, oblong, noir; antennes, élytres & pattes ferrugineuses.

399. CHARANSON prafe.

Brévirostre, cuisses fortement dentées; corps vert; antennes & pattes noirâtres.

400. CHARANSON ovale.

Brévirostre, cuisses dentées, noir, abdomen ovale; antennes & pattes fauves.

401. CHARANSON fouillé.

Brévirostre, oblong, vert; cuisses ferrugineuses; antennes longues.

402. CHARANSON du Padus.

Brévirostre, cuisses dentées, ovale oblong, d'un vert grisâtre; antennes & pattes ferrugineuses.

403. CHARANSON érythrope.

Brévirostre, cuisses dentées, ovale oblong, noir; antennes & pattes fauves; antennes longues.

CHARANSON (Insectes.)

404. CHARANSON rude.

Brévirostre, cuisses dentées, cendré; abdomen ovale; élytres avec des poils élevés, courts, roides.


405. CHARANSON marqué.

Brévirostre, cuisses dentées, ovale,

noirâtre; élytres striées, avec des rangées alzernes de taches noires & blanches.

406. CHARANSON attelaboïde.

Brévirostre, cuisses dentées, cendré; trompe & élytres, avec un tubercule gros, oblong.



* *Trompe mince, alongée; cuisses simples.*

1. CHARANSON géant.

CURCULIO gigas.

Curculio longirostris, thorace elytrisque scabris, antennis apice albis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12 fig. 146.

Curculio gigas. FAB. Syst. ent. p. 127. no. 1. — Sp. inf. t. 1. p. 161. no. 1. — mant. inf. tom. 1. p. 97. no. 1.

Il n'est pas aussi grand que le *Charanson* palmiste, & son corps est plus arrondi. La trompe est presque de la longueur du corcelet. Elle est hêbuleuse à la base, & noire-luisante depuis l'insertion des antennes. La tête est arrondie, nébuleuse, & les yeux sont noirs, & point-du-tout faillans. Le corcelet est arrondi, nébuleux, très-raboteux, tuberculé à la partie latérale. L'écusson est arrondi, petit & grisâtre. Les élytres ont des rangées de points enfoncés, & des stries de petits points élevés. Elles sont mêlées de gris cendré & d'obscur. Le corps en-dessous est obscur. Les pattes sont d'un gris obscur & chagrinées. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures. Les jambes sont terminées par un ongle très-fort.

Il se trouve dans le Japon.

2. CHARANSON colosse.

CURCULIO colossus.

Curculio longirostris nigricans, pedibus longis, rostro tuberculato. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 3. fig. 32. a. b.

Curculio longipes. DRURY. Ill. of inf. t. 2. tab. 33. fig. 3.

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 36. fig. 9.*

Il est presque une fois plus grand que le *Charanson* palmiste. Tout le corps est d'un brun noir, couvert d'un velouté d'un brun cendré. La trompe est longue, amincie, cylindrique, couverte dans l'un des deux sexes, depuis la base jusqu'au milieu, de tubercules inégaux, luisans. Le corcelet est grand, un peu applati. Les élytres sont légèrement striées, un peu plus courtes que l'abdomen, & d'un brun plus clair que le reste du corps. Les pattes sont noires, assez longues.

Il se trouve aux Indes orientales.

Nota. Cet insecte diffère du *Curculio longipes* de M. Fabricius, quoique cet auteur cite la figure de Drury.

3. CHARANSON palmiste.

CURCULIO Palmarum.

Curculio longirostris ater, thorace ovato planius-

cu'o, e'lytris abbreviatis striatis. Ent. ou hist. nat. aes inf. CHARANSON. Pl. 2. fig. 16. a. b.

Curculio Palmarum. LIN. Syst. nat. p. 606. n° 1. — Mus. lud. utr. p. 42.

Curculio Palmarum, longi ostris ater, thorace supra plano, elytris abbreviat s striatis. FAB. Syst. ent. p. 128. n° 2. — Sp. inf. t. 1. p. 162. n° 2. — Mant. inf. t. 1. p. 97. no. 2.

Curculio longirostris, antennis fractis, clavâ truncatâ, femoribus muticis, corpore nigro depresso, thorace ovato planiusculo, elytris abbreviatis striatis. DEG. Mem. inf. t. 5. p. 269. n. 4. pl. 15. fig. 26.

Charanson à longue trompe, à antennes coudées à bouton tronqué & à cuisses simples, à corps applati, noir; à corcelet ovale, plat, & à étuis canelés, plus court que le ventre. DEG. *lb.*

Cossus saguarius. RUMPH. Amb. 1. p. 79. t. 17. fig. 9.

GRONOV. *Zooph. n. 578. tab. 16. fig. 4.*

MERIAN. *Inf. surin. tab. 48. fig. 3.*

Curculio Palmarum. Scop. ann. 5. hist. nat. p. 89. n° 40.

PERTIV. *Gazoph. tab. 35. fig. 5.*

SULZ. *Inf. tab. 3. fig. 20.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 37. fig. 25.*

Il a environ dix-huit lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps, & la trompe a environ six lignes. Tout le corps est très-noir, velouté à sa partie supérieure. La trompe est cylindrique, mince, couverte d'un duvet assez long, très-serré dans l'un des deux sexes. Le corcelet est un peu applati. L'écusson est triangulaire, terminé en pointe alongée. Les élytres sont striées, plus courtes que l'abdomen. Les jambes sont terminées en un crochet très-fort. Le dernier article des antennes est grand, tronqué & cendré à son extrémité.

La larve vit dans le tronc des Palmiers, où elle se nourrit de la substance qui s'y trouve, comme Mérian nous l'apprend dans son histoire des insectes de Surinam. Elle donne la figure de cette larve, qu'elle dit être blanchâtre. Elle ajoute encore que les naturels du pays la roissent & la mangent comme une chose délicieuse. C'est aussi ce qui est confirmé par M. Fermin dans sa description de Surinam.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne, à Surinam.

4. CHARANSON ensanglanté.

CURCULIO cruentatus.

Curculio longirostris ater, thorace lineis, elytrisque punctis duabus sanguineis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 147.

Curculio cruentatus. FAB. Syst. ent. pag. 128. n°. 3. — Sp. inf. tom. 1. pag. 162. n°. 3. — Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n°. 3.

Il ressemble beaucoup au Charanson palmiste ; mais il est un peu plus petit. Les antennes sont noires, coudées, terminées en masse tronquée. La trompe est longue, courbée, mince, noire. La tête est arrondie. Le corcelet est assez long, lisse, velouté, très-noir, avec deux larges raies longitudinales, sinuées, d'un rouge de sang. L'écusson est triangulaire, très-pointu, assez long & noir. Les élytres sont noires, veloutées, striées, avec deux petites taches allongées, d'un rouge de sang, sur chaque. Elles sont un peu plus courtes que l'abdomen. Le dessous du corps est noir luisant, avec quelques taches brunes peu marquées. Les pattes sont noires ; les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures. Les jambes sont terminées par un ongle fort. Les antérieures ont des poils courts, serrés à leur partie interne.

Il se trouve dans la Caroline.

5. CHARANSON longipede.

Curculio longipes.

Curculio longirostris nigricans, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anticis longioribus. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 15. fig. 191.

Curculio longipes. FAB. Syst. ent. app. 1. pag. 221. — Sp. inf. tom. 1. pag. 162. n°. 4. — Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n°. 4.

VOET. Coleopt. pars 2. tab. 36. fig. 10.

Il est presque une fois plus petit que le Charanson palmiste. La trompe est noire, longue, presque quadrangulaire, un peu plus grosse & échancrée à son extrémité. Les antennes sont noires, coudées, tronquées à leur extrémité, insérées presque à la base de la trompe. La tête est noire & arrondie, & les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est lisse, brun, un peu plus convexe que celui du Charanson palmiste. L'écusson est triangulaire allongé, noirâtre. Les élytres sont d'un brun ferrugineux, striées, un peu plus courtes que l'abdomen. Tout le dessous du corps est noir brun. Les pattes sont d'un noir brun. Les antérieures sont un peu plus longues que les autres. Les jambes sont un peu arquées, & fortement ciliées intérieurement ; les autres quatre sont très-peu ciliées ; elles sont toutes terminées par un ongle crochu assez fort.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

Du cabinet de M. Lee.

Hist. Nat. Insectes. Tom. V.

Le *Curculio longipes* de DRURY, inf. tom. 2. tab. 13. fig. 3, diffère de celui-ci, & est le même que le Charanson colosse.

6. CHARANSON ferrugineux.

Curculio ferrugineus.

Curculio longirostris, thorace plano lavi nigromaculato, elytris striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 2. fig. 16. d.

Curculio hemipterus. SULZ. hist. inf. tab. 4. fig. 5.

Il est un peu plus petit que le Charanson palmiste. Tout le corps est d'un brun ferrugineux, plus ou moins clair. La trompe est longue & mince. Les antennes sont noires ; le dernier article est ferrugineux, coupé & cendré à son extrémité. Le corcelet est lisse, un peu aplati, presque ovale, avec plusieurs taches noires. Les élytres sont striées, plus courtes que l'abdomen. L'écusson est triangulaire, terminé en pointe allongée. Le dessous du corps est d'un brun noir. Les pattes sont quelquefois d'un brun noirâtre.

Il se trouve aux Indes orientales.

7. CHARANSON bordé.

Curculio limbatus.

Curculio longirostris niger, thorace elytrisque ferrugineo marginatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 3. fig. 22.

Il est plus petit que le Charanson palmiste. Les antennes sont noires, avec la masse ovale presque arrondie. La trompe est noire, cylindrique, un peu plus longue que le corcelet. Tout le corps est noir. Le corcelet est lisse, un peu aplati, avec les bords latéraux couverts d'une poussière écailleuse, ferrugineuse. Les élytres ont des stries pointillées, les bords latéraux & l'extrémité couverts d'une poussière écailleuse, ferrugineuse. Les cuisses sont sans épines & sans dentelures. Les jambes sont terminées par un crochet, & leur partie interne est ciliée.

Il se trouve à l'île de Bourbon.

8. CHARANSON sanguinolent.

Curculio sanguinolentus.

Curculio longirostris ater, elytris striatis, basi fascia sanguinea. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 116.

Il est presque une fois plus petit que le Charanson ensanglanté, auquel il ressemble pour la forme du corps. Tout le corps est d'un noir de velours. Les antennes sont coudées. La trompe est courbée, cylindrique, presque plus longue que le corcelet. Le corcelet est arrondi. L'écusson est

noir & petit. Les élytres ont une bande d'un rouge de sang, à leur base, elles ont des stries qui paroissent fort peu à cause du velouté de l'insecte. Le dessous du corps est noir & luisant; les pattes sont noires, les cuisses sont simples, & les jambes sont terminées par un ongle assez fort.

Il se trouve en Amérique, dans l'île de Tabago.

9. CHARANSON fascié.

CURCULIO fasciatus.

Curculio longirostris niger, elytris striatis, fascia rufa interrupta. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. II. fig. 136.

Il ressemble beaucoup au Charanson palmiste; mais il est deux fois plus petit. Tout le corps est d'un noir de velours en-dehors & d'un noir luisant en-dessous. Les élytres seules ont une bande rougeâtre au milieu, interrompue à la suture. La trompe est mince, courbée, égale, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, & les yeux ne sont point du tout saillans. Les antennes sont coudées, & elles ont leur insertion près de la base de la trompe. Le corcelet est lisse & velouté. L'écusson est petit & triangulaire. Les élytres sont striées & un peu plus courtes que l'abdomen. Les cuisses de toutes les pattes, sont simples, sans dents & sans épines. Les jambes sont terminées par un ongle fort, crochu, semblable à celui du Charanson palmiste.

Il se trouve . . .

10. CHARANSON indien.

CURCULIO indus.

Curculio longirostris ater, thorace subovato excavato punctato, elytris rugoso-fulcatis, tibiis spinosis. LIN. Syst. nat. pag. 606. n°. 2. — Mus. Lud. Ulr. pag. 43.

Curculio indus. FAB. Syst. ent. pag. 128. n°. 4. — Sp. inf. tom. 1. pag. 162. n°. 5. — Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n°. 5.

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore nigro depresso, thoracis lateribus tuberculo villosa elytris rugoso-fulcatis. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 265. n°. 1. pl. 15. fig. 22.

Charanson des Indes, à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses dentellées, à corps noir applati, à tubercule velu aux côtés du corcelet, à étuis chagrinés & canelés. DEG. Ib.

Il est un peu plus court & un peu plus gros que le charanson palmiste. La trompe est mince, cylindrique & un peu courbée. Tout le corps est noir. La tête est arrondie. Le corcelet est gros, applati, avec un enfoncement au milieu; il est chagriné & garni de chaque côté, d'un tubercule assez gros, couvert de poils roides, courts, très-

ferrés, d'un brun fauve. Les élytres, sont un peu applaties, chagrinées, & ont chacune neuf stries crénelées. Le dessous du corps & les pattes sont un peu chagrinés.

De Geer place cet insecte dans la division des Charansons dont les cuisses sont dentées.

Il se trouve aux Indes orientales.

11. CHARANSON villageois.

CURCULIO paganus.

Curculio longirostris griseus, thoracis dorso fusco, arcubus cinereis, rostro bifurcato. FAB. Syst. ent. pag. 128. n°. 6. — Spec. inf. tom. 1. pag. 162. n°. 6. — Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n°. 6.

Il ressemble au Charanson du Pin, mais il est une fois plus grand. La trompe est assez grosse, deux fois plus longue que la tête, noirâtre, avec deux cannelures. Les antennes sont grisâtres, noires à leur base. Le corcelet est grisâtre sur les côtés, noirâtre sur le dos, avec quatre taches arquées & une petite tache au milieu, cendrée. Les élytres sont obtuses, grisâtres, sans taches.

Il se trouve aux Indes.

12. CHARANSON Eléphant.

CURCULIO Elephas.

Curculio longirostris fuscus, thorace elytrisque variolosis, elytris postice spinosis. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 162. n°. 7. — Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n°. 7.

Il est assez grand. La trompe est noirâtre, cylindrique. La tête est noire à sa base. Le corcelet est un peu applati, très-variolé, noirâtre, avec des taches plus obscures. Les élytres sont variolées, noirâtres, avec des taches plus obscures; elles ont vers l'extrémité plusieurs épines élevées, courtes, aiguës. Les pattes sont noirâtres, sans épines & sans dentelures.

Il varie pour les couleurs. Il est noirâtre, ou couvert d'une poussière d'un gris rousâtre.

Nous croyons que cet insecte n'est qu'une variété du Charanson géant.

Il se trouve dans l'Afrique équinoxiale.

13. CHARANSON morbilleux.

CURCULIO morbillosus.

Curculio longirostris cinereus, elytris tuberculis seriatis elevatis nigris.

Curculio morbillosus. DRURY. Ill. of inf. tom. 3. tab. 49. fig. 5.

Il est un peu plus petit que le Charanson géant. Sa trompe est longue, mince, un peu arquée,

d'un noir luisant. Les antennes sont coudées, d'un noir cendré. Tout le corps est cendré, obscur. Le corcelet est arrondi, couvert de petits tubercules noirs, lisses. Les élytres ont plusieurs rangées de tubercules élevés, noirs, lisses, luisans. Les pattes sont noires, les cuisses sont simples.

Il se trouve à Cayenné.

14. CHARANSON hémiptère.

CURCULIO hemipterus.

Curculio longirostris obscurè purpurascens, elytris abbreviatis striatis nigro-maculatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 1. fig. 4. & pl. 16. fig. 4. b.

Curculio hemipterus. LIN. *Syst. nat. p. 606. n. 3.* — *Mus. lud. utr. p. 44.*

Curculio hemipterus, longirostris obscurè purpurascens, elytris abbreviatis maculatis. FAB. *Syst. ent. p. 128. n. 5.* — *Sp. inf. t. 1. p. 163. n. 8.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 97. n. 8.*

Curculio rufo-fasciatus longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo, rufo, thorace magno, fasciis longitudinalibus nigris. DEG. *Mém. inf. t. 5. p. 271. n. 5. pl. 15. fig. 25.*

Charanson roux-rayé, à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples; à corps allongé, roux, & à grand corcelet, avec des raies longitudinales, noires. DEG. *Ib.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 37. fig. 24.*

Il a environ six lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité de l'abdomen. La trompe est longue, mince, courbée. Tout le corps est d'un brun ferrugineux. Le corcelet est lisse, avec trois taches longitudinales, noires. L'écusson est triangulaire, allongé. Les élytres sont plus courtes que l'abdomen, striées, avec quelques taches noires. Le dessous du corps a quelques taches noires. Les jambes sont terminées en un crochet assez fort.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne, à Surinam.

15. CHARANSON bariolé.

CURCULIO variegatus.

Curculio longirostris, rufo nigroque varius, rostro apice nigro. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 158.

Curculio varius. FAB. *Gen. inf. mant. p. 223.* — *Sp. inf. t. 1. p. 163. n. 9.* — *Mant. inf. t. 1. p. 97. n. 9.*

Il est un peu plus grand que le *Charanson* du Pin. Les antennes sont brunes, noires, coudées,

un peu tronquées à leur extrémité. La trompe est mince, cylindrique, de la longueur du corcelet, ferrugineuse, avec un peu de l'extrémité noire. La tête est arrondie, brune, ferrugineuse, avec les yeux noirs, point-du-tout saillans. Le corcelet a des raies rouges, brunes, & d'autres noires. L'écusson est petit, triangulaire, noir. Les élytres sont striées, à peine plus courtes que l'abdomen, noires, avec quelques lignes longitudinales, ferrugineuses, plus ou moins longues. Le dessous du corps est mélangé de noir & de rouge brun. Les pattes sont noires, avec les trois quarts des cuisses rouges. Les cuisses sont sans épines & sans dentelures.

J'en ai vu une variété dans le cabinet de M. Lee, dont la base des élytres étoit d'un rouge brun.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

16. CHARANSON noirâtre.

CURCULIO piceus.

Curculio longirostris, ater glaber, thorace ovato depresso, elytris abdomine brevioribus substriatis.

Curculio piceus. PALL. *Inf. sibir. p. 23. t. B. fig. 3.* — *Iin. 1. app. p. 464. n. 34.*

Il est un peu plus grand que le précédent. La trompe est mince, de la longueur du corcelet, courbée. Tout le corps est d'un brun noir. La masse des antennes est globuleuse, d'un brun testacé. Le corcelet est ovale, un peu déprimé, couvert de très-petits points enfoncés. Les élytres sont un peu déprimées, plus courtes que l'abdomen, obtuses, légèrement striées, avec de très-petits points enfoncés entre les stries. Les pattes antérieures sont un peu plus grosses que les autres. Toutes les jambes sont légèrement raboteuses & ciliées intérieurement.

Il se trouve dans les déserts de la Tartarie.

17. CHARANSON cafre.

CURCULIO cafer.

Curculio longirostris ater, elytris striatis abdomine brevioribus, tibiis ciliatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 16. fig. 194.

Il ressemble entièrement au *Charanson* palmiste, mais il est deux fois plus petit. Tout le corps est très-noir, un peu velouté. Les antennes sont tronquées à leur extrémité. La trompe est mince, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Le corcelet est lisse, légèrement lobé postérieurement. L'écusson est triangulaire, pointu postérieurement. Les élytres sont striées, un peu plus courtes que le corps. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures. Toutes les jambes sont ciliées à leur partie interne.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

18. CHARANSON mélano-cardé.

CURCULIO melanocardius.

Curculio longirostris cinereus, coleoptris macula communi cordata fusca. FAB. *Syst. ent. pag. 129. n° 7.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 163. n° 10.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n° 10.*

Curculio melanocardius, longirostris cinereus, coleoptris fascia cordata fusca. LIN. *Syst. nat. pag. 608. n° 18.* — *Mus. lud. ult. pag. 45.*

Il est de grandeur moyenne, & d'une couleur cendrée. Les antennes sont noires. La trompe est noirâtre, longue, arquée, glabre. Le corcelet est ovale. Les élytres ont au milieu une tache en cœur, obscure, commune aux deux élytres. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

M. Fabricius cite à deux insectes différens la figure. 11. tab. 4. de Sulzer. Voy. *Charanson* & *imoucheté.*

Il se trouve aux Indes orientales.

19. CHARANSON porte-croix.

CURCULIO cruciatus.

Curculio longirostris niger, thorace subspinoso, lineis elytris posticè cruce albis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 11. fig. 131.*

Curculio cruciatus. FAB. *Syst. ent. pag. 129. n° 8.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 163. n° 11.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n° 11.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au Charanson de la Patience. Les antennes sont coudées, noirâtres, brunes à leur base. La trompe est presque de la longueur du corcelet; elle est fortement ponctuée, & l'insecte la porte colée contre le corps. La tête est noire, petite, arrondie, avec les yeux noirs & point du tout faillans. Le corcelet est très-raboteux; on y voit des enfoncemens assez profonds, très-irréguliers; il est noir, avec une ligne d'un gris roussâtre de chaque côté. L'écusson n'est pas apparent. Les élytres ont des stries régulières: la ligne élevée entre chaque strie a une suite de tubercules élevés, pointus; elles sont noires, très-convexes, avec une ligne transversale d'un gris roussâtre, placée au-delà du milieu, & la suture du même gris, depuis la ligne jusqu'à l'extrémité, ce qui forme un T, ou une espèce de croix. Les pattes sont noires, avec un point blanc à l'extrémité des cuisses, & un autre à la base des jambes. Les cuisses ont quelques petites écailles blanches qu'on ne peut distinguer qu'à la loupe. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures.

Il se trouve dans la nouvelle-Hollande.

20. CHARANSON striolé.

CURCULIO striatulus.

Curculio longirostris niger, elytris holosericeo-striatis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 11. fig. 140.*

Curculio striatus. FAB. *Syst. ent. pag. 129. n° 9.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 163. n° 11.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n° 12.*

Il ressemble au Charanson du Sapin, pour la forme & la grandeur. Les antennes sont noires, coudées, avec le premier article long & brun. La trompe est mince, courbée, très-peu renflée à son extrémité, brune, avec l'extrémité seulement noire. La tête est brune & arrondie. Le corcelet est brun, noirâtre, fortement pointillé. L'écusson est à peine apparent. Les élytres sont brunes noirâtres, avec quelques écailles blanchâtres, irrégulièrement répandues; elles ont des stries régulières, dans lesquelles on remarque de grands points enfoncés. Le dessous du corps est noirâtre, & couvert de quelques écailles blanchâtres. Les pattes sont brunes, avec quelques poils très-courts, blanchâtres. Les cuisses sont simples, & les jambes sont terminées par un ongle assez fort.

Il se trouve en Amérique, dans l'isle de Terre-Neuve.

21. CHARANSON rubétra.

CURCULIO rubetra.

Curculio longirostris ater levis immaculatus, femoribus subcaetis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 4. fig. 34. a. b. c.*

Curculio rubetra. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 97. n° 13.*

Il est de la grandeur du Charanson du Pin. Le corps est noir luisant. La trompe est longue, mince, arquée. Le corcelet est très-lisse à la partie supérieure, finement pointillé sur les côtés. Les élytres sont striées, & les stries sont pointillées. Le dessous du corps est finement pointillé. Les cuisses sont un peu cannelées & velues. Les jambes sont terminées par un ongle; les postérieures seulement sont munies d'une petite dent.

La larve vit dans les Palmiers. Parvenue à toute sa grosseur, elle forme une coque avec les fibres de l'arbre, s'y change en nymphé, & en sort insecte parfait.

Il se trouve à Cayenne.

22. CHARANSON du Pin.

CURCULIO Pini.

Curculio longirostris, elytris rufescentibus, fasciis

nebulosis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON Pl. 4. fig. 42.

Curculio Pini. FAB. Syst. ent. pag. 129. n°. 10. — Sp. inf. tom. 1. pag. 163. n°. 13. — Mant. inf. tom. 1. pag. 98. n°. 14.

Curculio Pini. LIN. Syst. Nat. pag. 608. n°. 19. — Faun. Juec. n°. 589.

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo testaceo, maculis lineisque transversis flavis, elytris gibbosis. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 222. n°. 15.

Charanson du Pin, à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps oblong d'un brun de marron, avec des taches & raies transverses jaunes, & à deux bosses sur les élytres. DEG. Ib.

Curculio Pini. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 135.

Curculio Abietis. LAICHART. inf. tom. 1. pag. 213. n°. 10.

FRISCH. inf. II. tab. 23. fig. 5.

Il varie pour la grandeur. Il a depuis quatre jusqu'à six lignes de long, de la tête à l'anus. Tout le corps est d'un brun marron, plus ou moins obscur, & couvert quelquefois de petites écailles cendrées. La trompe est brune cylindrique, de la longueur du corcelet. Les antennes sont brunes. Le corcelet a quelques taches roussâtres, formées par de petites écailles. L'écusson est roussâtre. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés assez gros, & quelques lignes transversales d'un gris roussâtre, formées par de petites écailles. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve en Europe sur le Pin sylvestre.

23. CHARANSON de l'Onoporde.

Curculio Onopordii.

Curculio longirostris niger cinereo villosus, rostro atro: utrinque sulco abbreviato baseos. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 98. n°. 15.

Il ressemble au Charanson rayé, mais il est plus grand. La trompe n'est pas aussi longue que celle des autres espèces de cette division; elle est noire & marquée de chaque côté, à sa base, d'un léger sillon. Le corcelet est raboteux, noir, & couvert ainsi que les élytres, de petites écailles cendrées. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Afrique sur l'Onoporde.

24. CHARANSON cannelé.

Curculio canaliculatus.

Curculio vittatus longirostris ferrugineo-fuscus

albo lineatus, rostro nigro utrinque sulco abbreviato baseos. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 164. n°. 14. — Mant. inf. tom. 1. pag. 98. no. 16.

Il est assez grand. La trompe est cylindrique, noire, marquée de deux petites cannelures courtes, entre les yeux. Le corcelet est d'un brun ferrugineux, avec cinq lignes longitudinales blanches. Les élytres sont lisses, avec le bord extérieur & une ligne au milieu, blancs. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Italie.

25. CHARANSON de la Jacée.

Curculio Jaceæ.

Curculio longirostris niger cinereo irroratus, elytris puncto baseos distincto. FAB. Syst. ent. pag. 129. n°. 11. — Sp. inf. tom. 1. pag. 164. n°. 15. — Mant. inf. tom. 1. pag. 98. n°. 17.

Il ressemble au Charanson du Pin. Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, assez grosse. Le corcelet est ovale, noir, couvert d'une poussière cendrée. Les élytres sont noires & couvertes d'un léger duvet court, cendré, & marquées d'un point distinct, cendré, vers l'écusson.

Le duvet cendré dont cet insecte est couvert, disparaît à mesure qu'il vieillit.

Il se trouve en Europe, sur la CENTAURÉE-JACÉE.

26. CHARANSON pointillé.

Curculio punctulatus.

Curculio longirostris flavo fuscoque varius, abdomine cinereo nigro punctato. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 98. n°. 18.

Il ressemble beaucoup au Charanson de la Jacée, mais il est un peu plus petit. Tout le corps est velu, mélangé de jaune & d'obscur. Les antennes sont noires. Le corcelet est inégal. L'abdomen est cendré, couvert de plusieurs points élevés noirs luisans. Les pattes sont cendrées. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Amérique.

27. CHARANSON de l'Artichaut.

Curculio Cynarae.

Curculio longirostris niger virescenti irroratus, rostro nigro subcarinato. FAB. Mans. inf. tom. 1. pag. 98. n°. 19.

Curculio niger, striatus, maculis villosis-fuscis nebulosis. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 281. n°. 8.

Le Charanson tacheté de tête de Chardon GEOFF. Ib.

Curculio Cinara, Naturf. 24. pag. 18. tab. 1. fig. 25.

Curculio Cardui, FOURC. Ent. par. 1. pag. 118. n°. 8.

Il ressemble au Charanson de la Jacée, & il varie beaucoup pour la grandeur. La trompe est noire, un peu plus courte que dans les autres espèces, avec une ligne longitudinale élevée au milieu. Le corcelet est un peu aplati, raboté, avec une ligne latérale verdâtre. Les élytres ont des stries pointillées, & sont parsemées de points un peu velus, verdâtres. Le dessous du corps est cendré.

Il se trouve en Afrique, en France, (sur les fleurs d'une espèce d'Artichaut, sur les Chardons.

28. CHARANSON Colon.

CURCULIO Colon.

Curculio longirostris griseus, thorace utrinque lineâ, elytris puncto albo. Ent. ou hist. nat. des ins. CHARANSON. Pl. 7. fig. 76.

Curculio Colon longirostris canescens, femoribus anticis subdentatis, thorace utrinque lineâ, elytrisque puncto albo. LIN. Mant. pag. 531.

Curculio Colon longirostris griseus, elytris puncto albo. FAB. Syst. ent. pag. 130. n°. 12. — Sp. inf. tom. 1. pag. 164. n°. 16. — Mant. inf. tom. 1. pag. 98. n°. 80.

Curculio oblongus, fuscus, thoracis lateribus albidis, elytris striatis, puncto albo. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 280. n°. 6.

Le Charanson à deux points blancs, GEOFF. Ib.

SCAEFF. Icon. inf. tab. 155. fig. 2.

Curculio palustris. SCOP. Ent. carn. n°. 104.
Curculio Colon, LAICHART. inf. tom. 1. pag. 227. n°. 20.

Curculio palustris. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 208.

Curculio bipunctatus. FOURC. Ent. par. 1. pag. 118. n°. 6.

Il a près de cinq lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'anus. La trompe est noirâtre, un peu plus longue que le corcelet. Tout le corps est d'une couleur cendrée plus ou moins claire. Les élytres ont un point blanc vers le milieu. L'abdomen a quatre points d'un gris jaunâtre, de chaque côté. Les pattes sont cendrées. Les cuisses ont un anneau blanchâtre. Les antérieures sont presque dentées.

Il se trouve en Europe. Il est commun dans toute la France.

29. CHARANSON bimaculé.

Curculio bimaculatus.

Curculio longirostris fuscus, elytris puncto cinereo, rostro pedibusque atris. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 98. n°. 21.

Il ressemble beaucoup au précédent, mais il est un peu plus petit. La trompe est noire, luisante, courbée. Le corcelet est noirâtre avec une ligne cendrée de chaque côté. Les élytres sont lisses, noirâtres, avec un point cendré distinct. Les pattes sont noires.

Il se trouve dans la Saxe.

30. CHARANSON bimoucheté.

CURCULIO biguttatus.

Curculio longirostris niger, elytris puncto elevato; abdomine pedibusque posticis flavis. FAB. Syst. ent. pag. 130. n°. 13. — Sp. inf. tom. 1. pag. 164. n°. 17. — Mant. inf. tom. 1. pag. 99. n°. 22.

Il est petit. La tête est noire. Les antennes sont noires, en masse. Le corcelet est cylindrique, noir, sans taches. Les élytres sont lisses, noires, avec un point grand, élevé, globuleux, jaunâtre, placé vers la base. L'abdomen est jaune. Les pattes antérieures sont allongées, noires; les autres sont jaunes.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

31. CHARANSON bilinéé.

CURCULIO bilineatus.

Curculio longirostris fuscus, elytris lineis duabus punctorum alborum. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 164. n°. 18. — Mant. inf. tom. 1. pag. 99. n°. 23.

Il est de grandeur moyenne. La trompe est noire, assez grosse, un peu plus longue que dans les autres espèces. Le corcelet est noir, avec trois lignes blanches. Les élytres sont striées, noires, avec deux lignes sur chaque, formées par des points carrés blancs, placées l'une vers le bord extérieur & l'autre vers la suture. Les pattes sont noires, les cuisses sont simples.

Il se trouve en Allemagne.

32. CHARANSON échiquier.

CURCULIO chessatus.

Curculio longirostris cinereus, elytris apice striis albis nigro-punctatis. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 165. n°. 19. — Mant. inf. tom. 1. pag. 99. n°. 24.

Il est de grandeur moyenne. Les antennes & la tête sont noirâtres. Le corcelet & les élytres sont gris. Les élytres ont vers leur extrémité

cinq stries blanches, dans lesquelles on aperçoit des points noirs distincts.

Il se trouve en Allemagne.

33. CHARANSON bossu.

CURCULIO gibbosus.

Curculio ovatus niger, elytris tuberculatis posterioribus cinereis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1756.*

Curculio nigro-gibbosus longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore ovato nigro, elytris tuberculatis posticè cinereis. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 224. n° 17.*

Charanson noir bossu, à longue trompe déliée, à antennes coudées, & à cuisses simples, à corps oblong, noir, & à étuis cendrés garnis d'éminences par derrière. DEG. *Ib.*

Il a environ deux lignes & demie de long & une ligne de large. La trompe est longue, mince, très-arquée, noire. Les antennes sont noires, coudées, plus longues que le corcelet. Le corcelet est noir, élevé, presque bossu & chagriné. Les élytres sont noires, avec un peu de blanc de chaque côté & l'extrémité blanche; elles sont convexes, striées, avec quelques élévations inégales. Les pattes sont noires, & les cuisses sont simples.

Il se trouve au nord de l'Europe.

34. CHARANSON de la Prêle.

CURCULIO Equiset.

Curculio longirostris, thorace lavi, elytris muticis nigris, punctis duobus apiceque albis. FAB. *Syst. ent. pag. 130 n° 14. — Sp. inf. tom. 1. pag. 165. n° 20 — Mant. inf. tom. 1. pag. 99. n° 26.*

Il ressemble beaucoup au Charanson de la Patience. La trompe est noire, amincie. Le corcelet est noir, à peine tuberculé, avec les côtés blancs. Les élytres sont un peu muriquées, avec les côtés & l'extrémité blancs & la partie antérieure noire, avec deux petits points blancs. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en France, en Angleterre sur la Prêle.

35. CHARANSON raccourci.

CURCULIO abbreviatus.

Curculio longirostris ater, thorace plano punctato, elytris abbreviatis substriatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 16. fig. 195. a. b.*

Curculio abbreviatus. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 99. n° 25.*

Curculio niger, thorace punctato, elytris alter-

natum striatis & punctatis. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 281. n° 9.*

Le Charanson brodé. GEOFF. *Ib.*

Curculio elegans. FOURC. *Ent. par. 1. pag. 118. n° 9.*

Il est un peu plus petit que le Charanson rubétra. Tout le corps est très-noir. Les antennes ont leur masse cendrée à leur extrémité. La trompe est mince, courbée, luisante. Le corcelet est luisant, pointillé, presque caréné. Les élytres sont un peu plus courtes que l'abdomen, légèrement striées, avec deux rangées de points à peine marqués entre les stries. Les jambes sont terminées par un ongle assez fort. Les cuisses sont simples.

Il se trouve aux environs de Paris, & en Saxe.

36. CHARANSON mélanocéphale.

CURCULIO melanocephalus.

Curculio longirostris subglobosus fuscus, capite rostroque nigris.

Curculio melanocephalus longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore subgloboso fusco, capite rostroque nigris, elytris gibbis. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 272. n° 6. pl. 15. fig. 17.*

Charanson à tête & trompe noires à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps court & ovale brun, à tête & trompe noires & à étuis bossus par derrière. DEG. *Ib.*

Il a environ quatre lignes de long, & deux de large. Il ressemble beaucoup au Charanson jayet. Il est ovale, noirâtre, entièrement couvert de petites écailles d'un brun jaunâtre. Les antennes sont coudées, brunes, avec la masse noire. La trompe est noire, mince, un peu plus longue que le corcelet. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés, & une petite gibbosité vers l'extrémité. Les cuisses sont simples.

Il se trouve à Surinam.

37. CHARANSON Crapaud.

CURCULIO Bufo.

Curculio longirostris supra fuscus, elytris fasciâ albâ. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 10. fig. 118.*

Curculio Bufo. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 165. n° 21. — Mant. inf. tom. 1. pag. 99. n° 27.*

Il ressemble au Charanson de la Scrophulaire, mais il est un peu plus grand. Les antennes sont ferrugineuses brunes, coudées. La trompe est mince, cylindrique, de la longueur du corcelet, noire & couverte en-dessus, sur-tout à la base, de petites écailles d'un gris roussâtre. La tête est petite, arrondie, noire, avec quelques petites écail-

les rousâtres. Le corcelet est noir en-dessus, avec quelques écailles rousâtres, il est blanc sur les côtés. L'écusson est blanc, petit & triangulaire. Les élytres sont striées; elles sont noires, couvertes de quelques écailles rouffes, avec une large bande blanche au milieu & quelques points blancs, vers les bords postérieurs. Tout le dessous du corps est blanc. Les pattes sont blanchâtres, avec l'extrémité des cuisses noire, & couverte de petites écailles rousâtres. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures. Les jambes ont une dentelure à leur partie externe.

Il se trouve dans la Sibérie.

38. CHARANSON couleur-de-poix.

CURCULIO picatus.

Curculio longirostris niger nitens, elytris punctato-striatis.

Curculio piceus longirostris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore oblongo nigropiceo. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 221. n°. 14.

Charanson couleur de poix à longue trompe, à antennes coudées brunes & à cuisses simples, à corps oblong entièrement noir & luisant. DEG. Ib.

Il a environ quatre lignes & demie de long & deux & demie de large. La trompe est mince plus longue que le corcelet. Les antennes sont coudées, de la longueur de la trompe. Tout le corps est d'un noir luisant, sans taches. Le corcelet est un peu raboteux. Les élytres ont chacune neuf ou dix stries, formées par des points enfoncés oblongs. Les cuisses sont simples.

Il se trouve au nord de l'Europe.

39. CHARANSON jayet.

CURCULIO gagates.

Curculio longirostris ovatus niger nitidus, elytris obsolete punctato-striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 9. fig. 104.

Il a environ quatre lignes & demie de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. Il est noir luisant & de forme ovale. Les antennes sont d'un brun noirâtre. La trompe est mince, de la longueur du corcelet, un peu arquée. Le corcelet est très-finement pointillé, un peu plus étroit à sa partie antérieure. Les élytres ont des stries à peine marquées, formées par des points enfoncés; elles ont une très-petite gibbosité vers leur extrémité. Les pattes sont noires, & les cuisses sont simples,

Il se trouve à Cayenne.

40. CHARANSON mendiant.

CURCULIO mendicus.

Curculio longirostris, femoribus muticis, ovatus cinereus, immaculatus, elytris striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 9. fig. 108.

Il est petit, ovale, d'une couleur cendrée rousâtre. Les yeux sont noirs. La trompe est cylindrique, presque de la longueur du corcelet. Le corcelet est aussi large que les élytres à sa partie postérieure. Les élytres sont striées. Les cuisses sont sans épines, & sans dentelures.

Il se trouve à Madagascar.

41. CHARANSON bicolor.

CURCULIO bicolor.

Curculio longirostris niger, thorace elytrisque rufis. FAB. Syst. ent. pag. 131. n°. 18. — Spec. inf. tom. 1. pag. 166. n°. 25. — Mant. inf. tom. 1. pag. 99. n°. 32.

Il ressemble pour la forme & la grandeur à l'Atelabe du Bouleau. Les antennes sont noires, droites, filiformes, en masse, ovale à l'extrémité, presque de la longueur de la trompe. La trompe est mince, noire, cylindrique, à peine plus grosse à son extrémité. La tête est arrondie, rougeâtre, avec les yeux noirs. Le corcelet est rougeâtre, arrondi, pointillé. L'écusson est rougeâtre, petit & en cœur. Les élytres ont des stries, dans lesquelles il y a des points enfoncés; elles sont rougeâtres, presque carrées. Les pattes & tout le dessous du corps sont noirs luisants. Les cuisses sont sans dents & sans épines.

Il se trouve en Amérique.

Je n'avois point vu cet insecte, lorsque j'ai fait l'article Atelabe, auquel genre, du depuis, je me suis assuré qu'il appartient.

42. CHARANSON mi-parti.

CURCULIO dimidiatus.

Curculio longirostris niger, elytris striatis rubris. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 1. fig. 5.

Il a de quatre à cinq lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. Les antennes sont noires, coudées. La trompe est mince, noire, lisse, luisante, allongée. Le corcelet est noir, lisse, luisant, un peu plus étroit à sa partie antérieure. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, striées. Le dessous du corps & les pattes sont noirs, les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

43. CHARANSON atrirostre.

CURCULIO atrirostris.

Curculio longirostris cinereus, rostro arcuatus
ALRO

atro. FAB. *Sp. inf. app.* pag. 499. — *Mant. inf.* tom. 1. pag. 99. n^o. 28.

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au Charanson de la Prêle. Tout le corps est cendré, obscur; la trompe seule est noire, courbée. L'extrémité du corps est obtuse. Les pattes sont cendrées; les cuisses sont simples.

Il se trouve à Leipfick

44. CHARANSON tête-bleue.

CURCULIO caruleocephalus.

Curculio longirostris violaceus nitens, thorace elytrisque testaceis. FAB. *Mant. inf.* tom. 1. p. 199. n^o. 33.

Curculio caruleocephalus longirostris atro-caruleus, thorace elytrisque fuisis. ACT. *Hall.* 1. 282.

Il ressemble aux précédens. La tête est pubescente, violette. Le corcelet & les élytres sont pubescens, testacés, luisans. Le corps & les pattes sont violers.

Il se trouve en Saxe, sur l'épine-blanche.

45. CHARANSON cuivreux.

CURCULIO cupreus.

Curculio longirostris obscurè aneus subius obscurior. LIN. *Syst. nat.* pag. 608. n^o. 21. — *Faun. fac.* n^o 593.

Curculio cupreus. FAB. *Syst. ent.* pag. 131 n^o. 20. — *Sp. inf. tom.* 1. pag. 166. n^o. 26. — *Mant. inf. tom.* 1. pag. 100. n^o. 34.

Curculio infidus. SCOP. *Ent. carn.* n^o. 94.

Curculio cupreus LAICHART. *Inf. tom.* 1. pag. 208. n^o. 4.

Il est très-petit. Les antennes sont noires. La trompe est mince, allongée. Le corcelet & les élytres sont cuivreux, raboteux, brillans. Les élytres ont des stries pointillées. Les pattes sont noires. Les cuisses sont simples; elles sont dentées, suivant M. Laicharting.

Il se trouve en Europe.

46. CHARANSON du Tragia.

CURCULIO Tragia.

Curculio longirostris aneus, rostro pedibusque nigris. *Ent. ou hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 10. fig. 112. a. b.

Curculio Tragia. FAB. *Syst. ent.* pag. 131. n^o. 21. — *Sp. inf. tom.* 1. pag. 166. n^o. 27. — *Mant. inf. tom.* 1. pag. 100. n^o. 35.

Il est très-petit, un peu allongé. Les antennes

sont brunes, presque ferrugineuses, coudées. La trompe est cylindrique, courbée, noire, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, & les yeux ne sont pas du tout saillans. Le corcelet est bronzé & légèrement couvert de poils courts, d'un gris roussâtre. L'écuffon est petit & bronzé. Les élytres sont striées, bronzées, avec quelques poils d'un gris roussâtre. Le dessous du corps & les pattes sont d'un noir bronzé, avec quelques poils très-courts, gris roussâtres. Les cuisses sont simples, sans denclures & sans épines. Les tarsi sont d'un brun ferrugineux.

Il se trouve au Brésil, dans les semences du *Tragia volubilis*.

47. CHARANSON bronzé.

CURCULIO aneus.

Curculio longirostris niger, elytris aneis. FAB. *Syst. ent.* pag. 131. n^o. 22. — *Sp. inf. tom.* 1. pag. 166. n^o. 28. — *Mant. inf. tom.* 1. pag. 100. n^o. 36.

Il est petit. Le corps est noir; les élytres seules sont bronzées. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en France, en Angleterre, sur les fleurs.

48. CHARANSON curvirostre.

CURCULIO curvirostris.

Curculio longirostris ater nitidus, rostro arcuato. *Ent. ou hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 10. fig. 115. a. b.

Curculio curvirostris. FAB. *Sp. inf. tom.* 1. pag. 166. n^o. 29. — *Mant. inf. tom.* 1. pag. 100. n^o. 37.

Il est de la grandeur du Charanson du Tragia. Les antennes sont noires, coudées. La trompe est noire, cylindrique, arquée, de la longueur du corcelet. La tête est noire, arrondie, & les yeux ne sont pas du tout saillans. Le corcelet est noir & finement pointillé. Les élytres sont brunes noirâtres, striées, un peu plus courtes que l'abdomen. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont noires; les cuisses sont simples, les jambes sont terminées par un petit ongle.

Il se trouve dans la nouvelle-Hollande.

49. CHARANSON du Prunier.

CURCULIO Pruni.

Curculio longirostris ater, antennis ferrugineis, thorace bituberculato. LIN. *Syst. nat.* pag. 607. n^o. 12.

Curculio Pruni. FAB. *Gen. inf. mant.* pag. 223. — *Sp. inf. tom.* 1. pag. 167. n^o. 30. — *Mant. inf. tom.* 1. pag. 100. n^o. 38.

Curculio fusco-niger, thorace inermi. GEOFF. *Inf. tom. 1. pag. 299. n^o. 49.*

Le Charanson noir, à corcelet sans pointes. GEOFF. *Ib.*

Il est entièrement noir. Les antennes sont d'un brun ferrugineux. Le corcelet est muni postérieurement de deux petits tubercules élevés, presque mucronés. Les élytres sont striées. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Europe, sur les feuilles du Cérifier.

50. CHARANSON quadrituberculé.

CURCULIO quadrituberculatus.

Curculio longirostris, thorace quadrituberculato-nigro, elytris striatis cinereo variegatis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 39.*

Il est petit. La trompe est courbée, noire. Le corps est cendré. La partie supérieure du corcelet est noire, avec quatre tubercules élevés, droits. Les élytres sont striées, mélangées de noirâtre & de cendré. Les pattes sont cendrées, les cuisses postérieures sont noires.

Il se trouve à Kiell.

51. CHARANSON de la Campanule.

CURCULIO Campanula.

Curculio longirostris niger ovatus, elytris striatis. LIN. *Syst. nat. pag. 607. n^o. 7.*

Curculio Campanula. FAB. *Gen. inf. mant. pag. 224. — Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n^o. 31. — Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 40.*

Curculio longirostris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore subglobofo cinereo-nigro, elytris lineis grisis. DEG. *Mém. inf. tom. 5. pag. 236. n^o. 23.*

Charanson de la Campanule, à longue trompe, à antennes coudées, brunes & à cuisses simples, à corps court d'un noir ardoisé, avec des lignes grises sur les étuits. DEG. *Ib.*

Il est petit; & le mâle est encore plus petit que la femelle. Le corps est court, presque arrondi. La trompe plus longue que le corcelet, est déliée, courbée & d'un noir luisant. Les antennes sont coudées, d'un brun obscur. Il est de couleur noire, avec un grand nombre de petits poils gris, mêlés de petites écailles qui rendent cette couleur cendrée ou ardoisée. Les élytres ont des lignes longitudinales formées par des points. Les cuisses sont simples, sans dentelures.

La larve vit dans les boutons & sur les fleurs de la Campanule, ou plus exactement dans les gouffes qui renferment les graines. C'est dans les boutons des fleurs, avant leur épanouissement, que le Charanson introduit son œuf, après quoi le bouton ne s'ouvre plus, mais quoique fermé, ne laisse pas de croître, & devient enfin comme une boule, une vessie ou une galle. La larve qui sort de l'œuf, prend son accroissement dans ce bouton ainsi défiguré, en pénétrant dans la gouffe des graines dont elle mange toute la substance intérieure. Elle s'y métamorphose pour en sortir sous la forme d'insecte parfait dans le printemps suivant.

52. CHARANSON fuscirostre.

CURCULIO fuscirostris.

Curculio longirostris griseus, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris. FAB. *Syst. ent. pag. 131. n^o. 23. — Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n^o. 32. — Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 41.*

Il est petit, & il ressemble au Charanson du Chêne. La trompe est allongée, cylindrique, noire. Le corcelet & les élytres sont striées, grisâtres, avec deux ou trois lignes blanches. Les élytres sont striées. Les pattes sont fauves, avec la base des cuisses noire.

Il se trouve en Allemagne.

53. CHARANSON du Roure.

CURCULIO Roboris.

Curculio longirostris, rostro thorace que rufis, elytris violaceis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 41.*

Il est petit. La tête est violette, avec la trompe allongée rougeâtre. Le corcelet est arrondi, lisse, rougeâtre, sans taches. Les élytres sont à peine striées, violettes, luisantes, sans taches.

Il se trouve en Saxe sur le Chêne.

54. CHARANSON cuprirostre.

CURCULIO cuprirostris.

Curculio longirostris oblongus, viridi-aeneus, elytris striatis, rostro cupreo. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 43.*

Curculio cerulco-viridis nitens, thorace punctato, elytris striatis. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 284. n^o. 16.*

Le Charanson satin-vert. GEOFF. *Ib.*

Curculio parifinus elytris thoraceque viridibus, rostro pedibusque nigris. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1753.*

Thumb. *nov. Act. Ups. 4. pag. 16. n^o. 27.*

Curculio viridis. FOURC. Ent. par. 1. pag. 110. n^o. 16.

Il est petit, oblong. Les antennes sont noires. La trompe est allongée, courbée, un peu cuivreuse. Le corcelet est d'un vert bronzé brillant. Les élytres sont striées, d'un vert brillant, sans taches. Les pattes sont noirâtres.

Il se trouve en Europe, sur le Bouleau & différentes plantes.

55. CHARANSON nigrirostre.

CURCULIO nigrirostris.

Curculio longirostris viridis, rostro atro. FAB. Syst. ent. pag. 131. n^o. 24. — Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n^o. 33. — Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 44.

Il est petit. Les antennes sont ferrugineuses brunes, coudées. La trompe est noire, cylindrique, courbée, plus courte que le corcelet. La tête est petite, arrondie, brune, noirâtre, avec les yeux noirs & point du tout saillans. Le corcelet est couvert de poils courts, serrés, verdâtres. L'écusson est noir, triangulaire, très-petit. Les élytres sont striées, couvertes de poils courts, serrés, verdâtres. Le dessous du corps est noirâtre. Les pattes sont d'un brun ferrugineux, plus ou moins obscur. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Angleterre.

56. CHARANSON variable.

CURCULIO variabilis.

Curculio longirostris subtestaceus, thorace viridi lineato, rostro apice fusco. FAB. Gen. inf. mant. p. 214. — Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n^o. 34. — Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 45.

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont fauves, avec la masse cendrée. La tête est d'une couleur testacée pâle, avec l'extrémité de la trompe noirâtre. Le corcelet est obscur, avec trois lignes distinctes vertes. Les élytres sont d'une couleur rougeâtre pâle, & couvertes d'une poussière verdâtre. Les pattes sont fauves.

Il se trouve à Hambourg.

57. CHARANSON rufirostre.

CURCULIO rufirostris.

Curculio longirostris niger, rostro dimidiato pedibusque rufis. FAB. Syst. ent. pag. 132. n^o. 25. — Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n^o. 35. — Mant. inf. tom. 1. pag. 100. n^o. 46.

Il est petit & presque de la grandeur du Charanson bronzé. Les antennes sont droites, fauves, de la longueur de la trompe. La trompe est fauve depuis l'insertion des antennes, jusqu'à l'extrémité;

l'extrémité est un peu noire. La tête est noirâtre, les yeux sont arrondis, un peu saillans. Le corcelet est noirâtre. Les élytres sont ovales, bronzées, noirâtres, striées. Le corps en-dessous, est couvert de poils courts, grisâtres. Les pattes sont fauves, & les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures.

Il se trouve en Angleterre.

58. CHARANSON picirostre.

CURCULIO picirostris.

Curculio longirostris oblongus niger argento holosericeus, rostro dimidiato pedibusque piceis. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 101. n^o. 47.

Il ressemble au Charanson rufirostre, mais il est un peu plus grand. La tête est noire. La trompe est allongée & la moitié brune. Le corcelet & les élytres sont noirs & légèrement couverts d'un duvet argenté foyeux. Les pattes sont brunes, avec les genoux noirs.

Il se trouve à Copenhague.

59. CHARANSON de la Salicaire.

CURCULIO Salicaria.

Curculio longirostris niger, antennarum basi, coleopterorum disco pedibusque pallide testaceis. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n^o. 36. — Mant. inf. tom. 1. pag. 101. n^o. 48.

Il est très-petit. Les antennes sont coudées, fauves, avec la masse ovale, allongée noirâtre. La trompe est noire, cylindrique, courbée, de la longueur du corcelet. La tête est petite, presque arrondie, noire, & les yeux sont noirs, très-peu saillans. Le corcelet est noir, sans taches. L'écusson est noir, triangulaire & très-petit. Les élytres sont striées, noires, avec tout le milieu fauve cendré. Le dessous du corps est noir, avec un peu de blanc de chaque côté de la poitrine. Les pattes sont fauves. Les cuisses sont simples, un peu renflées, avec l'extrémité un peu obscure.

Il se trouve en Angleterre.

60. CHARANSON péricarpe.

CURCULIO pericarpus.

Curculio longirostris subglobosus nebulosus, coleopteris macula cordata alba. LIN. Syst. nat. pag. 609. n^o. 31. — Faun. succ. n^o. 602.

Curculio pericarpus. FAB. Syst. ent. pag. 132. n^o. 26. — Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n^o. 37. — Mant. inf. tom. 1. pag. 101. n^o. 49.

Curculio subglobosus, fusco-nebulosus; macula cordata alba in medio dorso. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 298. n^o. 46.

Le Charançon porte-cœur de la Scrofulaire.
GEOFF. *Ib.*

Curculio pericarpus. SCHRANK. *Enum. inf. aust.*
n^o. 209.

Curculio pericarpus. LAICHART. *inf. tom. 1. pag.*
223. n^o. 17.

Curculio pericarpus. FOURC. *Ent. par. 1. pag.*
130. n^o. 49.

Curculio pericarpus. VILL. *Ent. tom. 1. pag.*
182. n^o. 27.

Il ressemble au Charançon de la Scrofulaire, mais il est plus petit. Tout le corps est noirâtre, légèrement couvert d'un duvet grisâtre. La trompe est noire, mince, longue. Les élytres sont striées & ont une tache blanche, presque en cœur, placée sur la suture, un peu au-dessous de l'écusson. Les pattes sont noirâtres. Les cuisses sont sans épines, ou quelquefois munies d'une seule petite épine.

Il se trouve en Europe, sur la Scrofulaire.

61. CHARANÇON du Sifymbrium.

CURCULIO Sifymbrii.

Curculio longirostris albo fuscoque varius, elytris puncto baseos elevato atro, rostro nigro. FAB. *GEN. inf. Mant. pag. 224.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 168. no. 38.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 101. n^o. 50.*

Il est petit. La trompe est allongée, noire. Les antennes sont noirâtres, le corcelet est blanc, avec une tache au milieu noire, dans laquelle on remarque une ligne longitudinale blanche. Les élytres sont mélangées de blanc & de noirâtre, avec un petit point noir oblong. Le dessous du corps est blanchâtre.

Il se trouve à Kiell, & aux environs de Paris, sur la plante nommée *Sifymbrium amphibium*.

62. CHARANÇON caprier.

CURCULIO Caprea.

Curculio longirostris, coleoptris fasciis duabus abbreviatis undatis albis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 168. n^o. 39.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 101. n^o. 51.*

Il est très-petit. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est noire & de la longueur du corcelet. La tête est noire, presque arrondie. Les yeux sont noirs, assez grands & point laissans. Le corcelet est noir, avec une ligne longitudinale plus ou moins marquée, formée par des poils courts, d'un gris roussâtre. L'écusson est petit & couvert des mêmes poils. Les élytres sont noires striées, avec deux bandes blanchâtres, ondées, dont l'antérieure touche presque aux bords latéraux, & dont la seconde est plus courte & plus

petite. Tout le dessous du corps est noir. Les pattes sont noires, & les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures. Il y a à l'extrémité des élytres une petite impression. Les stries sont pointillées.

Il se trouve en Angleterre, sur le Saule caprier, *Salix Caprea*.

63. CHARANÇON Grenouille.

CURCULIO Rana.

Curculio longirostris thorace fusco: limbo testaceo, elytris testaceis, fasciis tribus undatis cinereis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 101. n^o. 52.*

Il est petit, bossu. La tête est noirâtre. La trompe est longue, testacée à son extrémité. Le corcelet est noirâtre, avec tout le bord testacé. Les élytres sont striées, testacées, avec trois bandes cendrées. Le corps est cendré. Les pattes sont testacées.

Il se trouve à Kiell.

64. CHARANÇON du Vêlar.

CURCULIO Erysmi.

Curculio longirostris niger, thorace bituberculato virecente, elytris cyaneis. FAB. *Mant. inf. t. I. p. 101. n^o. 54.*

Il ressemble à l'Atelabe bleuet; mais il est plus arrondi. La trompe est allongée, courbée, noire. Le corcelet est d'un vert foncé, avec un tubercule élevé de chaque côté. Les élytres sont striées, bleues. Les pattes sont noires.

Il se trouve à Kiell, aux environs de Paris.

65. CHARANÇON quadrimaculé.

CURCULIO quadrimaculatus.

Curculio longirostris nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis. LIN. *Syst. nat. p. 609. n^o. 29.* — *Faun. suec. n^o. 600.*

Curculio quadrimaculatus. FAB. *Syst. ent. p. 133. n^o. 31.* — *Sp. inf. tom. 1. p. 169. n^o. 44.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 101. n^o. 58.*

Curculio cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo, proboscide thorace longiore. GEOFF. *Inf. tom. 1. p. 287. n^o. 22.*

Le Charançon quadrilla à longue trompe. GEOFF. *Ib.*

Curculio quinque maculatus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 122. n^o. 22.*

Curculio quadrimaculatus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 181. n^o. 25.*

Il a environ deux lignes de long, de la tête à

l'anus. La trompe est noire, mince, plus longue que le corcelet. Les antennes sont noires. Le corcelet est noirâtre. Les élytres sont striées, & ont un point blanc commun à l'écusson, un autre à l'extrémité, & un de chaque côté vers le bord extérieur.

Il se trouve en Europe.

66. CHARANSON bifascié.

CURCULIO bifasciatus.

Curculio longirostris niger, elytris fasciis duabus cinereis, baseos majorc undata. FAB. *Gen. inf. mant. pag. 125.* — *Sp. inf. tom. 1. p. 169. n.º. 45.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 102. n.º. 60.*

Il est petit. La trompe est longue, cylindrique, noire. Les antennes sont noires, avec la masse qui les termine, cendrée. Le corcelet est arrondi, noir, avec une ligne longitudinale au milieu, un peu plus pâle. L'écusson est cendré. Les élytres sont striées avec deux bandes ondées, cendrées, qui vont à peine jusqu'aux bords extérieurs: la première placée vers la suture, est assez grande; l'autre placée vers le milieu, est beaucoup plus étroite. Les pattes sont noires; les cuisses sont simples.

Il se trouve à Kiell.

67. CHARANSON unifascié.

CURCULIO unifasciatus.

Curculio longirostris supra fuscus: fascia media cinerea. FAB. *Mant. inf. tom. 1. p. 101. n.º. 59.*

Il est de grandeur moyenne. La tête est noirâtre, avec la trompe allongée, arquée, noire. Le corcelet est noirâtre en-dessus, cendrée en-dessous. Les élytres sont presque striées, noirâtres, avec une large bande au milieu, cendrée, & une petite ligne de la même couleur, vers l'extrémité. Le dessous du corps est cendré. Les pattes sont noires, avec les cuisses blanchâtres.

Il se trouve en Saxe.

68. CHARANSON du Lythrum.

CURCULIO Lythri.

Curculio longirostris ater, elytris fascia media abbreviata punctoque postico albis, pedibus flavis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. p. 102. n.º. 61.*

Il est petit. La tête & le corcelet sont noirs, luisans, sans taches. Les élytres sont striées, noires, avec une bande au milieu, blanche, qui ne touche point au bord extérieur; derrière la bande, on aperçoit un point blanc, petit, oblong. Les pattes sont jaunes, avec les articulations noires.

Il se trouve au nord de l'Europe, sur les fleurs du Lythrum.

69. CHARANSON acidule.

CURCULIO acridulus.

Curculio longirostris piceus, abdomine ovato. LIN. *Syst. nat. pag. 607. n.º. 13.* — FAUN. *Juec. n.º. 584.*

Curculio acridulus. FAB. *Syst. ent. pag. 133. n.º. 32.* — *Sp. inf. tom. 1. p. 169. n.º. 46.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 102. n.º. 62.*

Curculio pyriformis nigro-carulescens abdomine ovato. GEOFF. *Inf. tom. 1. pag. 290. n.º. 32.*

Le Charanson pyriforme. GEOFF. *lb.*

Curculio longirostris arcuatus, antennis frætilis fuscis, femoribus muticis, corpore ovato nigro-fusco, tibiis pallidis. DEG. *Mém. inf. tom. 5. p. 235. n.º. 22.*

Charanson acidule à longue trompe courbée, à antennes coudées d'un brun clair & à cuisses simples, à corps ovale, d'un brun noirâtre, & à jambes d'un brun clair. DEG. *lb.*

Curculio acridulus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 125. n.º. 32.*

Curculio acridulus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 176. n.º. 10.*

Curculio acridulus. FUESL. *Archiv. inf. 4. pag. 72. n.º. 24. tab. 24. fig. 12.*

Il a environ deux lignes de long. Son corps a une figure ovale allongée. La trompe est mince, courbée, plus longue que le corcelet, d'un noir luisant. Le corcelet est arrondi, pointillé, d'un brun noirâtre luisant. Les élytres sont striées, d'un brun noirâtre luisant. Les antennes sont noires, coudées. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve en Europe, sur les plantes crucifères.

70. CHARANSON dorsal.

CURCULIO dorsalis.

Curculio longirostris, elytris rubris sutura nigra. *Ent. ou hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 14. fig. 169. a. b.*

Curculio dorsalis. LIN. *Syst. nat. pag. 608. n.º. 17.* — FAUN. *Juec. n.º. 588.*

Curculio dorsalis. FAB. *Syst. ent. pag. 133. n.º. 35.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 170. n.º. 50.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 102. n.º. 66.*

Il est petit. Les antennes sont coudées, noires, avec le premier article long & ferrugineux. La trompe est noire, cylindrique, courbée & plus longue que le corcelet. La tête est arrondie, & les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est arrondi, noir, pointillé. L'écusson est noir &

Les élytres sont striées, & les stries ont une suite de points enfoncés; elles sont rouges, avec la suture noire depuis la base jusqu'au de-là du milieu. Le dessous du corps est noir, les pattes sont entièrement noires dans les individus que j'ai vus & les cuisses sont sans épines & sans dentelures.

Il se trouve au nord de l'Europe, sur une espèce de Renouëlle, *Ranunculus ficaria*.

71. CHARANSON du Chêne.

CURCULIO Quercus.

Curculio longirostris cinereus thoracis dorso fusco, elytris testaceis cinereo undatis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 102. n° 67.*

Curculio Quercus, longirostris pallidè flavus, oculis nigris. LIN. *Syst. nat. pag. 609. n° 25.* — *Faun. suec. n° 596.*

Il est petit. Le corps est cendré. La trompe est noire. Le corcelet est obscur, avec une ligne longitudinale au milieu, plus pâle. Les élytres sont striées, testacées, pâles avec quatre ou cinq bandes ondées, cendrées. Les pattes sont testacées.

Il se trouve en Suede, sur les feuilles de Chêne.

72. CHARANSON futural.

CURCULIO futuralis.

Curculio longirostris ovatus fuscus, linea longitudinali alba. FAB. *Syst. ent. pag. 133. n° 36.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 170. n° 51.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 102. n° 68.*

Il est petit. La trompe est allongée, arquée, noire. Le corcelet est noirâtre, avec une ligne longitudinale blanche. Les élytres sont striées, élevées-noirâtres, avec la suture blanche. Le dessous du corps est cendré.

Il se trouve en Allemagne sur le Saule.

73. CHARANSON en-croix.

CURCULIO crux.

Curculio longirostris ater, thorace punctis duobus bascos, elytris sutura punctisque sparsis albis. FAB. *Gen. inf. Mant. pag. 225.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 170. n° 52.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 102. n° 69.*

Curculia crux. FUESL. *Archiv. inf. 4. pag. 70. n° 14. tab. 24. fig. 6.*

Curculio crux. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 188. n° 32. tab. 1. fig. 20.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur au Charanson futural. La tête est noire, sans taches. La trompe est allongée, noire, luisante. Le cor-

celet est arrondi, noir, avec un point blanc de chaque côté à la base. L'écusson est blanc. Les élytres sont striées, noires, avec la suture vers la base & quelques points blancs. Les pattes sont noires. Le dessous du corps est couvert d'un léger luvet blanchâtre.

Il se trouve en Europe.

74. CHARANSON exclamation:

CURCULIO exclamationis.

Curculio longirostris ater, elytris puncto lineoque apicis albis. Ent. ou *hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 165. a. b.*

Curculio exclamationis. FAB. *Syst. ent. pag. 133. n° 37.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 170. n° 53.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 102. n° 70.*

Il est très-petit. La trompe est d'un noir brun & de la longueur du corcelet. Les antennes & tout le corps sont noirs luisans. La tête & le corcelet sont pointillés. L'écusson est très-petit. Les élytres sont striées, & elles ont chacune un point blanc vers le milieu, & une ligne longitudinale blanche derrière le point vers l'extrémité. Les cuisses sont simples, sans épines.

Il se trouve dans la nouvelle-Hollande.

75. CHARANSON gracieux.

CURCULIO venustus.

Curculio longirostris fuscus, thorace elytrisque albo lineatis, pedibus testaceis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 170. n° 54.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 102. n° 71.*

Il est très-petit un peu allongé. Les antennes sont brunes, un peu testacées. La trompe est presque aussi longue que le corcelet, elle est noirâtre, avec une ligne longitudinale formée par des poils d'un gris roussâtre. Le corcelet est brun, pointillé, avec trois lignes longitudinales formées par des poils d'un gris roussâtre. L'écusson est très-petit & couvert de poils gris roussâtres. Les élytres sont brunes, avec deux lignes longitudinales formées de poils gris roussâtres, dont l'une interne un peu oblique, & l'autre externe sur le bord extérieur. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés. Le dessous du corps est brun. Les pattes sont d'un brun-testacé. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dents.

Il se trouve en Angleterre.

76. CHARANSON du Plantain.

CURCULIO Plantaginis.

Curculio longirostris, elytris cinereis, macula media fusca. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n° 72.*

Curculio Plantaginis longirostris antennis fractis femoribus muticis, corpore ovato griseo; thorace fuscis elytris, macula magna punctisque fuscis. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 237. n°. 24. pl. 7. fig. 17. & 18.

Charanson du plantain à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps court & ovale d'un gris clair, à bandes brunes sur le corcelet, à points & une grande tache brune sur les étuis. DEG. Ib.

Il est petit, court & ovale, d'un gris clair. La trompe est cylindrique, corbée, de la longueur du corcelet. Les antennes sont coudées, d'un brun obscur. Le corcelet est brun, avec trois raies longitudinales grises. Les élytres sont d'un gris presque testacé, avec une grande tache obscure sur chaque, & quelques points oblongs, de la même couleur. Les pattes sont fauves, avec les tarses noirs.

La larve est petite, d'un vert clair, avec une raie blanche bien marquée tout le long du dos. Le corps est divisé en anneaux, mais qui ne sont pas bien distincts, à cause d'un grand nombre de rides transversales dont la peau est garnie; en-dessous on voit sur chaque anneau, une paire de mammelons, avec lesquels la larve marche en s'attachant aux feuilles par une liqueur gluante qu'elle en fait sortir. La loupe fait découvrir sur la peau, de très-petits points noirs arrangés en lignes transversales, de chacun desquels sort un petit poil très-court. Elle vit sur le Plantain, & file sa coque vers le mois de juillet, sur les fleurs ou les épis de cette plante. Cette coque, d'un vert jaunâtre, a la figure d'une boule allongée, & ses parois minces & élastiques, laissent paroître l'insecte au travers & vis-à-vis du grand jour. C'est vers la fin du même mois, que le Charanson sort de la coque où il a subi sa métamorphose.

Il se trouve en Europe.

77. CHARANSON de l'Oseille.

CURCULIO Rumicis.

Curculio longirostris griseus nigro nebulosus, antennis fuscis. FAB. Syst. ent. pag. 134. n°. 38.— Sp. inf. tom. 1. pag. 170 n°. 55.— Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n°. 73.

Curculio Rumicis longirostris griseus nigro nebulosus oblongus, pedibus dentatis, antennis subfuscis. LIN. Syst. nat. pag. 614. n°. 60.— Faun. succ. n°. 590.

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo griseo-nebuloso, thorace fuscis bians nigricantibus, pedibus fuscis. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 231. n°. 20. pl. 7. fig. 10 & 11.

Charanson de la patience à longue trompe, à antennes coudées, à cuisses simples, à corps long, gris tacheté de brun obscur, à deux bandes noirâtres sur le corcelet, & à pattes brunes. DEG. Ib.

Scarabeus parvus, corpore su'longo, totus obscurè rufus seu fuscus, punctis nigricantibus adpersus. RAJ. inf. pag. 85. n°. 36.

Curculio Rumicis. VILL. Ent. tom. 1. pag. 197. n°. 94.

Il a environ trois lignes de long sur une de large. La trompe est noire, cylindrique, assez mince, de la longueur du corcelet. Les antennes sont obscures. Le corcelet est cendré, avec deux raies longitudinales noirâtres plus ou moins marquées. Les élytres sont striées, cendrées, avec une grande tache carrée, obscure à la base, & quelques petites taches noirâtres. Le dessous du corps est cendré. Les pattes sont brunes.

La larve vit en nombreuse compagnie, sur la plante nommée Patience, en latin *Lapathum* ou *Rumex*; dont elle ronge les feuilles & même les fleurs: on l'y trouve aux mois de juin & de juillet. Elle a trois lignes de longueur & environ une de largeur. La tête, d'un noir luisant, est écailleuse & semblable en général à celle des chenilles, ayant des dents, des lèvres & des barbillons: on voit aussi une filière à la lèvre inférieure. Le corps divisé en douze anneaux, est garni de rides transversales, & vers les côtés, de deux plis qui s'étendent dans toute sa longueur. Les trois premiers anneaux sont entièrement noirs en-dessus & vers les côtés, mais en-dessous, ils sont d'un jaune clair & verdâtre, & cette dernière couleur est aussi celle du dessous & des côtés des autres anneaux. Tout le long du dos, on voit régner une ligne du même jaune, & chaque anneau, excepté les trois premiers, a en-dessus une raie transversale élevée de la même couleur, garnie de tubercules hémisphériques, noirs & luisans; on voit aussi des tubercules semblables dans d'autres endroits du corps, & en particulier sur les plis longitudinaux qui s'étendent le long des côtés. Chaque tubercule est garni d'un petit poil noir. Chacun des trois premiers anneaux porte en-dessous deux mammelons charnus, semblables en quelque manière aux pattes membraneuses des faulles-chenilles, & qui tiennent lieu de pattes à la larve. Les autres anneaux ont aussi chacun une paire de mammelons ou d'éminences charnues, mais moins longues que les précédentes, qui servent aussi à la marche, la larve les posant réciproquement sur les feuilles & les tiges; comme les faulles-chenilles y appuient leurs pattes membraneuses, en sorte que l'on pourroit très-bien regarder tous ces mammelons, comme des espèces de pattes, quoiqu'ils n'aient pas de crochets, à quoi l'auteur de la nature a pourvu

d'une autre manière, le dessous du corps de ces larves étant toujours couvert & comme enduit d'une matière humide & visqueuse, qui les maintient fixées sur les tiges & les feuilles, & les empêche de tomber. Pour se transformer en nymphes, elles filent des coques sur les tiges mêmes de la plante, ou bien entre les fleurs & la graine au sommet de la tige. Ces coques sont fort jolies, & environ de la grandeur d'un pois ordinaire; elles sont presque parfaitement sphériques, faites d'une soie jaune ou blanche, que les larves filent à grandes mailles & à couche simple, de façon que l'insecte paroît assez distinctement à travers les parois: le tissu des coques est comme celui d'un filet ou plutôt d'une grosse gaze. En filant la coque, la larve tient toujours le corps courbé en demi cercle, & c'est de cette position que dépend la rondeur de la coque, le corps de la larve servant de moule pour lui donner cette forme. Les fils dont elle est composée, sont assez gros, ils ont de l'élasticité, de façon qu'étant pressés du doigt, ils se remettent dans leur première situation dès qu'on l'ôte. Peu de jours après, les larves prennent la forme de nymphes toutes noires & plus courtes, dont la tête & le derrière sont garnis de longs poils noirs. On leur voit toutes les parties de l'insecte ailé, comme emmaillottées, & la trompe est couchée sur le dessous du corps entre les pattes. Au bout de quelques jours, dans le mois de juillet, les Charançons paroissent au jour, en perçant la coque d'une ouverture avec les dents.

78. CHARANSON DU BLÉ.

CURCULIO granarius.

Curculio longirostris piceus oblongus, thorace punctato longitudine elytrorum. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 16. fig. 196. a. b.

Curculio granarius. LIN. Syst. nat. pag. 608. n^o. 16.—Fauv. succ. n^o. 587.

Curculio granarius. FAB. Syst. ent. pag. 134. n^o. 39. — Sp. inf. tom. 1. pag. 171 n^o. 56. — Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n^o. 74.

Curculio rufo-testaceus oblongus, thorace elytrorum ferè longitudine. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 285. n^o. 18.

Le Charançon brun du Bled. GEOFF. Ib.

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo fusco-castaneo, thorace longitudine elytrorum. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 239. n^o. 25.

Charançon du bled à longue trompe, à antennes coudées à cuisses simples, à corps allongé d'un brun de marron obscur, & à corcelet de la longueur des étuis, DEG. Ib.

Luwenh. Litt. 6. august. 1687. pag. 74. 83. fig. 1.

Scarabæus parvus corpore breviorè, sordidè seu obscurè fulvus, proboscide longa deorsum arcuata. RAJ. inf. pag. 88.

Curculio granarius. SCOP. Ent. carn. n^o. 89. Curculio granarius. SCHRANK. Enum. inf. aust. n^o. 207.

Curculio granarius. LAICHART. inf. tom. 1. pag. 208. n^o. 14.

Curculio granarius. FOURC. Ent. par. 1. pag. 121. n^o. 18.

Curculio granarius. VILL. Ent. tom. 1. pag. 177. n^o. 13.

JOBLOT. obs. microsc. 1754. tab. 7. fig. 1.

VOET. Coleopt. pars 2. tab. 37. fig. 17.

Il a une forme allongée, & a à peine une ligne & demie de long. Tout le corps est brun. La trompe est cylindrique, un peu courbée, presque de la longueur du corcelet. La tête est arrondie. Le corcelet est presque de la longueur des élytres & fortement pointillé. Les élytres sont striées, & les stries sont pointillées. Les cuisses n'ont point d'épines. Les jambes sont terminées par un crochet assez fort.

Ce petit insecte, connu aussi sous le nom de *Calandre*, se multiplie considérablement dans les greniers & les magasins de blé de toute espèce, dans lesquels il fait de terribles dégâts, sur-tout dans son état de larve, en consommant toute la substance farineuse du grain, & n'en laissant que l'écorce. Leeuwenhok a fait plusieurs observations sur ces insectes pernicious, & il a trouvé que pour se multiplier, le Charançon, après avoir eu la compagnie du mâle, fait avec sa trompe un trou au grain de froment, & dépose un œuf dans ce trou, d'où naît un petit ver ou une petite larve, qui mange en se développant toute la substance intérieure du grain, & qui ensuite se transforme en nymphe dans le grain vuide, & y prend enfin la forme de Charançon, qui se fait jour en perçant l'écorce. La larve est blanche & garnie d'une grosse tête écailleuse, avec des dents, au moyen desquelles elle ronge la substance du grain. On ne trouve jamais qu'un seul de ces insectes dans chaque grain, parce que chaque Charançon demande un grain entier pour parvenir à sa grandeur complète.

79. CHARANSON DU RIZ.

CURCULIO Oryza.

Curculio longirostris oblongus piceus, elytris crenato-striatis, maculis duabus ferrugineis. Ent.

ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 7. fig. 81. a. b.

Curculio longirostris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis. LIN. *Amen. acad. tom. 6. pag. 395. n° 19.*

Curculio Oryzæ longirostris piceus, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis. FAB. *Syst. ent. pag. 134. n° 40.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 171. n° 57.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n° 75.*

Curculio frugilegus longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo castaneo, coleopteris maculis quatuor rufis, thorace longitudine elytrorum. DEG. *Mém. inf. tom. 5. pag. 273. n° 7.*

Charanson des grains, à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps allongé d'un brun de marron obscur, à quatre taches rousses sur les étuis & à corcelet de la longueur des étuis. DEG. *Ib.*

Il ressemble beaucoup au précédent pour la forme & la grandeur. Les antennes sont d'un brun ferrugineux. Tout le corps est d'un brun noirâtre. Le corcelet est chagriné. Les élytres ont des points enfoncés assez gros, rangés en stries, & deux taches ferrugineuses, l'une à la base, & l'autre à l'extrémité.

La larve attaque le Riz. Il n'est pas rare de trouver l'insecte mort dans le Riz qui nous vient des pays étrangers. Je l'ai reçu de M. Geoffroy de Ville-Neuve qui l'avoit trouvé au Sénégal en très-grande quantité sur les grains de Mil.

80. CHARANSON anal.

CURCULIO analis.

Curculio longirostris oblongus niger, elytris striatis apice ferrugineis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 16. fig. 197. a. b.

Il est à peine plus grand que le Charanson du Blé, auquel il ressemble beaucoup. Tout le corps est noir. La trompe est cylindrique, un peu courbée. Le corcelet est finement pointillé, un peu moins allongé que dans le Charanson du Blé. Les élytres sont striées. On aperçoit entre chaque strie, une rangée de points à peine marqués. L'extrémité des élytres est d'un brun ferrugineux. Les cuisses n'ont point de dentelures. Les jambes sont terminées par un crochet assez fort.

J'ai trouvé cet insecte en Provence.

81. CHARANSON bituberculé.

CURCULIO bituberculatus.

Curculio longirostris ferrugineus, thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorsalibus elevatis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 13. fig. 167. a. b.

Curculio bituberculatus. FAB. *Sp. inf. t. 1. p. 171. n° 58.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n° 76.*

Il ressemble entièrement pour la forme & la grandeur, au Charanson du Blé. Tout le corps est d'une couleur ferrugineuse brune, sans taches. La trompe & la tête prises ensemble, sont de la longueur du corcelet. Les yeux sont noirs. Le corcelet est fortement pointillé, & presque de la longueur des élytres. L'écusson est très-petit, à peine apparent. Les élytres ont des stries régulières, très-rapprochées, formées par des points assez grands, enfoncés. Les cuisses sont simples. Les jambes sont terminées par un ongle crochu, très-fort, semblable à celui du Charanson palmiste.

L'individu que j'ai vu dans le Muséum de M. Banks, n'avoit point de tubercules élevés sur le corcelet, ainsi que l'a remarqué M. Fabricius.

Il se trouve dans la nouvelle-Zélande.

82. CHARANSON paraplectique.

CURCULIO paraplecticus.

Curculio longirostris cylindricus subcinereus, elytris mucronatis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 9. fig. 106.

Curculio paraplecticus. LIN. *Syst. nat. pag. 610. n° 34.* — *Faun. suec. n° 604.*

Curculio fuscus oblongus elytris rectis acuminatis. LIN. *Faun. suec. n° 445.* — *It. scan. pag. 184.*

Curculio paraplecticus. FAB. *Syst. ent. pag. 135. n° 44.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 172. n° 602.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n° 77.*

Curculio oblongus, elytris villosis cinereis, sutura nigra. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 279. n° 4.*

Le Charanson à suture noire. GEOFF. *Ib.*

Curculio phellandrii longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo cylindrico griseo-viridi-flavescente, elytris acuminatis remotis. DEG. *Mém. inf. tom. 5. pag. 224. n° 18. Pl. 7. fig. 3.*

Charanson de la Philandrie à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps cylindrique allongé d'un vert gris & jaunâtre, à étuis pointus & béants. DEG. *Ib.*

SCHAEFF. *Icon. inf. tab. 44. fig. 1.*

Curculio paraplecticus. SULZ. *hist. inf. tab. 4. n° 7.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 37. fig. 21.*

SCHREB. *Sammlung. II. 336. tab. 4.*

Curculio paraplëticus. LAICHART. *inf. tom. I.*
Pag. 225. n^o. 19.

Curculio paraplëticus. FOURC. *Ent. par. I. pag.*
117. n^o. 4.

Curculio paraplëticus. VILL. *Ent. tom. I. pag.*
183. n^o. 29.

Il a près de sept lignes de long depuis la tête jusqu'à l'extrémité des élytres. Tout le corps est noirâtre, légèrement couvert d'un duvet d'un gris olivâtre. La trompe est cylindrique, un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont d'un brun ferrugineux, avec la masse qui les termine, d'une couleur cendrée noirâtre. La tête est arrondie. Le corcelet a quelquefois quatre lignes longitudinales cendrées, très-peu marquées. Les élytres sont terminées en pointes aiguës; on y remarque plusieurs rangées de points enfoncés, disposés par paires. Les pattes sont noirâtres, simples.

Ce Charançon est en quelque sorte devenu fameux par les observations de Linné, qui a cru devoir lui attribuer la cause d'une certaine maladie que prennent les chevaux en mangeant d'une espèce de plante, qui sert de nourriture à la larve. C'est dans les grosses tiges de la Philandrie, *Phellandrium*, plante ombellifère qui croît dans l'eau en très-grande quantité, dans quelques contrées, qu'on trouve ces larves, au mois de juin & au commencement de juillet. Linné pense que cette plante est le *Stakra* des Suédois, laquelle étant mangée par les chevaux, leur donne la maladie connue sous le nom de *Paraplégie*, & en Suède sous celui de *Stakra*, nom de la plante même. Il prétend que ce n'est pas proprement la plante qui est dangereuse, mais que les larves qui vivent dans les tiges, ou plutôt les Charançons qui en proviennent, sont l'unique cause de la maladie; & il a cru observer, que les plantes de cette espèce qui ne sont point habitées par ces insectes, peuvent être mangées sans risque par les chevaux. Pour trouver la larve, on n'a qu'à fendre la tige de haut en bas, elle y est placée toujours la tête en haut, & choisit pour sa demeure la portion de la tige qui est submergée, où elle se nourrit de la substance intérieure, ou de la moëlle qui y est renfermée. Chaque tige n'en loge qu'une seule. Cette larve est longue d'environ sept lignes, & le diamètre de sa grosseur, est d'un peu plus d'une ligne; elle est toute blanche ou couleur de lait un peu jaunâtre; la tête est seulement d'un brun jaunâtre. Le corps qui est de grosseur à-peu près égale dans toute son étendue, excepté vers le derrière où il se termine en forme conique, est divisé en douze anneaux, dont les trois premiers ont chacun en-dessous vers les côtés, deux tubercules membraneux en forme de mamelons, placés comme les pattes des larves hexapodes, & pouvant avoir les mêmes usages; mais ils sont moins longs.

Les anneaux sont garnis sur le dos de rides transversales, découpées assez profondément, & y formant des éminences & des inégalités charnues, qui l'aident à avancer, particulièrement quand elle est dans la tige; c'est aussi pour cela qu'elle se met sur le dos, quand elle veut cheminer sur un plan uni, en alongeant & en raccourcissant ces anneaux, le ventre n'ayant pas de telles inégalités mais étant tout-à-fait lisse. Sur le long des côtés du corps, dont la peau est toute rase, on voit une espèce de pli & de petits points d'un brun pâle, ovales, à rebords un peu élevés & garnis au milieu d'une petite fente; ce sont les stigmates au nombre de neuf de chaque côté, placés comme dans les chenilles. Le derrière, qu'elle tient ordinairement un peu courbé, est un peu fourchu au bout, ayant une petite incision où se trouve l'anus. La tête, qui est ovale & couverte d'une peau écailleuse, ressemble à celle des chenilles, étant composée comme elle de deux demi-calottes & d'une pièce triangulaire en devant, qui sont séparées les unes des autres par une suture blancheâtre. Au devant, cette tête a deux lèvres, dont l'inférieure est garnie de trois petites parties coniques, dont celle du milieu ressemble à la filière des chenilles; elle a encore quatre barbillons coniques divisés en articulations, dont les deux extérieurs, plus grands que les autres, sont fourchus au bout. Entre les lèvres, il a deux grosses dents d'un brun obscur, courbées en dedans & terminées en pointe fine, mais qui à leur base ont beaucoup de volume. Toutes ces parties sont garnies de petits poils presque imperceptibles. De chaque côté de la tête, est un point noir, que l'on prendroit pour un œil. C'est dans les tiges mêmes que nos larves se transforment. En ouvrant une tige vers le mois de juillet, on trouve la larve transformée en nymphe, sans avoir fait de coque, placée à nu, & la tête en haut. Cette nymphe qui est presque de la même longueur que la larve & grosse à proportion, est toute blanche, mais le ventre, de grosseur égale par-tout, tire un peu sur le jaune; le bout du derrière est arrondi & garni de pointes écailleuses, courbées, d'un brun obscur à l'extrémité, & sur chaque anneau du ventre en-dessus, on voit un rang de pointes écailleuses, courtes & brunes, placées transversalement. Toutes les parties de l'animal ailé, sont très-distinctes sur cette nymphe & arrangées en ordre sur le devant du corps, comme la tête, la trompe avec les antennes, les yeux, les élytres, les ailes & les pattes: la trompe repose sur le dessous du corcelet, entre les pattes antérieures. Quoique la peau de la nymphe soit tendre & molle, elle montre pourtant beaucoup de vigueur & de vivacité. On la voit remuer le ventre considérablement, & parcourir la moitié de la tige, d'un bout à l'autre. C'est par le mouvement des anneaux du ventre, qu'elle parvient à le faire, & les deux pointes écailleuses du derrière, comme

aussi les rangées de courtes épines du dos , lui donnent un point d'appui contre les parois de la tige , & l'aident à se pousser en haut ou en bas. Il est donc certain qu'elle peut changer de place dans la tige , de sorte que la larve n'a pas besoin avant de se transformer en nymphe , de se rendre à l'extrémité de la tige qui se trouve hors de l'eau ; car la nymphe , & à plus forte raison l'insecte ailé , peut se rendre dans cette portion de la tige , lorsqu'elle le veut ou qu'elle en a besoin. On peut insister là-dessus , parce que Fermander , qui , le premier a observé cet insecte , a dit , que la larve se rend en haut de la tige quand elle doit se transformer , afin qu'après la transformation l'insecte ne se noie pas en sortant de la tige. Avant la fin du mois de juillet , ces nymphes ont pris la forme de Charanson ; & elles ne sortent point de la tige pour se transformer , mais l'insecte parfait se fait lui-même jour par une grande ouverture ovale qu'il pratique en rongant avec ses dents un certain endroit de la tige , qui se trouve excéder la surface de l'eau , par où il sort. Les Charansons ne restent donc point pendant l'hiver dans les tiges de la Philandrie , comme Linné l'a prétendu ; & suivant l'observation de De Geer , si les chevaux sont attaqués de la maladie dont nous avons parlé , après avoir mangé de la Philandrie sèche qui a pu se trouver mêlée dans le foin , on ne sauroit alors l'attribuer immédiatement à ces Charansons , puisque dans ce temps-là , ils ne sont certainement plus dans ces mêmes plantes.

Il se trouve dans toute L'Europe.

83. CHARANSON Serpent.

CURCULIO anguinus.

Curculio longirostris cylindricus canus fusco lineatus. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 14. fig. 168.

Curculio anguinus. LIN. Syst. nat. pag. 610. n°. 35.

Il ressemble entièrement pour la forme & la grandeur , au Charanson paraplectique. Les antennes sont coudées , avec la masse allongée pointue. La trompe est cylindrique , courbée , de la longueur du corcelet , noire , avec deux raies longitudinales blanches. Le corcelet est noir , presque cylindrique , avec quatre raies blanches. L'écusson est petit , arrondi & noirâtre. Les élytres sont noires , avec le bord extérieur blanc & quelques lignes longitudinales blanchâtres ; elles ont des stries de points enfoncés , disposés par paires. On voit de chaque côté de la future , une suite de points enfoncés ; l'extrémité est terminée en pointe assez avancée. Le dessous du corps est blanchâtre & pointillé de noir. Les pattes sont blanchâtres , & les cuisses sont simples , sans épines & sans dentelures.

Il se trouve en Allemagne.

84. CHARANSON huit-lignes.

CURCULIO otholineatus.

Curculio longirostris , femoribus muticis , niger , elytris acuminatis albo lineatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 8. fig. 89.

Il ressemble pour la forme & la grandeur , au Charanson paraplectique. Les antennes sont noirâtres. La trompe est noire , cylindrique , un peu plus longue que le corcelet. Le corcelet est noir , avec quatre lignes longitudinales blanches. Les élytres sont pointues à leur extrémité , noires , avec quatre lignes longitudinales , blanches , placées , l'une vers le bord extérieur , une autre vers la future , & deux un peu plus courtes , au milieu. Le dessous du corps est noirâtre & l'abdomen est cendré. Les pattes sont noires & les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

85. CHARANSON sémipunctué.

CURCULIO semipunctatus.

Curculio longirostris , cylindricus , thorace lineis elytris punctis albis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 141.

Curculio semipunctatus. FAB. Syst. ent. pag. 135. n°. 43. — Sp. inf. tom. 1. pag. 171. n°. 61.

Brentus semipunctatus cylindricus , thorace lineis , elytris punctis albis. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 96. n°. 4.

Il ressemble entièrement , pour la forme & la grandeur , au Charanson paraplectique. Les antennes sont brunes , noirâtres à leur base. La trompe est noire , cylindrique , un peu arquée , un peu plus longue que le corcelet. La tête est noire , les yeux sont noirs , un peu faillans , bordés supérieurement de blanc. Le corcelet est noir un peu chagriné , avec trois lignes longitudinales blanchâtres. Les élytres sont noires , fortement pointillées , avec deux ou trois lignes longitudinales un peu élevées ; elles sont terminées en pointe aiguë , & elles sont parsemées de petits points gris roussâtres. Le dessous du corps est blanchâtre. Les pattes sont noires , les cuisses sont simples : les antérieures sont plus grosses & un peu plus longues que les autres.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

86. CHARANSON des Ombelles.

CURCULIO Umbellatarum.

Curculio longirostris , thorace nigro cinereo lineato , elytris mucronatis griseis. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n°. 78.

Il ressemble beaucoup au Charanson paraplectique, mais il est presque une fois plus petit. La trompe est cylindrique, noire luisante. Le corcelet est noirâtre, obscur, avec quatre lignes longitudinales cendrées, dont les deux intermédiaires sont courtes. Les élytres sont grisâtres ou mélangées de cendré & d'obscur, & terminées en pointe.

Il se trouve en Barbarie, sur les fleurs en Om-belle.

87. CHARANSON filiforme.

CURCULIO filiformis.

Curculio longirostris cylindricus subcinereus, thorace lineis tribus fuscis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 16. fig. 198.

Curculio filiformis. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 172. n°. 63. — Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n°. 79.

Il est deux ou trois fois plus petit que le Charanson paraplectique. la trompe est noire, allongée. Les antennes sont brèves, avec la masse allongée, d'un noir cendré. Le corcelet est obscur, avec quatre lignes longitudinales cendrées. Les élytres sont couvertes d'un léger duvet cendré roussâtre; leur extrémité est obtuse, & vues à la loupe; on aperçoit des stries formées par des points enfoncés. Les pattes sont noirâtres.

Il se trouve en Italie, dans les provinces méridionales de la France.

88. CHARANSON cylindrique.

CURCULIO cylindricus.

Curculio longirostris cylindricus supra niger, elytris acuminatis, fascia pallida. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 123.

Curculio cylindricus. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 172. n°. 64. — Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n°. 80.

Il ressemble au Charanson paraplectique, mais il est une ou deux fois plus petit. Les antennes sont brunes, avec la masse cendrée obscure. La trompe est noire, cylindrique, un peu arquée, de la longueur du corcelet. La tête est noire. Le corcelet est noir, fortement pointillé, avec les côtés cendrés. L'écusson est très-petit. Les élytres sont noires, avec des stries ferrées, formées par des points enfoncés; leur extrémité est terminée en pointe aigüe; on voit une bande grisâtre, au delà du milieu, assez large, interrompue à la suture. Le dessous du corps est couvert de poils très-courts, blanchâtre. Le milieu de l'abdomen est noir. Les pattes sont noires, & les cuisses sont simples.

Il se trouve dans la Sibérie.

89. CHARANSON noté.

CURCULIO notatus.

Curculio longirostris thorace fusco: punctis quatuor albis, elytris fuscis, fascia sesquialtera testacea. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 103. n°. 81.

Il a la forme cylindrique des précédens. La tête est obscure. La trompe est allongée, courbée, noire. Le corcelet est obscur, avec quatre petits points blancs, placés sur une ligne transversale. L'écusson est blanc. Les élytres sont striées, avec deux bandes testacées, dont l'antérieure est courte, & la postérieure est terminée à la suture par une tache blanche: on voit encore une petite ligne blanche tout le long de la suture.

Il se trouve en Barbarie, sur différentes plantes.

90. CHARANSON mucroné.

CURCULIO mucronatus.

Curculio longirostris, thorace fusco lineis tribus cinereis, elytris apice mucronatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 16. fig. 199.

Il ressemble au Charanson paraplectique, mais il est une ou deux fois plus petit. La trompe est noire, cylindrique, un peu courbée. Les antennes sont fauves, avec la masse allongée, cendrée. Le corcelet est obscur, avec trois lignes longitudinales, cendrées. Les élytres sont noirâtres, & couvertes d'un léger duvet cendré fauve; leur extrémité est terminée en pointe aigüe: vues à la loupe, elles paroissent avoir des stries, formées par des points enfoncés. Les pattes sont noirâtres.

Il se trouve en Provence, sur les Chardons.

91. CHARANSON barbirestre.

CURCULIO barbirostris.

Curculio longirostris niger, rostro barbato, tibiis anticis tridentatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 4. fig. 37. a. b.

Curculio barbirostris. FAB. Syst. Entom. pag. 135. n°. 45. — Spec. inf. tom. 1. pag. 172. n°. 65. — Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 82.

SEB. Mus. tom. 4. tab. 95. fig. 5.

VOET. Coleopt. pars 2. tab. 35. fig. 2. 3.

Curculio niger. DRURY. Illust. of inf. tom. 2. fig. 2. fem.

Il varie beaucoup pour la grandeur. Les antennes sont noires, assez longues. La trompe est cylindrique, plus longue que le corcelet, noire, & couverte tout au tour de poils roussâtres. Tout le corps est noir. Le corcelet est arrondi, tout pointillé. Les élytres sont striées, & les stries sont pointillées. Les pattes antérieures sont beaucoup

plus longues que les autres, & les jambes sont armées de trois petites épines. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

La femelle a la trompe plus courte que celle du mâle, & entièrement lisse.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

92. CHARANSON rétréci.

CURCULIO angustatus.

Curculio longirostris cylindricus niger, elytris obtusis punctatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 16. fig. 200.

Curculio angustatus longirostris cylindricus ater, elytris obtusis punctatis. FAB. Syst. ent. pag. 135. n°. 46. — Spec. inf. tom. 1. pag. 172. n°. 66. — Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 83.

Curculio angustatus. FUESL. Archiv. inf. 4. p. 71. n°. 18. tab. 24. fig. 7.

Il ressemble au Charanson paraplectique. Tout le corps est noirâtre, plus ou moins couvert d'une poussière d'un jaune cendré. Les antennes sont d'un brun fauve à leur base, d'un noir cendré à leur extrémité. La trompe est noire, cylindrique, un peu plus longue que le corcelet. Les yeux sont noirs, point du tout saillans. Le corcelet est un peu raboteux. Les élytres sont presque raboteuses; elles ont des points enfoncés, à peine marqués, rangés en stries, leur extrémité est arrondie.

Il se trouve dans toute la France, en Angleterre, sur les Chardons.

93. CHARANSON de la Bardane.

CURCULIO Bardana.

Curculio longirostris cylindricus griseo tomentosus, pedibus anticis elongatis. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 84.

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au Charanson paraplectique. Nouvellement sorti de sa nymphe, tout son corps est couvert d'un duvet grisâtre; en vieillissant il devient glabre & noir. Les élytres sont arrondies, obtuses. Les pattes antérieures sont un peu plus longues que les autres.

Il se trouve à Dresde, sur la Bardane.

94. CHARANSON d'Ascanius.

CURCULIO Ascanii.

Curculio longirostris cylindricus ater lateribus subaealescentibus. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 16. fig. 83. c. & pl. 7. fig. 83. a. b.

Curculio Ascanii. LIN. Syst. nat. pag. 610.

Curculio Ascanii. FAB. Syst. ent. pag. 135. n°. 47. — Sp. inf. tom. 1. pag. 173. n°. 67. — Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 85.

Curculio Ascanii. FUESL. Archiv. inf. 4. pag. 71. n°. 19. tab. 24. fig. 8.

Curculio Ascanii. VILL. Ent. tom. 1. pag. 184. n°. 31.

Il est un peu plus petit que le Charanson paraplectique. La trompe est noire, luisante, cylindrique, presque de la longueur du corcelet. Les antennes sont noirâtres, avec le premier article brun. Le tour des yeux est blanc. Tout le corps est noir, plus ou moins couvert d'un léger duvet blanchâtre. Le bord extérieur du corcelet est couvert d'un duvet blanchâtre, quelquefois d'un blanc azuré. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés; leur extrémité est un peu pointue.

Il se trouve en France, en Italie, sur les Chardons.

95. CHARANSON linéole.

CURCULIO lineola.

Curculio longirostris, cylindricus niger, elytris vitta testacea. FAB. Syst. ent. pag. 136. n°. 48. — Sp. inf. tom. 1. pag. 173. n°. 68. — Mant. inf. t. 1. p. 104. n°. 86.

Il ressemble beaucoup, pour la forme & la grandeur, au Charanson du Blé. Tout le corps est brun. Les antennes ont leur masse ovale, d'un brun testacé. La trompe est à-peu-près de la longueur du corcelet. Les yeux sont saillans & obscurs. Le corcelet est couvert de quelques poils courts, d'un gris roussâtre. L'écusson est triangulaire & noirâtre. Les élytres sont noirâtres, avec une raie longitudinale ferrugineuse; elles sont fortement striées, & les stries ont des points enfoncés. Les pattes sont brunes ferrugineuses. Les cuisses sont simples, & les jambes sont terminées par un ongle.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

96. CHARANSON linéaire.

CURCULIO linearis.

Curculio longirostris elongatus niger, antennis pedibusque piceis, rostro basi attenuato. FAB. Syst. ent. p. 136. n°. 49. — Sp. inf. tom. 1. p. 173. n°. 69. — Mant. inf. tom. 1. p. 104. n°. 87.

Il est un peu plus petit que le Charanson d'Ascanius, & il a une forme mince & allongée. La trompe est d'une longueur moyenne, très-mince à la base, un peu plus grosse à l'extrémité. Les antennes sont ferrugineuses. Le corcelet est oblong, noir, pointillé. Les élytres sont striées. Les pattes sont d'un brun ferrugineux.

On trouve une variété de cet insecte, dont tout le corps est ferrugineux.

Il se trouve à Strasbourg.

97. CHARANSON crassipède.

CURCULIO crassipes.

Curculio longirostris, femoribus anticis subclavatis, corpore atro. FAB. *Syst. ent. p*

— *Sp. inf. t. 1. pag. 173. n°.* 70. — *Mant. inf. t. 1. p. 104. n°.* 88.

Il a la forme allongée du *Charanson* d'Ascanius. Les antennes sont coudées, noires, obscures à leur extrémité. Le corcelet est noir, allongé, presque de la longueur des élytres, arrondi postérieurement. Les élytres sont un peu plus courtes que l'abdomen, lisses, noires. Le dessous du corps & les pattes sont noirs. Les cuisses antérieures sont un peu plus grosses que les autres.

Il se trouve à Strasbourg.

98. CHARANSON de l'Attriplex.

CURCULIO Atriplicis.

Curculio longirostris elongatus ater, thorace nitido, elytris striatis obtusis. FAB. *Gen. inf. mant. p. 225.* — *Sp. inf. t. 1. pag. 173. n°.* 71. — *Mant. inf. tom. 1. p. 104. n°.* 89.

Il ressemble beaucoup, pour la forme & la grandeur, au *Charanson* linéaire; il en diffère par les antennes noires, par la trompe mince, cylindrique, point du tout amincie à sa base. Le corcelet est luisant, moins pointillé.

Il se trouve sur l'Attriplex littoral, à Kiell & en Norvege.

99. CHARANSON algérien.

CURCULIO algerus.

Curculio longirostris subcylindricus lavis fuscus, punctis prominulis adpersus. LIN. *Syst. nat. p. 611. n°.* 37.

Curculio Algerus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 184. n°.* 32.

Il a la forme du *Charanson* paraplectique. Le corps est presque cylindrique, obscur, couvert de petits points élevés. Les élytres sont presque arrondies à leur extrémité.

Cet insecte n'est peut-être que le *Curculio angustatus* de M. Fabricius.

Il se trouve au midi de l'Europe, sur la côte de Barbarie.

100. CHARANSON quadripustulé.

CURCULIO quadripustulatus.

Curculio longirostris femoribus muticis, niger, elytris maculis duabus ferrugineis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 117.

Curculio quadripustulatus longirostris femoribus dentatis niger, elytris maculis duabus ferrugineis. FAB. *Syst. ent. pag. 144. n°.* 88. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 183. n°.* 121. — *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n°.* 149.

Il est un peu plus petit que le *Charanson* Rubetta. Les antennes sont coudées, noires, avec la masse petite, arrondie, cendrée à son extrémité. La trompe est mince, courbée, de la longueur du corcelet, noire & luisante. La tête est noire, petite & arrondie. Les yeux ne sont pas du tout saillans. Le corcelet est assez long, plat en-dessus, noir, pointillé, avec les côtés cendrés obscurs, dans l'individu que j'ai vu. L'écusson est noir & petit. Les élytres sont striées, avec des points dans chaque strie; elles sont noires, avec deux taches d'un rouge brun sur chaque, dont l'antérieure placée vers la base, est un peu plus grosse que l'autre, placée un peu au-delà du milieu. Les pattes & le dessous du corps sont noirs. Les cuisses sont sans épines & sans dentelures dans les espèces que j'ai vues. Les jambes sont terminées par un ongle.

Cet insecte a la forme du *Charanson* palmiste.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

101. CHARANSON marron.

CURCULIO castaneus.

Curculio longirostris oblongus subtus niger, supra castaneus: elytris striato-punctatis gibbis.

Curculio castaneus longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo fusco castaneo subtus nigro, elytris striato-punctatis gibbosis. DEG. *Mém. inf. tom. 5. p. 231. n°.* 19.

Charanson couleur de marron à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps allongé d'un brun marron en-dessus & noir en-dessous, à cannelures ponctuées & deux bosses sur les étuis. DEG. *ib.*

Curculio castaneus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1756.*

Il a environ trois lignes & demie de long & une ligne de large. La trompe est mince, arquée, un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont coudées, de la longueur de la trompe. Le corcelet est chagriné, & d'un brun marron. Les élytres sont d'un brun marron; elles ont des stries formées par des points enfoncés, & une gibbosité vers l'ex-

trémité. Le dessous du corps est noir. Les cuisses sont simples.

Il se trouve au nord de l'Europe.

102. CHARANSON bai.

CURCULIO badensis.

Curculio longirostris niger, pedibus piceis. LIN. *Syst. nat. p. 607. n° 8.*

Curculio badensis. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 175. n° 5.*

Il est de la grandeur du Charanson du Cérifier. Les antennes font de la longueur de la moitié du corps. Le corcelet est lisse, ovale. Les élytres sont légèrement striées. Tout le corps est noir. Les pattes sont d'un brun ferrugineux, avec les tarses noirs. Les cuisses sont simples, un peu renflées.

Il se trouve en Allemagne.

103. CHARANSON scabre.

CURCULIO scaber.

Curculio longirostris cinereus, pedibus rufis, elytris scabris. LIN. *Syst. nat. p. 609. n° 22. — Faun. Suec. n° 592.*

Curculio scaber. VILL. *Ent. t. 1. p. 179. n° 18.*

Il est petit. La trompe est longue. Le corps est cendré. Les élytres sont parsemées de poils courts roides, blanchâtres. Les pattes sont fauves. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Europe sur les Orties.

104. CHARANSON T blanc.

CURCULIO T album.

Curculio longirostris ater, abdominis lateralibus posticisque lacteis. LIN. *Syst. nat. p. 609. n° 23. — Faun. Suec. n° 594.*

Curculio T album. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 179. n° 19.*

Il est de la grandeur du précédent. La trompe est longue. Le corps est noir, avec une tache blanche, représentant un T, de chaque côté de l'abdomen.

Il se trouve au nord de l'Europe.

105. CHARANSON ruficolle.

CURCULIO ruficollis.

Curculio longirostris ferrugineus, elytris capitisque basi atro-caruleis. LIN. *Syst. nat. pag. 609. n° 24. — Faun. Suec. n° 595.*

Curculio ruficollis. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 179. n° 20.*

Curculio ruficollis. SCHRANK. *Enum. inf. austr. n° 244.*

Il n'a pas deux lignes de long. La trompe est testacée, allongée. La base de la tête est noire. Le corcelet est testacé. Les élytres sont d'un noir bleuâtre, luisant, finement strié.

Il se trouve en Europe.

106. CHARANSON du Lychnis.

CURCULIO Viscaria.

Curculio longirostris subrotundus cinereus, thorace elytrisque cinereo-virentibus. LIN. *Syst. nat. pag. 609. n° 27. — Faun. Suec. n° 598.*

Curculio Viscaria. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 181. n° 23.*

Il est de la grandeur des précédents. Le corps est presque ovale, velu, d'un vert cendré en-dessus, & cendré en-dessous. La tête & les pattes sont noirs. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Europe, sur la fructification du Lychnis gluant, *Lychnis viscaria.*

107. CHARANSON uni-punctué.

CURCULIO unipunctatus.

Curculio longirostris cinereus, elytris maculata nigra, tibiis flavescens.

Curculio bipunctatus. LIN. *Syst. nat. pag. 609. n° 28. — Faun. Suec. n° 599.*

Curculio bipunctatus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 181. n° 24.*

Il est un peu plus petit que les précédents. La tête & la trompe sont noires, glabres. Le corcelet est noir, couvert de poils cendrés. Les élytres sont striées, noires & couvertes de poils cendrés, avec une tache noire au milieu de chaque. Les cuisses sont noires, simples. Les jambes & les tarses sont d'un jaune pâle. Les antennes sont jaunes.

Il se trouve en Europe.

108. CHARANSON cinq-taches.

CURCULIO quinquemaculatus.

Curculio longirostris griseus, coleoptris maculis quinque albidis. LIN. *Syst. nat. pag. 619. n° 30. — Faun. Suec. n° 601.*

Curculio quinquemaculatus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 181. n° 26.*

Nous soupçonnons que cet insecte n'est qu'une variété du Charanson cinq-points. Le corps est d'une couleur cendrée, noirâtre. L'extrémité de la trompe est ferrugineuse. Le corcelet est d'un brun ferrugineux, avec une tache blanche à la partie pos-

rière. Les élytres sont d'un brun ferrugineux, avec la suture blanche, une tache blanche à la base, & une autre à l'extrémité de chaque élytre. Les pattes sont simples.

Il se trouve en Europe.

109. CHARANSON de l'Ajonc.

CURCULIO Ulicis.

Curculio longirostris femoribus simplicibus, cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis tibiis omnibus & femoribus primi paris rufis. FORST. Nov. Sp. inf. cent. 1. pag. 31. n°. 31.

Il est très-petit. Le corps est ovale, noirâtre, entièrement couvert de petits poils cendrés. Les antennes sont fauves. La trompe est noire, lisse. Le corcelet est globuleux, les élytres sont striées, sans taches. Les cuisses sont simples, cendrées; les cuisses antérieures & toutes les jambes sont fauves.

Il se trouve en Angleterre, sur les fleurs de la plante nommée *Ulex Europæus*.

110. CHARANSON cendré.

CURCULIO cinereus.

Curculio longirostris cinereus, lineis longitudinalibus diluitoribus.

Curculio cinereus, fasciis longitudinalibus diluitoribus. LIN. Faun. suec. edit. 1. n°. 472 & edit. 2. n°. 2274.

Curculio fasciatus longirostris, antennis fractis, femoribus muricatis, corpore oblongo nigro-fusco: fasciis longitudinalibus griseis. DEG. Mém. inf. tom. 5. pag. 234. n°. 21.

Charanson rayé à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps ovale d'un brun noirâtre avec des raies longitudinales grises.

Il a environ deux lignes & demie de long & une de large. La trompe est mince, arquée, de la longueur du corcelet. La couleur du corps est d'un brun obscur, avec des lignes longitudinales formées par de très-petits poils: on voit une ligne sur la trompe & sur la tête, trois sur le corcelet & plusieurs sur les élytres, moins marquées. Le dessous du corps est d'un brun grisâtre.

Il se trouve au nord de l'Europe.

111. CHARANSON marbré.

CURCULIO marmoratus.

Curculio longirostris niger, elytris testaceis fasciis obliquis fuscis.

Curculio lividus, coleoptris fasciis plurimis obscuris. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 231. n°. 33.

Le Charanson marbré à bandes. GEOFF. *Ib.*

Curculio marmoratus. FOURC. Ent. par. 1. pag. 125. n°. 33.

Il a à peine une ligne de long. La tête est noire. La trompe est mince, noire, de la longueur du corcelet. Le corcelet est noir. L'écusson est blancâtre. Les élytres sont striées, d'un rouge brun, avec plusieurs bandes obliques, obscures, & une raie longitudinale de la même couleur, près de la suture. Les cuisses sont noires, simples. Les jambes sont fauves.

Il se trouve aux environs de Paris, sur la Solitaire.

112. CHARANSON spinifère.

CURCULIO spinifer.

Curculio longirostris fuscus, thorace elytrisque muricatis.

Curculio totus fuscus spinosus, elytris striis elevatis villoso-spinosis. GEOFF. tom. 1. pag. 290. n°. 30.

Le Charanson à côtes épineuses. GEOFF. *Ib.*

Curculio spinifer. FOURC. Ent. par. 1. pag. 125. n°. 30.

Il a environ une ligne & demie de long. Tout le corps est d'un brun obscur. La trompe est assez grosse, de la longueur du corcelet. Les élytres ont chacune neuf stries longitudinales entre lesquelles sont placés des pois courts, roides, semblables à des épines. Le corcelet a aussi quelques poils semblables à ceux des élytres.

Il se trouve aux environs de Paris.

113. CHARANSON denticulé.

CURCULIO denticulatus.

Curculio longirostris niger, scutello albicante elytris striis denticulatis.

Curculio niger, scutello albicante, elytrorum striis utrinque denticulatis. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 290. n°. 31.

Le Charanson noir, à côtes. GEOFF. *Ib.*

Curculio denticulatus. FOURC. Ent. par. 1. pag. 125. n°. 31.

Curculio denticulatus. SCRANK. Enum. inf. aust. n°. 205.

Il a environ une ligne de long. Il est noir, lisse, luisant. La trompe est mince, plus longue que le corcelet. Les antennes sont coudées, noires. Le corcelet est chagriné. Les élytres ont des stries bien marquées: vues à la loupe, ces stries paroissent denticelées.

Il se trouve aux environs de Paris.

114. CHARANSON SOURIS.

*CURCULIO murinus.**Curculio longirostris subvillosus cinereus, scutello albicante.**Curculio subvillosus-murinus, scutello albicante.* GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 290. n° 29.*Le Charanson Souris. GEOFF. *Ib.**Curculio murinus.* FOURC. *Ent. tom. 1. pag. 124. n° 29.*

Il a environ une ligne de long. Tout le corps de cet insecte est noir, mais légèrement couvert de poils courts d'un gris cendré. La trompe est mince, de la longueur du corcelet. La partie postérieure du corcelet & l'écusson sont blanchâtres.

Il se trouve aux environs de Paris.

115. CHARANSON floral.

*CURCULIO floralis.**Curculio longirostris niger, subtus cinereus, elytris striatis.**Curculio subglobosus, cinereo-ater, striatus, proboscide thoracis longitudine.* GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 289. n° 26.*Le Charanson noir strié. GEOFF. *Ib.**Curculio floriger.* FOURC. *Ent. par. 1. pag. 123. n° 26.*

Il a une ligne de long. Tout le dessus du corps est noir; le dessous est couvert de petites écailles cendrées. La trompe est mince, longue, courbée. La tête & le corcelet sont pointillés. Les élytres ont des stries serrées.

Il se trouve aux environs de Paris sur les fleurs.

116. CHARANSON bandé.

*CURCULIO tricoloratus.**Curculio longirostris globosus rufus, elytris fasciâ albâ.**Curculio globosus rufus, elytris striatis, fasciâ transversâ albâ.* GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 289. n° 27.*Le Charanson roux à bande transversale blanche. GEOFF. *Ib.**Curculio cinctus.* FOURC. *Ent. par. 1. pag. 124. n° 27.*

Il a une ligne de long. Tout le corps est de couleur fauve roussâtre. Les élytres sont striées, & ont une bande blanche au milieu & deux autres peu apparentes, l'une vers la base & l'autre vers

Hist. nat. Insectes. Tome V.

l'extrémité. Ces bandes sont formées par de petits poils blancs. Les pattes sont de la couleur du corps & les cuisses sont simples.

Il se trouve aux environs de Paris.

117. CHARANSON transversal.

*CURCULIO transversus.**Curculio longirostris globosus niger, elytris striatis, fasciâ albâ.**Curculio globosus niger, elytris striatis, fasciâ transversâ albâ.* GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 289. n° 28.*Le Charanson noir à bande transversale blanche. GEOFF. *Ib.**Curculio vittatus.* FOURC. *Ent. par. 1. pag. 124. n° 28.*

Il ressemble entièrement pour la forme & la grandeur au précédent. Le corps est noir, presque globuleux. La trompe est assez longue. Le corcelet paroît un peu plus étroit que celui de l'espèce précédente. Les élytres sont striées, & ont une bande blanche.

Il se trouve aux environs de Paris, sur le Saule. La larve se nourrit des feuilles de cet arbre.

118. CHARANSON pygmée.

*CURCULIO pygmaeus.**Curculio longirostris subrotundus niger, thorace utrinque spinoso lineisque tribus albis.**Curculio subrotundus niger, squamosus, elytris striatis, thorace utrinque aculeato, lateribus lineâque mediâ albis.* GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 288. n° 25.*Le Charanson à bandes blanches. GEOFF. *Ib.**Curculio pultiaris.* FOURC. *Ent. par. 1. pag. 123. n° 25.*

Il est très-petit, ovale, presque rond, noir & couvert de petites écailles. La trompe est longue. Le corcelet est un peu épineux de chaque côté, & il a trois lignes longitudinales, blanches, dont une au milieu & une de chaque côté. Les élytres sont striées.

Il se trouve aux environs de Paris.

119. CHARANSON large.

*CURCULIO latus.**Curculio longirostris ater depressus flavo irroratus, thorace granulato: lineâ mediâ elevatâ transversâ, elytris fulcatis.* LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1754.*

Curculio latus. FUESL. Arch. inf. 4 pag. 71. n°. 21. tab. 24. fig. 9.

Il ressemble un peu au Charanson ascanius. Tout le corps est noir, légèrement couvert d'une poussière jaune. Le corcelet est granulé, & il a une petite ligne élevée & transversale. Les élytres sont striées. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans la Hongrie.

120. CHARANSON cyanocéphale.

CURCULIO cyanocephalus.

Curculio longirostris niger villosus, capite chalybeo, thorace rubro, elytris subspadiceis punctato-striatis, femoribus virescentibus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1754.

Curculio cyanocephalus. FUESL. Archiv. inf. 4. pag. 72. n°. 23. tab. 24. fig. 11.

Il a environ deux lignes de long. Il est noir & velu. La tête est d'un bleu d'acier. Le corcelet est rouge. Les élytres sont d'un brun marron & ont des stries pointillées. Les cuisses sont simples, verdâtres.

Il se trouve en France, en Allemagne sur le Bouleau.

121. CHARANSON strié.

CURCULIO striatus.

Curculio longirostris cinereo pubescens, thoracis striis tribus albidis, elytrorum totidem nigris. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1754.

Curculio striatus. FUESL. Arch. inf. 4. pag. 72. n°. 25. tab. 24. fig. 13.

Il a environ trois lignes de long & ressemble un peu au Charanson du Polygonum. Tout le corps est couvert d'un léger duvet cendré. Le corcelet a trois lignes longitudinales blanches, & les élytres ont trois lignes longitudinales noires. Les cuisses sont simples.

Il se trouve à Berlin.

122 CHARANSON gris-blanc.

CURCULIO canus.

Curculio longirostris subglobosus, cinereo-pubescentis, elytris abbreviatis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1754.

Curculio canus. FUESL. Arch. inf. 5. pag. 73. n°. 26. tab. 24. fig. 14. e.

Il a environ deux lignes de long. Tout le corps est couvert d'un léger duvet gris blanchâtre. La trompe est mince, de la longueur du corcelet. Le

corcelet est arrondi. Les élytres sont un peu plus courtes que l'abdomen.

Il se trouve à Berlin.

123. CHARANSON porte-croix.

CURCULIO cruciger.

Curculio longirostris nigerimus, antennarum basi tarsisque fuscis, elytris abbreviatis striatis albo-maculatis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1754.

Curculio cruciger. FUESL. Arch. inf. 5. pag. 73. n°. 27. tab. 24. fig. 15.

Il a environ deux lignes de long. Il est très-noir. La base des antennes & les tarses sont noires. Les élytres sont courtes, striées, tachetées de blanc.

Il se trouve à Berlin.

124. CHARANSON Alouette.

CURCULIO Alauda.

Curculio longirostris cinereus, subglobosus, thoracis dorso fasciâ transversâ maculisque nigris, pedibus fuscis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1755.

Curculio Alauda. FUESL. Arch. inf. 5. pag. 74. n°. 29. tab. 24. fig. 16. f.

Il a environ deux lignes de long. Le corps est presque globuleux, couvert d'un duvet cendré. Les antennes & les pattes sont obscures. La trompe est mince un peu plus longue que le corcelet. Le corcelet a une tache transversale noire. Les élytres sont striées & ont plusieurs taches noires.

Il se trouve dans la Poméranie.

125. CHARANSON urticaire.

CURCULIO urticarius.

Curculio longirostris fuscus, fasciis villosis albidis undulatis, pedibus fulvis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1755.

Curculio urticarius. FUESL. Arch. inf. 5. pag. 74. n°. 30.

Il est très-petit & noirâtre, avec des bandes velues, ondules, blanches. Les pattes sont fauves, & les cuisses sont simples.

Il se trouve dans la Poméranie.

126. CHARANSON point-blanc.

CURCULIO punctum-album.

Curculio longirostris nigerrimus, subtrus & ad latera ochroleuco irroratus, antennis fulvis, elytrorum sutura puncta medio albo. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1755.

Curculio punctum - album. FUESL. *Arch. inf.* 5. pag. 74. n°. 31. tab. 24. fig. 17.

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au *Charanson* de la *Scrophulaire*. Il est très noir. Le dessous du corps & les côtes sont couverts d'une poussière jaunâtre. Les antennes sont fauves. Les élytres ont au milieu de leur suture, un point blanc. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Europe sur les fleurs du *Né- nuphar* jaune, *nymphaea lutea*.

** Trompe mince, alongée. Cuisses dentées.

127. CHARANSON bident.

CURCULIO bidens.

Curculio longirostris, femoribus posticis dentatis, niger, elytris unispinosis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 113.

Curculio bidens. FAB. *Syst. ent.* pag. 136. n°. 51. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 173. n°. 72.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 90.*

Il est de grandeur moyenne. Tout le corps est noir & luisant. Les antennes sont coudées, & le premier article est aussi long que tous les autres pris ensemble. La trompe est un peu plus longue que le corcelet. La tête est mince, pointillée, avec les yeux peu saillans. Le corcelet est ridé, cylindrique, assez étroit. L'écusson est ovale, petit un peu élevé. Les élytres ont des stries régulières, dans lesquelles il y a une suite de points enfoncés; on voit s'élever au milieu de chaque, une épine droite, assez large à la base, pointue à l'extrémité; les deux épines divergent un peu latéralement. Les pattes sont noires; les cuisses des quatre antérieures sont simples, celles des postérieures ont une dent assez forte.

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande.

128. CHARANSON jamaïquois.

CURCULIO jamaicensis.

Curculio longirostris obscurus scaber, thorace utrinque fasciculato tuberculato, elytris striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON Pl. 4. fig. 44.

Curculio jamaicensis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 173. n°. 73.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 91.*

Il est grand, un peu déprimé & d'une couleur obscure. Les antennes sont noirâtres, coudées. La trompe est cylindrique, courbée, de la longueur du corcelet. La tête est noire, arrondie, les yeux sont noirs, point du tout saillans. Le corcelet est chagriné, déprimé, avec un ongle de chaque côté, au bout duquel, il y a des poils ferrés, courts, roux. L'écusson est petit, élevé, arrondi,

Les élytres sont chagrinées, & elles ont chacune des stries élevées. Les pattes sont de la couleur du corps & chagrinées comme lui. Les cuisses sont munies d'une dent. Les tarses sont bruns; roussâtres.

Il se trouve dans la Jamaïque.

129. CHARANSON miliaire.

CURCULIO miliaris.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fuscus, thorace elytrisque tuberculis innumeris nigris. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 3. fig. 33.

Il est de la grandeur du *Charanson* jamaïquois. Les antennes sont noires, avec la masse ovale cendrée. La trompe est noire, cylindrique, courbée, un peu plus longue que le corcelet. La tête est arrondie noire, avec le tour des yeux cendré. Le corcelet est cendré, tout couvert de petits tubercules arrondis, noirs, luisans. Les élytres sont cendrées, arrondies à leur extrémité, entièrement couvertes de tubercules arrondis, noirs, luisans. Le dessous du corps est couvert d'une poussière ferrugineuse. Les pattes sont noirâtres, assez longues, & les cuisses sont armées d'une dent. Il se trouve à Cayenne.

130. CHARANSON cyanicolle.

CURCULIO cyanicollis.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace cyaneo lateribus scabris, elytris scabris striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 121.

Il est presque de la grandeur du *Charanson* jamaïquois. Les antennes sont cendrées, noirâtres, coudées, avec la première pièce bleuâtre obscure. La trompe est cylindrique, un peu courbée, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, bleuâtre, & les yeux sont noirs, point saillans. Le corcelet est arrondi, un peu aplati en-dessus, légèrement pointillé au milieu & chagriné sur les bords latéraux. L'écusson est arrondi postérieurement. Les élytres sont noirâtres, chagrinées, & elles ont des stries régulières, chagrinées, peu marquées. Les pattes sont noirâtres, un peu bleuâtres, chagrinées, avec une dent à chaque cuisse & une dent aux jambes antérieures seulement.

Il se trouve

131. CHARANSON valide.

CURCULIO validus.

Curculio longirostris, femoribus tibisque anticis dentatis, thorace elytrisque

ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 15. fig. 186.

Il ressemble entièrement au *Charanson* cyanicelle, mais il est plus grand. Les antennes sont coudées, noires, avec le premier article long & noir. La trompe est noire, cylindrique, un peu courbée, de la longueur du corcelet. La tête est noire, arrondie, & les yeux ne sont point saillans. Le corcelet est presque carré, noir, chagriné, un peu aplati en-dessus. L'écusson est arrondi postérieurement. Les élytres sont sillonnées & chagrinées; elles sont noirâtres, avec de petites taches cendrées; leur extrémité est un peu terminée en pointe. Les cuisses sont dentées, & les postérieures sont ciliées. Les quatre pattes antérieures ont une dent interne & les quatre pattes postérieures ont des cils roux, serrés à leur extrémité extérieure.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

132. CHARANSON couronné.

CURCULIO coronatus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, niger, thorace rotundato antice spinis plurimis arcuatis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 6. fig. 70.

Il est de la grandeur du *Charanson* barbirostre. Tout le corps est noir. La trompe est cylindrique, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie. Le corcelet est un peu plus large que les élytres, arrondi, lisse à sa partie supérieure, armé de petites épines avancées, un peu arquées, tout autour de sa partie antérieure. Les élytres ont des points enfoncés, assez grands & assez serrés, rangés en stries. Les pattes sont noires, les antérieures sont un peu plus grosses que les autres. Toutes les cuisses sont munies d'une dent.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne.

133. CHARANSON Taureau.

CURCULIO Taurus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace elytrisque tuberculis elevatis, rostro cornubus duobus arcuatis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 6. fig. 60. & pl. 5. fig. 45.

Curculio rhynchoceros longirostris, femoribus dentatis, elytris connatis tuberculatis mucronatis rostro basi bicorni. PALL. *Icon. inf. Sib.* pag. 23. n°. 2. tab. B. fig. 2.

Il est presque de la grandeur du *Charanson* impérial. Les antennes sont noires, arquées, un peu plus longues que le corcelet. La trompe est noire, courbée, assez longue, elle a deux petites élévations

au devant des antennes, & deux cornes assez grandes arquées, pointues, en-deçà. Le corcelet est noir, légèrement couvert d'une poussière cendrée, muni de plusieurs petits tubercules arrondis. Les élytres ont des points enfoncés & quelques tubercules élevés, arrondis; elles sont noires, plus ou moins couvertes d'une poussière cendrée, & leur extrémité est terminée en pointe. Les pattes sont noires. Toutes les cuisses sont munies d'une petite dent.

La femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle est un peu plus petite, & qu'elle n'a que le rudiment des deux cornes.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

134. CHARANSON cornu.

CURCULIO cornutus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace rotundato tuberculato, rostro utrinque spinâ acutâ. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. Pl. 15. fig. 193.

Il ressemble pour la forme & la grandeur au *Charanson* Taureau. Tout le corps est noir. La trompe est courbée, de la longueur du corcelet, munie de chaque côté, vers sa base, d'une corne droite pointue. Le corcelet est arrondi, tout couvert de petits tubercules arrondis. Les élytres sont sillonnées: les sillons ont des points enfoncés, & on voit entr'eux des tubercules élevés, pointus. Toutes les cuisses sont munies d'une dent.

Il se trouve à Cayenne.

135. CHARANSON moisi.

CURCULIO mucoreus.

Curculio longirostris, femoribus quatuor anterioribus dentatis elytris foveis flavescens: supra apicem gibbosis LIN. *Syst. nat.* pag. 612. n°. 49. — *Mus. Lud. ulr.* pag. 53.

Curculio mucoreus. FAB. *Syst. ent.* pag. 136. n°. 52. — *Sp. inf.* tom. 1. pag. 173. n°. 74. — *Mant. inf.* tom. 1. pag. 104. n°. 92.

GRONOV. *Mus.* pag. 589.

Il est assez grand. La trompe est cylindrique, courbée, lisse, noire. Le corcelet est lisse, couvert de chaque côté d'une poussière d'un jaune fauve. Les élytres sont noires, légèrement couvertes d'une poussière jaunâtre, elles sont striées, arrondies & raboteuses à leur base, munies d'une gibbosité assez grande vers l'extrémité. Les pattes sont noires. Les quatre cuisses antérieures sont munies d'une dent, & les postérieures sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

136. CHARANSON page.

CURCULIO pusio

Curculio longirostris, femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris nigris striatis, lineâ repandâ griseâ. LIN. Syst. nat. pag. 612. n°. 50. — Mus. lud. ulr. pag. 46.

Curculio pusio. FAB. Syst. ent. pag. 136. n°. 53. — Sp. inf. tom. 1. pag. 134. n°. 75. — Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 93.

Il est presque de la grandeur des précédens. Tout le corps est noirâtre obscur. La trompe est cylindrique, courbée, glabre, bifide à l'extrémité. Le corcelet est ovale noir, avec une ligne ferrugineuse sur les côtés. Les élytres ont des stries formées par des points oblongs, très-enfoncés : on voit une ligne ferrugineuse, sinuée, qui s'étend de la base à l'extrémité de chaque élytre. Les quatre cuisses postérieures sont munies d'une forte dent. On voit une pointe sur la poitrine à la naissance des cuisses antérieures.

Il se trouve aux Indes orientales.

137. CHARANSON spinipède.

CURCULIO spinipes.

Curculio longirostris, femoribus dentatis niger, thorace lineis duabus, elytris strigis quatuor albis, tibiis anticis spinosis. FAB. Spec. inf. tom. 1. pag. 174. n°. 76. — Mant. inf. tom. 1. pag. 104. n°. 94.

Il est assez grand. Tout le corps est noir, mais vu à la loupe, il paroît légèrement couvert de poils blanchâtres, rares & très-courts. Les antennes sont noires, terminées en masse ovale ; elles sont coudées, & le premier article est aussi long que tous les autres pris ensemble, la trompe est cylindrique, arquée, plus longue que le corcelet. La tête est arrondie & les yeux sont très-peu saillans. Le corcelet est légèrement chagriné, il a une ligne longitudinale blanche, un peu sinuée, vers les côtés extérieurs, & une ligne blanche transversale sur les côtés. L'écusson est petit, noir, arrondi postérieurement. Les élytres sont chagrinées ; elles ont des rangées régulières de points élevés : on y remarque trois lignes transversales blanches, dont une arquée vers la base, qui vient se réunir à la seconde sur le bord extérieur, les deux autres sont droites : il y a aussi un peu de blanc à l'extrémité. Les cuisses sont armées d'une dent. Les jambes antérieures seulement ont une petite dent au milieu de leur partie interne.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, aux Antilles.

138. CHARANSON bombine.

CURCULIO bombina.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, ferrugineo-fusus, elytris striatis : tuberculis elevatis atris. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 1. fig. 12.

Curculio bombina. FAB. Mant. inf. tom. 1. p. 104. n°. 95.

Il est un peu plus gros que le Charanson Tau-reau. Les antennes sont noires. La trompe est noire, courbée, presque de la longueur du corcelet. Le corcelet est arrondi, noir, avec des taches d'un roux cendré, plus ou moins marquées. Les élytres sont noires, avec des taches d'un roux cendré ; elles ont des stries formées par des points enfoncés, & quelques tubercules élevés, noirs, lisses dont quelques-uns postérieurs sont presque épineux. Les pattes sont noires & les cuisses sont épineuses.

Il se trouve à Cayenne.

139. CHARANSON vaginal.

CURCULIO vaginalis.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, elytris striatis : tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis. LIN. Syst. nat. pag. 612. n°. 51. — Mus. lud. ulr. pag. 47.

Curculio longirostris, antennis fræctis, femoribus dentatis, corpore nigro, elytris sulcatis : tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis. DEG. Mém. inf. tom. 5. pag. 266. n°. 2. pl. 15. fig. 23.

Charanson à étui, à longue trompe, à antennes coudées, & à cuisses dentelées, à corps noir, à étuis cannelés terminés en épine & garnis de tubercules élevés. DEG. Ib.

GRON. Zooph. n°. 581. tab. 14. fig. 6.

Il a environ un pouce de long & six lignes de large. Il est d'un noir luisant. La trompe est noire, longue, large, assez grosse, très-courbée. La tête est lisse & arrondie. Le corcelet est gros, un peu convexe, garni de trois tubercules coniques, élevés, assez gros, & de quelques autres plus petits. Les élytres ont des stries bien marquées dans lesquelles se trouvent des points enfoncés : elles ont plusieurs tubercules coniques, dont les postérieurs sont presque épineux ; leur extrémité est terminée en pointe. Toutes les cuisses ont une forte dent.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne, à Surinam.

140. CHARANSON variqueux.

CURCULIO varicosus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, niger supra cinereus, elytris mucronatis striato-punctatis

tuberculoque rotundato. Ent. ou hist. nat. des inf.
CHARANSON. Pl. 1. fig. 14.

Curculio varicosus longirostris, femoribus dentatis, elytris connatis sulcatis supra sextuberculatis, posticè bimucronatis. PALL. Inf. sib. pag. 22. n°. 1. tab. B. fig. 1.

Il est presque de la grandeur du *Charanson* impérial. Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, courbée, de la longueur du corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est lisse, muni supérieurement de deux petits tubercules arrondis, noir, légèrement couvert de poils cendrés, depuis le milieu jusqu'à la partie postérieure. L'écusson est arrondi, cendré. Les élytres sont cendrées à leur partie supérieure, les bords latéraux sont noirs, & le noir avance un peu vers le milieu de chaque élytre. L'extrémité est mucronée; on y remarque des points enfoncés, assez gros, rangés en stries, quelques petits tubercules, & un autre plus gros, plus élevé, arrondi, placé vers la base de chaque élytre. Le dessous du corps & les pattes sont noirs. Les cuisses sont munies d'une petite dent.

Le corps de cet insecte est quelquefois entièrement noir.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

141 CHARANSON Scorpion.

CURCULIO Scorio.

Curculio longirostris femoribus dentatis ater, thorace plano basi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque medio cinereis. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 105. n°. 96.

Il est de la grandeur du précédent. Le corcelet est lisse, anguleux de chaque côté, noir, avec la partie postérieure cendrée. Les élytres ont des stries pointillées & des tubercules presque épineux; elles sont cendrées, avec les bords noirs. Cette couleur s'avance vers le milieu de l'élytre & y forme une large bande. La tête est noire, & la trompe est longue, avancée. Les pattes sont noires, toutes les cuisses sont dentées.

Il se trouve à Cayenne.

142. CHARANSON raboteux.

CURCULIO scaber.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace lavi carinato, elytris mucronatis striatis tuberculatis.

Curculio scaber longirostris, femoribus dentatis, thorace carinato, elytris sulcatis tuberculato spinosis. FAB. Syst. ent. pag. 137. n°. 54. — Sp. inf. tom. 1. pag. 174. n°. 77. — Mant. inf. tom. 1. pag. 105. n°. 97.

Il ressemble au *Charanson* Taureau. Tout le corps est noir. La trompe est lisse, courbée, de la longueur du corcelet. Le corcelet est lisse, & muni d'une élévation longitudinale à sa partie supérieure. Les élytres sont pointues à leur extrémité; elles sont striées: les stries sont pointillées, & entr'elles on voit des tubercules élevés, arrondis. Toutes les cuisses sont munies d'une dent aiguë.

Il se trouve à Cayenne.

143. CHARANSON moucheté.

CURCULIO guttatus.

Curculio longirostris, femoribus subdentatis, niger, thorace lavi maculis duabus posticis flavescens, elytris tuberculatis flavo punctatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 5. fig. 46.

Il est à peu près de la grandeur du *Charanson* fasciculé. Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, un peu plus courte que le corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est arrondi, lisse, noir, avec deux taches jaunâtres, placées à la partie postérieure. Les élytres sont noires, avec quelques points jaunâtres placés depuis le milieu jusqu'à l'extrémité; elles ont des points enfoncés, rangés en stries, & des tubercules arrondis, dont les postérieurs sont presque épineux. Le dessous du corps & les pattes sont très-noirs. Les cuisses ont une dent peu marquée.

Il se trouve à Cayenne.

144. CHARANSON fasciculé.

CURCULIO fascicularis.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris scabris fasciculato-pilosis, pedibus nigro cinereoque variis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 1. fig. 9.

Les antennes sont noires. La trompe est noire, courbée, cylindrique, de la longueur du corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est arrondi, fortement pointillé, noir, avec des poils cendrés & quelques-uns grisâtres. Les élytres sont raboteuses, noires, couvertes de faisceaux de poils noirs dont quelques-uns sont gris. Les pattes sont mélangées de noir & de cendré. Les cuisses sont munies d'une dent.

Il se trouve

145. CHARANSON six-taches.

CURCULIO sexmaculatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, niger thorace rotundato scabro, elytris striato-punctatis maculis sex fulvis.

Les antennes sont noirâtres. La trompe est noire, luisante, cylindrique, courbée, un peu plus longue que le corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est noir en-dessus, couvert d'une poussière rouillée en-dessous, presque arrondi, avec de petits tubercules peu élevés. Les élytres ont des points enfoncés, assez gros, rangés en stries, & trois taches rouillées, dont une à la base, l'autre un peu au-delà du milieu & la troisième plus petite vers l'extrémité. Le dessous du corps est couvert d'une poussière rouillée. Les pattes sont noires; les antérieures sont un peu plus grandes. Les cuisses sont armées d'une petite dent.

Il se trouve à Cayenne.

146. CHARANSON muriqué.

CURCULIO muricatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis fusco-cinereus, elytris striatis verrucosis.

Curculio muricatus. DRURY. *Ill. of inf. tom. 2. tab. 34. fig. 4.*

Curculio muricatus ex fusco nigricans, elytris verrucoso-striatis, femoribus uni-dentatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1762.*

Il a près de huit lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est noire, de la longueur du corcelet. Les yeux sont noirs, grands, oblongs. Le corcelet est obscur & couvert de petits tubercules noirs. Les élytres sont obscures striées & couvertes de tubercules assez grands, arrondis, régulièrement placés, d'inégale grosseur. Les jambes sont de la couleur du corps. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve à la baie de Honduras en Amérique.

147. CHARANSON histrix.

CURCULIO histrix.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris crenato-striatis, maculis quatuor griseis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 15. fig. 182.

Il est noir. Les antennes sont noires, avec l'extrémité cendrée. La trompe est noire, cylindrique, un peu plus longue que le corcelet. La tête est arrondie. Le corcelet est légèrement chagriné à la partie supérieure, couvert de chaque côté de petits points élevés, arrondis. Les élytres ont des stries crénelées, une petite gibbosité vers l'extrémité, & deux points grisâtres, formés par une poussière écailleuse. Les jambes antérieures sont un peu plus grandes que les autres, & toutes les cuisses sont munies d'une dent.

Il se trouve à Cayenne.

148. CHARANSON trifascié.

CURCULIO trifasciatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, thorace linea laterali, elytris albo punctatis maculisque duabus brunneis.

Curculio trifasciatus. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 105. n° 98.*

Il est un peu plus grand que le Charanson du Sapin. Tout le corps est d'une couleur rouge brune. La trompe est de la longueur du corcelet, rouge brune, noirâtre à l'extrémité seulement. Les yeux sont noirs, très-peu saillans. Les antennes sont brunes, coudées, & le premier article est assez long. La tête & le corcelet sont pointillés, & dans le point enfoncé on voit avec la loupe un poil blanc, court, assez gros, distinct. L'écusson est petit. Les élytres ont des stries régulières de points enfoncés, & dans chaque point il y a plusieurs poils blancs réunis, formant des points blancs. De chaque côté du corcelet, il y a une tache oblongue, ferrugineuse, & sur chaque élytre il y en a deux de la même couleur, posées transversalement. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses ont une petite épine.

Il se trouve à Cayenne.

149. CHARANSON urbain.

CURCULIO urbanus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fusco-viridis, thorace elytrisque flavo marginatis.

Curculio cinctus. DRURY. *Ill. of inf. tom. 3. plan. 48. fig. 2.*

Il a de huit à neuf lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est mince, noire, arquée, un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont noires & coudées. Le corcelet est d'un vert obscur, avec une raie longitudinale jaune, de chaque côté. Les élytres sont striées, raboteuses, d'un vert obscur, avec les bords extérieurs jaunes. Le dessous du corps est jaune. Les pattes sont d'un vert noirâtre, & les cuisses sont dentées.

Il se trouve sur la côte des Mosquitoes, près la baie de Honduras, en Amérique.

150. CHARANSON cylindrirostre.

CURCULIO cylindrirostris.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace scabro, elytris pilosae bituberculatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 128.

Curculio cylindrirostris. FAB. *Syst. ent. pag. 137. n° 55. — Sp. inf. tom. 1. p. 174. n° 78. — Mant. inf. tom. 1. p. 105. n. 99.*

Il est assez grand. Tout le corps est noir & plus ou moins couvert d'une poussière ou de petites écailles cendrées, un peu roussâtres. Les antennes sont coudées, & le premier article est plus long que tous les autres pris ensemble. La trompe est droite, cylindrique, un peu plus longue que le corcelet. La tête est arrondie, & les yeux sont noirs & point saillans. Le corcelet est arrondi & tout couvert de tubercules élevés. L'écusson est très-petit. Les élytres ont des lignes longitudinales élevées, crénelées, entre lesquelles il y a des points élevés: on y remarque un tubercule beaucoup plus élevé, au-delà du milieu, & un autre vers l'extrémité. Les pattes sont noires, plus ou moins couvertes d'une poussière écailleuse. Toutes les cuisses sont armées d'une dent aiguë assez forte.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

151. CHARANSON stigmaté.

CURCULIO stigma.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, elytris macula ferruginea. LIN. *Syst. nat. p. 612. n° 52.* — *Mus. Lud. ulr. p. 48.*

Curculio stigma. FAB. *Syst. ent. pag. 137. n° 56.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 174. n° 79.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 105. n° 100.*

Curculio Daviesii. SWED. *Nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n° 3. 13. tab. 8. f. 5.*

Il est de la grandeur du Charanson du Pin. La tête est arrondie, couverte d'une poussière d'un roux cendré. Les yeux sont noirs; l'extrémité de la trompe est noire. Les antennes sont brunes, avec la masse ovale, cendrée. Le corcelet est arrondi, d'un brun ferrugineux, plus ou moins couvert d'une poussière écailleuse d'un roux cendré. Les élytres sont couvertes d'une poussière d'un roux cendré, avec une grande tache ferrugineuse, au milieu de chaque, vers le bord extérieur; elles ont des points enfoncés, rangés en stries, & une gibbosité à peine marquée, vers l'extrémité. Les pattes sont couvertes d'une poussière d'un roux cendré. Les cuisses ont une dent à peine marquée. Le dessous du corcelet a un enfoncement assez profond, dans lequel la trompe s'enchasse.

Il se trouve à Cayenne.

152. CHARANSON hébété.

CURCULIO hebes.

Curculio longirostris femoribus subdentatis, thorace scabro, elytris sulcatis tuberculatis, ore barbato. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 12. fig. 144.*

Curculio hebes. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 174. n° 80.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 105. n° 101.*

Il est court, assez large, d'une forme presque ovale. Il est entièrement très-noir. La trompe est plus courte que le corcelet; elle est chagrinée, & terminée par des poils d'un brun ferrugineux. La tête est chagrinée, & les yeux sont petits, point du tout saillans & bruns. Le corcelet est arrondi, relevé, fortement chagriné. L'écusson est très-petit. Les élytres ont des stries, dans lesquelles il y a une suite de points élevés: on voit sur chaque élytre six tubercules assez élevés, très-noirs, couverts de poils très-courts, disposés sur deux lignes longitudinales: à la base latérale il y a une élévation assez grande. On remarque sur chaque élytre deux taches d'un gris roussâtre, une vers le bord extérieur, & l'autre vers l'extrémité. Les pattes sont couvertes de poils noirs, très-courts. Les cuisses ont une dentelure très-peu marquée. Les jambes antérieures sont un peu comprimées.

Il se trouve au Bengale.

153. CHARANSON dentipède.

CURCULIO dentipes.

Curculio longirostris femoribus dentatis albo-tomentosus, elytris striatis nigris, vitis duabus approximatis albis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 7. fig. 90. a. b.*

Il a environ de cinq à six lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. Les antennes sont noirâtres. La trompe est noire, cylindrique, un peu raboteuse, de la longueur du corcelet. Les yeux sont noirs & point du tout saillans. Le corcelet est couvert d'un duvet blanchâtre; il est lobé postérieurement, & on y remarque quelques petits points noirs élevés. Les élytres sont noires, sillonnées, avec deux raies longitudinales blanches, rapprochées, dont l'extérieure est un peu plus courte. Le dessous du corps est blanc, avec deux rangées de petits points noirs sur l'abdomen. Les pattes sont noires, avec une poussière écailleuse, blanchâtre sur les cuisses. Les cuisses antérieures sont munies d'une petite dent, & les jambes ont une dent assez forte vers le milieu de leur partie interne.

Il se trouve au Sénégal, sur différentes fleurs.

154. CHARANSON annulé.

CURCULIO annulatus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace alytrisque fasciis linearibus nigris. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 6. fig. 62. a. b.*

Curculio annulatus. LIN. *Syst. nat. p. 613. n° 54.* — *Mus. Lud. ulr. p. 51.*

Curculio annulatus longirostris pallidus, femoribus dentatis, thorace elytrisque strigis nigris. FAB. *Syst. ent. pag. 137. n° 57.* — *Sp. inf. tom. 1. p. 175.*

p. 175. n^o. 81. — *Mant. inf. tom. 1. p. 105. n^o. 102.*

Le dessus du corps est d'un blanc sale ; le dessous est cendré. La trompe est noire, mince, cylindrique, courbée. Les yeux sont noirs, entourés d'un anneau blanc. Le corcelet a une bande arquée, noire. Les élytres sont légèrement striées, & ont deux bandes étroites, noires. Les pattes sont noires.

Les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

155. CHARANSON à ZONES.

CURCULIO zonatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis niger, thorace maculis duabus, elytris fasciis tribus albicantibus. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 6. fig. 61. a. b.

Curculio zonatus. SWEDER. Nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n^o. 3. 13. tab. 8. fig. 5.

Il ressemble beaucoup au précédent. Les antennes sont noires, coudées, minces, assez longues. La trompe est noire, luisante, courbée, mince, plus longue que le corcelet. La tête est arrondie, noire, luisante. Le corcelet est noir, luisant, de la largeur des élytres, avec deux grandes taches, formées par une poussière blanchâtre, une de chaque côté, qui se réunissent en dessous, & forment une bande. L'écusson est noir, petit, distinct. Les élytres sont noires, luisantes, avec des points enfoncés, rangés en stries ; & trois bandes quelquefois interrompues, formées par une poussière écailleuse, blanchâtre. Le dessous du corps est noir, avec une grande tache blanchâtre de chaque côté de la poitrine, & une bande sur l'abdomen. Les pattes sont noires ; les antérieures sont un peu plus longues que les autres. Les cuisses sont armées d'une forte dent.

Il se trouve à la Guadeloupe, & m'a été donné par feu M. de Badier.

156. CHARANSON caliginéux.

CURCULIO caliginosus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, oblongus, elytrorum striis punctatis approximatis. FAB. Syst. ent. p. 137. n^o. 15. — Sp. inf. t. 1. p. 175. n^o. 82. — Mant. inf. t. 1. p. 105. n. 103.

Il est un peu plus petit que le Charanson du Pin. Les antennes sont brunes & coudées. Tout le corps est noir, point du tout luisant, sans taches. La trompe est de la longueur du corcelet, & finement raboteuse. La tête est arrondie, & les yeux ne sont point saillans. Le corcelet est arrondi, fortement ponctué, avec une ligne élevée, assez saillante, tout le long de la partie supérieure. Les

Hist. Nat. Insect. Tom. V.

élytres ont des stries disposées par paires, & formées par des points rapprochés, très-enfoncés : entre chaque paire de stries est une ligne un peu saillante. Les cuisses sont armées d'une épine assez forte.

Il se trouve en Angleterre.

157. CHARANSON douteux.

CURCULIO dubius.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, niger, thorace lavi, elytris striatis scabris. FAB. Mant. inf. t. 1. pag. 106. n^o. 104.

Il est grand. La trompe est allongée, noire, unie à l'extrémité. Le corcelet est arrondi, lisse, noir, obscur. Les élytres sont obtuses, striées, avec des points élevés, noirs, luisans, qui les font paroître raboteuses. Les pattes antérieures sont un peu plus longues que les autres.

Il se trouve.....

158. CHARANSON pulvérulent.

CURCULIO pulverulentus.

Curculio longirostris femoribus subdentatis, oblongus fusco cinereoque nebulosus, elytris striato-punctatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON Pl. 8. fig. 98.

Curculio pulverulentus longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro, elytris cinereo maculatis. DEG. Mém. inf. tom. 5. p. 268. n^o. 3. pl. 15. fig. 24.

Charanson poudré, à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses dentelées, à corps oblong, noir, avec des taches cendrées sur les étuis. DEG. *Ib.*

Curculio pulverulentus oblongus niger, elytris cinereo maculatis. LIN. Syst. Nat. edit. 13. pag. 177.

VOET. *Coleopt. par. 2. tab. 38. fig. 36.*

Il est un peu plus grand que les précédens. La trompe est noire, courbée un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont noires, avec les trois derniers articles cendrés. Le corcelet est un peu inégal, mélangé de cendré & de noirâtre, un peu sinué postérieurement. Les élytres sont noirâtres mélangées de cendré ; elles ont des stries formées par des points enfoncés, & une gibbosité peu marquée vers l'extrémité. Le dessous du corps & les pattes sont noirâtres. Les cuisses sont à peine dentées.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne, à Surinam.

159. CHARANSON parfemé.

CURCULIO conspersus.

Curculio longirostris femoribus dentatis fulvo irroratus, pedibus anticis elongatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 14 fig. 179.

Curculio adpersus. FAB. Mant. inf. tom. 1. p. 106. n°. 105.

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au *Charanson lanipède*. Les antennes sont coudées, noires, avec la masse ovale, obscure. La trompe est cylindrique, courbée, plus longue que le corcelet, noire, & luisante. La tête est noire & arrondie. Le corcelet est noir, chagriné & légèrement couvert d'une poussière jaune blanchâtre. L'écusson est noir, arrondi. Les élytres ont des stries un peu crénelées; elles sont noires & parfemées de points jaunes, blanchâtres. Le dessous du corps est noir, parfemé de points jaunes blanchâtres. Les pattes sont noires, luisantes, & les cuisses sont toutes armées d'une dent ou épine. Les pattes antérieures sont un peu plus longues que les autres.

Nous avons changé le nom de *adpersus* parce que M. Fabricius l'avoit déjà donné à une autre espèce.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale à Cayenne.

160. CHARANSON lanipède.

CURCULIO lanipes.

Curculio longirostris niger, elytris crenatis albo irroratis, pedibus anticis longissimis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 130.

Il est un peu plus grand que le *Charanson annulé*. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est noire, luisante, mince, cylindrique, courbée, de la longueur du corcelet. La tête est noire, sans taches, arrondie, avec les yeux point du tout saillans. Le corcelet est raboteux, très-noir, avec le bord antérieur, une ligne longitudinale interrompue & deux points postérieurs, d'un blanc jaunâtre. L'écusson est petit, arrondi, blanc jaunâtre. Les élytres sont striées & crénelées, noires & parfemées de points d'un blanc jaunâtre. Le corps en-dessous est noir, avec un peu de bleu jaunâtre au-dessous du corcelet, aux côtés de la poitrine, & vers l'extrémité du ventre. Les pattes sont noires luisantes, avec les tarses roussâtres. Les pattes antérieures sont très-longues, les jambes un peu arquées & les tarses laineux ou garnis de poils roussâtres, longs & fins. Toutes les cuisses sont armées d'une petite dent.

Il se trouve dans l'isle de Sainte Lucie.

161. CHARANSON Panthère.

CURCULIO pantherinus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, brunneus, rostro nigricante, thorace elytrisque flavo punctatis & maculatis Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13 fig. 153.

Il ressemble pour la forme & la grandeur au *Charanson parfemé*. Les antennes sont noires, avec la masse cendrée. La trompe est mince, brune, luisante, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, couverte d'une poussière cendrée, roussâtre. Les yeux sont noirs. Le corcelet est arrondi, brun, avec plusieurs taches roussâtres. Les élytres ont des points rangés, en stries, elles sont brunes, avec des points & des taches d'un roux cendré. Le dessous du corps est cendré. Les pattes sont brunes, légèrement couvertes d'un duvet cendré: les antérieures sont un peu plus grandes que les autres. Les cuisses sont armées d'une dent.

Il se trouve à Cayenne.

162. CHARANSON brun.

CURCULIO brunneus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, brunneus rostro fusco, elytris testaceis punctato striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 120.

Curculio brunneus. FAB. Spec. inf. tom. 1. pag. 175. n°. 83. — Mant. inf. tom. 1. pag. 106. n°. 106.

Il est de la grandeur du *Charanson parfemé*. Les antennes sont noirâtres, avec la masse cendrée obscure. La trompe est de la longueur du corcelet; elle est brune obscure, avec deux sillons de chaque côté, depuis sa base jusqu'à l'insertion des antennes. La tête est pointillée, brune. Les yeux sont noirs, assez grands & point saillans. Le corcelet est brun & fortement pointillé. L'écusson est brun & très-petit. Les élytres sont d'un brun clair ferrugineux, avec des stries régulières, formées par des points enfoncés, & une petite élévation vers l'extrémité. Le dessous du corps est d'un brun clair. Les pattes sont d'un brun ferrugineux ou testacé, avec une dent assez forte à toutes les cuisses.

Il se trouve au Cap de Bonne - Espérance.

163. CHARANSON Hibou.

CURCULIO Strix.

Curculio longirostris femoribus dentatis, fuscus, elytris fulvo irroratis, abdomine rufo, maculis duabus ocellaribus atris.

Il a cinq lignes de long depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. Les antennes sont minces, coudées, d'un brun noirâtre. Le troisième & le quatrième articles sont allongés. La trompe est mince,

arquée, d'un brun noirâtre, un peu plus longue que le corcelet, & appliquée contre le dessous du corps. La tête est arrondie, couverte d'un duvet roussâtre. Les yeux sont noirs, grands, presque réunis à leur partie supérieure. Le corcelet est noir, avec quelques lignes irrégulières fauves. Les élytres sont noires & parsemées de points fauves. Le dessous du corps est d'une couleur cendrée un peu fauve, avec quelques taches latérales noires. L'abdomen est court, presque tronqué & marqué postérieurement de deux grandes taches oblongues très-noires, entourées d'un anneau grisâtre, les pattes sont obscures & les cuisses sont dentées.

Il se trouve à Cayenne.

164. CHARANSON du Sapin.

CURCULIO Abietis.

Curculio longirostris, elytris fuscis: fasciis duabus linearibus interruptis griseis, femoribus dentatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 7. fig. 78. a. b.

Curculio Abietis. LIN. Syst. nat. pag. 613. n°. 57. — Faun. suec. n°. 615.

Curculio subfuscus. LIN. It. Oel. pag. 26.

Curculio Abietis. FAB. Syst. ent. pag. 138. n°. 59. — Spec. inf. tom. 1. pag. 175. n°. 84. — Mant. inf. tom. 1. pag. 106. n°. 107.

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro maculis griseo-flavis. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 204. n°. 1. pl. 6. fig. 11.

Charanson du Sapin, à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses dentelées, à corps oblong noir, avec des mouchetures d'un jaune grisâtre. DEG. Ib.

Curculio niger, maculis villosa-flavis, elytris subrugosis. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 292 n°. 35.

Le Charanson tigré. GEOFF. Ib.

Curculio norwegicus niger, signaturis flavescensibus adpersus. PET. Gax. 14. tab. 8. fig. 6.

SCHÆFF. *Icon. inf. tab. 25. fig. 1.*

Curculio Abietis. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 211.

Curculio Abietis. LAICHART. Inf. 1. pag. 213. n°. 10.

Curculio tigrinus. FOURC. Ent. par. 1. pag. 126. n°. 36.

Curculio Abietis. VILL. Ent. tom. 1. pag. 195. n°. 91.

Il ressemble beaucoup au Charanson du Pin. Il

est un peu plus grand, & ses cuisses sont dentées. Tout le corps est d'un brun noirâtre. La trompe est presque de la longueur du corcelet. La tête & le corcelet sont arrondis, finement chagrinés, légèrement couverts de quelques poils fauves. Les élytres sont chagrinées, avec des points peu enfoncés, presque carrés, rangés en stries; elles ont des points fauves, disposés en lignes transversales. Les pattes sont de la couleur du corps.

Il se trouve au nord de l'Europe.

165. CHARANSON réticulé.

CURCULIO reticulatus.

Curculio longirostris oblongus piceus, femoribus dentatis, elytris reticulatis, fasciis obliquis pallidis, tibiis anticis spinosis. FAB. Syst. ent. p. 138. n. 60. — Sp. inf. t. 1. p. 176. n. 85. — Mant. inf. tom. 1. p. 106. n°. 108.

Il ressemble au Charanson du Sapin, mais il est un peu plus allongé. La trompe est très-noire. Les élytres sont finement réticulées, avec quelques lignes obliques pâles. Tout le corps est d'un brun noirâtre. Les cuisses sont dentées. Les jambes antérieures sont terminées par un crochet fort.

Il se trouve à Tranquebar.

166. CHARANSON chinois.

CURCULIO chinensis.

Curculio longirostris femoribus dentatis, niger scaber, thorace elytris basi apiceque ferrugineo cinereoque maculatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 8. fig. 97. a. b.

Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, mince, de la longueur du corcelet. Le corcelet est raboteux, noir & couvert d'une poussière grise & ferrugineuse. Les élytres sont raboteuses, anguleuses à leur base extérieure, noires, avec la base & l'extrémité d'un gris ferrugineux. Le dessous du corps est noir, avec des points d'un gris ferrugineux. Les parties sont noires, & les cuisses sont dentées & ont quelques petites taches ferrugineuses.

Il se trouve à la Chine.

167. CHARANSON CONVEXE.

CURCULIO convexus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, niger, elytris excavato-punctatis striga postica interrupta grisea. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 8. fig. 88.

Le corps de cet insecte est très-élevé, noir. La trompe est cylindrique, à-peu-près de la longueur du corcelet. Le corcelet est arrondi, chagriné

Les élytres ont des points enfoncés assez gros, presque rangés en stries, & une ligne transversale, au-delà du milieu, interrompue, formée par une poussière écailleuse, grise. Le dessous du corps est couvert d'une poussière écailleuse, ferrugineuse. Toutes les cuisses & les quatre jambes antérieures sont munies d'une dent pointue.

Il se trouve à l'île de Bourbon.

168. CHARANSON latéral.

CURCULIO lateralis.

Curculio longirostris femoribus dentatis, niger, thorace elytrisque scabriusculis fusco-cinereis, elytris macula atra laterali. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 5. fig. 49.

Il est de la grandeur du Charanson colon. Les antennes sont noires. La trompe est noire, cylindrique, de la longueur du corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est arrondi, un peu raboteux, noir, légèrement couvert d'une poussière cendrée. L'écusson est cendré. Les élytres sont noires, un peu raboteuses, couvertes d'un duvet cendré, avec une grande tache irrégulière très-noire, de chaque côté. Le dessous du corps & les pattes sont noirs. Toutes les cuisses sont armées d'une forte dent.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à Cayenne.

169. CHARANSON multimoucheté.

CURCULIO multiguttatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, niger, thorace elytrisque punctis luteis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 163.

Il est de la grandeur du Charanson du Sapin. Les antennes sont obscures & coudées. La trompe est cylindrique, un peu courbée, de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, noirâtre, sans taches. Le corcelet est arrondi, noirâtre, avec deux points de chaque côté, d'un jaune blanc, dont le plus bas est le plus gros. Les élytres ont des stries peu marquées, formées par des points enfoncés; elles sont noirâtres, avec plusieurs points d'un jaune blanchâtre. Les pattes sont obscures, & les cuisses ont chacune une dentelure.

Il se trouve.....

170. CHARANSON pupillaire.

CURCULIO pupillatus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fuscus, thorace elytrisque tuberculatis, elytris macula laterali cinerea nigro punctata. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 15. fig. 183.

Il ressemble pour la forme & la grandeur au Charanson colon. La trompe est brune cylindrique; courbée, un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont brunes, avec la masse ovale, un peu cendrée. Le corcelet est obscur, arrondi, tout couvert de petits tubercules. L'écusson est cendré. Les élytres sont tuberculées, obscures, avec une grande tache cendrée, de chaque côté, marquée de trois points noirs, dont l'un au milieu, plus grand & oblong. Le dessous du corps est obscur. Les pattes sont brunes, & les cuisses sont munies d'une dent pointue.

Il se trouve à Cayenne.

171. CHARANSON de la Patience.

CURCULIO Lapathi.

Curculio longirostris femoribus bidentatis albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 6. fig. 69. a. b.

Curculio Lapathi. FAB. Syst. ent. pag. 138. n° 61. — Sp. inf. tom. 1. pag. 176. n° 86. — Mant. inf. tom. 1. pag. 106. n° 109.

Curculio Lapathi longirostris albido nigroque varius muricatus. LIN. Syst. nat. pag. 608. n° 20. — FAUN. Suec. n° 591.

Curculio albicaudis longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore ovato nigro fasciculis pilosis, elytris postice albis. DEG. Mém. inf. t. 5. p. 223. n. 16. Pl. 7. fig. 1. & 2.

Charanson noir, à derrière blanc, à longue trompe déliée, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps oblong noir, à petites brosses élevées, & à étuis blancs par derrière. DEG. *lb.*

Curculio Lapathi. SEHRANK. Enum. inf. aust. n° 212.

Curculio Lapathi. LAICHART. tom. 1. pag. 220. n° 15.

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 39. fig. 40.*

Curculio Lapathi. FUESL. Archiv. inf. 4. pag. 75. n° 36.

Curculio Lapathi. VILL. Ent. tom. 1. pag. 178. n° 16.

Il a environ quatre lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'anus. La trompe est noire, mince, courbée, de la longueur du corcelet. Les antennes sont d'un brun noirâtre, avec la masse noire. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est noir, couvert de quelques tubercules velus, très-noirs; avec une tache cendrée, de chaque côté, un peu en-dessous. Les élytres sont noires, avec des points enfoncés, rangés en stries, quelques tubercules couverts de poils courts, ferrés, très-noirs; & toute

la partie postérieure blanchâtre. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont mélangées de noir & de cendré. Les cuisses ont une dent à peine marquée.

Il se trouve en Europe, sur la Patience.

172. CHARANSON irroré.

CURCULIO irroratus.

Curculio longirostris femoribus dentatis albus supra fuscus albo maculatus, femoribus fusco annulatis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 106. n^o. 110.*

Il ressemble au précédent, pour la forme & la grandeur. La tête est mélangée de blanc & de noir. La trompe est noire. Le corcelet & les élytres sont lisses, noirs, parsemés de petits points blancs. Le corps est blanc. Les pattes sont blanches. Les cuisses sont dentées & marquées de deux points blancs.

Il se trouve à Cayenne.

173. CHARANSON sixmoucheté.

CURCULIO sexguttatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, niger, elytris maculis tribus albis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 14. fig. 170.*

Curculio sexguttatus. FAB. *Syst. ent. pag. 138. n^o. 62. — Sp. inf. tom. 1. pag. 176. n^o. 87. — Mant. inf. tom. 1. pag. 106. n^o. 111.*

Curculio ovalis. DRURY. *Illust. of inf. tom. 2. pl. 33. fig. 1. 2.*

Il est plus petit que le *Charanson* de la Patience. Les antennes sont noires & couées. La trompe est cylindrique, courbée, de la longueur du corcelet, noire, avec un peu de blanc à la partie supérieure. Le corcelet est arrondi, noir, avec une grande tache blanche de chaque côté. L'écusson est noir & petit. Les élytres sont noires avec trois grandes taches blanches sur chaque. Le dessous du corps est noir, avec les côtés de la poitrine & les bords de l'abdomen blancs. Les pattes sont noires, avec un peu de blanc sur les cuisses. Toutes les cuisses sont armées d'une dentelure ou épine.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à la Jamaïque.

174. CHARANSON luride.

CURCULIO luridus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, ovatus obscur niger, elytris punctato-striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 14. fig. 175.*

Curculio luridus. FAB. *Syst. ent. pag. 138. n^o. 63.*

— Sp. inf. tom. 1. pag. 176. n^o. 88. — Mant. inf. tom. 1. pag. 106. n^o. 112.

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au *Charanson* de la Patience. Tout le corps est d'un noir obscur très-foncé. L'extrémité des antennes est cendrée noirâtre. La trompe est presque de la longueur du corcelet, & l'insecte la porte collée contre la poitrine. La tête est petite, arrondie, chagrinée, avec une petite ligne élevée, longitudinale. Les yeux ne sont point saillans. Le corcelet est arrondi, chagriné, avec une ligne longitudinale élevée, peu marquée. L'écusson est à peine apparent. Les élytres ont des rangées de points oblongs, enfoncés, qui forment des stries qui se joignent deux à deux, à leur partie postérieure. Les jambes sont fortement pointillées. Les cuisses sont armées d'une dent assez courte.

Il se trouve dans la nouvelle-Hollande.

175. CHARANSON stolidus.

CURCULIO stolidus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fuscus, tibiis posticis incurvis dentatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 12. fig. 115.*

Curculio stolidus. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 176. n^o. 89. — Mant. inf. tom. 1. pag. 106. n^o. 113.*

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires. Tout le corps est obscur, & plus ou moins couvert de petites écailles d'un gris roussâtre. La trompe est noire, presque de la longueur du corcelet. La tête est couverte d'écailles roussâtres obscures. Les yeux sont bruns, petits, & point saillans. Le corcelet est arrondi & chagriné. L'écusson est petit, à peine apparent, couvert de poils roussâtres, très-courts. Les élytres ont des stries régulières, dans lesquelles il y a quelques points enfoncés. Le dessous du corps est tout couvert d'écailles cendrées roussâtres. Les pattes sont couvertes des mêmes écailles. Les cuisses sont armées d'une dent. Les jambes postérieures sont courtes, un peu courbées, & armées d'une dent à la partie interne & d'une autre à la partie externe, vers l'extrémité.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

176. CHARANSON frigide.

CURCULIO frigidus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis fuscus, elytris striatis subtuberculatis ferrugineo variis. FAB. *Mant. inf. app. pag. 381.*

Il est de grandeur moyenne, & il ressemble un peu au précédent. La tête est noirâtre, avec un point ferrugineux, à la base de la trompe, & une ligne blanchâtre à la partie supérieure. Le corcelet est arrondi, noir, avec un ou deux points ferrugineux & une ligne longitudinale de la même couleur, à la partie supérieure. Les élytres ont des stries poin-

millées ; elles sont un peu tuberculées, noires, mélangées de ferrugineux : cette dernière couleur forme presque trois bandes. Les pattes sont pâles & les cuisses sont dentées.

Il se trouve à Amboine.

177. CHARANSON méditatif.

CURCULIO meditabundus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, elytris striatis postice acuminatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. II. fig. 132.

Curculio meditabundus. FAB. Syst. entom. pag. 139. n°. 64. — Sp. inf. tom. I. pag. 176. n°. 90. — Mant. inf. tom. I. pag. 106. n°. 114.

Il est à-peu-près de la grandeur du Charanson de la Patience. Il est tout noir, & point du tout luisant. Les antennes sont coudées. La trompe est mince, cylindrique, presque de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, & les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est chagriné & un peu sinué postérieurement. L'écusson est arrondi & très-petit. Les élytres sont striées, elles ont des points enfoncés dans les stries ; leur extrémité est terminée en pointe très-aigüe. Les cuisses sont armées d'une épine. Les jambes sont un peu arquées, & terminées par un ongle assez fort. Vu à la loupe, tout le corps paroît couvert de petites écailles noires, imbriquées.

Il se trouve dans la nouvelle-Hollande.

178. CHARANSON stupide.

CURCULIO stupidus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 151.

Curculio stupidus. FAB. Syst. ent. p. 139. n°. 65. — Sp. inf. t. I. p. 177. n°. 91. — mant. inf. t. I. p. 107. n°. 115.

Il est de la grandeur du Charanson méditatif, mais plus large, ce qui lui donne une forme ovale. Tout le corps est noir & point du tout luisant. Les antennes sont coudées. La trompe est un peu plus courte que le corcelet ; elle est raboteuse, avec quelques lignes longitudinales élevées, irrégulières, & l'insecte la porte colée contre son corps. La tête est petite, & les yeux ne sont pas du tout saillans ; elle est chagrinée. Le corcelet est aussi large que les élytres, il est arrondi sur les côtés, & coupé droit postérieurement. L'écusson manque entièrement. Les élytres sont raboteuses ; elles ont des lignes longitudinales un peu élevées, sur lesquelles il y a des tubercules élevés, un peu pointus. Les pattes sont fortement pointillées : il y a quelques poils

rates, très-courts. Les cuisses sont armées d'une épine, & les jambes postérieures sont plus longues que les autres & un peu arquées.

Il se trouve dans la nouvelle-Hollande.

179. CHARANSON du Manglier.

CURCULIO Mangifera.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, griseus, thorace lineâ, punctisque duobus dorsalibus albis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 137.

Curculio Mangifera. FAB. Syst. ent. p. 139. n°. 66. — Sp. inf. tom. I. pag. 177. n°. 92. — Mant. inf. tom. I. pag. 107. n°. 116.

Curculio Mangifera. Naturf. 24. pag. 46. n°. 12. tab. 2. fig. 13.

Il ressemble un peu pour la forme & la grandeur, au Charanson de la Patience. Tout le corps est grisâtre, obscur. La trompe est cylindrique, mince, courbée, presque de la longueur du corcelet ; elle est grise, avec l'extrémité noire. Les antennes sont noires, coudées. La tête est arrondie, & les yeux sont noirs, point saillans. Le corcelet a une ligne longitudinale, au milieu, grise : les points blancs manquent dans les espèces que j'ai vues. L'écusson est blanchâtre, arrondi, très-petit. Les élytres sont striées, & dans chaque strie il y a des points enfoncés assez grands. Les cuisses sont légèrement dentées.

Il se trouve aux Indes Orientales. La larve vit dans les noyaux des fruits du Manglier.

180. CHARANSON folâtre.

CURCULIO stultus.

Curculio longirostris femoribus dentatis griseus, elytris maculâ communi lunatâ cinereâ, rostro atro. FAB. Mant. inf. tom. I. pag. 107. n°. 117.

Il est un peu plus petit que le Charanson du Manglier. La trompe est mince, alongée, courbée & noire. Le corcelet est gris, couvert de points élevés qui le font paroître raboteux. Les élytres sont striées, grises, avec une grande tache postérieure, commune aux deux élytres, cendrée, en forme de croissant. Les pattes sont grises & les cuisses sont dentées.

Il se trouve sur la côte de Coromandel.

181. CHARANSON oculé.

CURCULIO ocellatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis niger, elytris maculâ ocellari atrâ. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 3. fig. 31.

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 38. fig. 29.*

Il a environ cinq lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. Les antennes sont noires, coudées. La trompe est noire, luisante, de la longueur du corcelet. Tout le corps est d'un noir obscur. Les élytres ont chacune vers le milieu, une tache très-noire, veloutée, entourée d'un cercle d'un fauve obscur. Les pattes sont de la couleur du corps & les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

182. CHARANSON squalide.

CURCULIO squalidus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, villosogriseus, 10stro testaceo. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON, Pl. 15. fig. 184. a. b.

Curculio squalidus. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 177. no. 93. — Mant. inf. tom. 1. pag. 107. n°. 118.

Il ressemble entièrement pour la forme & la grandeur au Charanson du Verbascum. Les antennes sont ferrugineuses & coudées. La trompe est ferrugineuse, cylindrique, un peu courbée, mince, plus longue que le corcelet. La tête est obscure arrondie, avec une très-petite ligne longitudinale élevée. Les yeux sont noirs & point saillans. Le corcelet est obscur, avec trois lignes longitudinales grises, peu marquées. L'écusson est blanchâtre, allongé, petit. Les élytres sont striées; elles sont d'un gris brun, sans taches. Le dessous du corps est grisâtre. Les pattes sont ferrugineuses foncées, avec des poils courts, gris. Tout le corps est couvert de petites écailles umbriquées.

Il se trouve à Surinam.

183. CHARANSON germain.

CURCULIO germanus.

Curculio longirostris femoribus dentatis ater, thorace utrinque punctis duobus testaceis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON, Pl. 4. fig. 43. a. b.

Curculio germanus. FAB. Syst. ent. pag. 139. n°. 67. — Sp. inf. tom. 1. pag. 177. n°. 94. — Mant. inf. tom. 1. pag. 107. n°. 119.

Curculio longirostris femoribus subdentatis, corpore ovato nigro punctis testaceis adperso. LIN. Syst. nat. pag. 613. n°. 58.

Curculio niger apterus, thorace utrinque puncto duplici fulvo, basi pilis fulvis coronata. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 291. n°. 34.

Le Charanson à corcelet couronné. GEOFF. *ib.*

FRICH. *Inf. 13. pag. 28. tab. 26.*

Curculio germanus. Scop. ann. 5. hist. nat. p. 91. n°. 44.

Curculio germanus. SULZ. Hist. inf. tab. 4. fig. 8.

SCHAEFF. *Icon. inf. tab. 25. fig. 2. ?*

Curculio germanus. SCHRANK. Enum. inf. aust. no. 210.

Curculio germanus. LAICHART. Tom. 1. p. 204. n°. 1.

Curculio coronatus. FOURC. Ent. par. 1. pag. 126 n°. 34.

Curculio germanus. VILL. Ent. tom. 1. pag. 195. n°. 92.

Il a environ cinq à six lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est assez grosse, presque de la longueur du corcelet. Tout le corps est noir, luisant. Le corcelet est arrondi, finement chagriné, avec deux petits points cendrés, de chaque côté; le bord postérieur est quelquefois cendré. Les élytres sont chagrinées, ordinairement sans taches. Le dessous du corps a quelques taches cendrées. Les pattes sont noires, luisantes, sans taches. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans toute l'Europe.

184. CHARANSON charbonier.

CURCULIO carbonarius.

Curculio longirostris, femoribus omnibus dentatis, corpore nigro oblongo, elytris striatis. LIN. Syst. nat. pag. 612. n°. 48. — Faun. suec. n°. 614.

Curculio carbonarius. FUESL. Archiv. inf. 5. p. 27. n°. 47. tab. 27. fig. 21.

Curculio carbonarius. Scop. Ent. carn. n°. 79.

Il est presque de la grandeur du Charanson Sapin; tout le corps est noir. La trompe est allongée. Les antennes sont coudées, légèrement velues à leur extrémité. Le corcelet a des points enfoncés, irréguliers. Les élytres ont des stries pointillées. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Europe.

185. CHARANSON de la Scrophulaire.

Curculio Scrophularia.

Curculio longirostris subglobosus, coleoptris maculis duabus atris dorsalibus.

Curculio Scrophularia. LIN. Syst. nat. pag. 614. n°. 61. — Faun. suec. n°. 603.

Curculio punctis duobus nigris thorace exalbido. LIN. Faun. suec. ed. 1. n°. 460.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, coleopteris maculis duabus dorsalibus atris. FAB. *Syst. ent.* p. 140. n°. 68. — *Sp. inf. t. i. p. 177. no. 95.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 107. n°. 120.*

Curculio subglobosus, cinereus punctis duobus, nigris sutura longitudinalis coleopterorum. GEOFF. *As. tom. 1. pag. 298. n°. 45.*

Le Charançon gris de la Scrophulaire. GEOFF. *Ib.*

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore subgloboso fusco griseove, coleopteris maculis duabus rotundis nigris dorsalibus. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 208. n°. 3. pl. 6. fig. 17. 18. 19. & 20.*

Charançon de la Scrophulaire, à longue trompe à antennes coudées & à cuisses dentelées, à corps court brun ou gris, avec deux taches circulaires noires, sur les étuis. DEG. *Ib.*

REaum. *Mem. inf. tom. 3. pl. 2. fig. 12.*

Scarabæus exiguus cinereus duabus maculis nigris in alarum thecis insignitus. LINS. *Inf. pag. 395. tit. 35.*

Curculio Scrophularia. SCHRANK. *Enum. inf. aust. n°. 215.*

Curculio Scrophularia. LAICHART. *Inf. t. 1. pag. 224. n°. 18.*

Curculio hortulanus FOURC. *Entom. par. 1. pag. 129. n°. 48.*

Curculio Scrophularia. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 197. n°. 95.*

Cet insecte a une forme globuleuse. La trompe est mince, noire, plus longue que le corcelet. Les antennes sont brunes, avec la masse qui les termine, cendrée. Le corcelet est gris, sans taches. Les élytres sont grises, avec deux taches noires sur la suture, l'une vers la base & l'autre vers l'extrémité, & des lignes longitudinales formées par des points noirs & des points gris. Le dessous du corps & les pattes sont gris.

La couleur de cet insecte est due à des poils courts ferrés.

Ce Charançon vit sur la Scrophulaire nommée *Scrophularia nodosa.* LIN. *Flor. succ.* Pour peu qu'on touche à la plante, il se laisse tomber, & imite le mort comme bien d'autres Charançons. La larve vit également sur la Scrophulaire, on l'y trouve en grande quantité au mois de juillet. Elle ronge les feuilles de cette plante, dont elle se détache quelquefois que la substance du dessous de la feuille, mais souvent elle les perce d'un trou en outre. Elle se tient ordinairement sur le dessous des feuilles, comme pour se mettre à couvert des rayons du soleil & de la pluie. Souvent elle dévore les fleurs & même les capsules de la graine.

Elle est d'un blanc verdâtre & quelquefois d'un vert sale, ayant une tête écaillée noire, deux petites plaques noires également écaillées sur le premier anneau du corps, mais point de pattes. Elle a un air dégoûtant parce que le corps est toujours couvert & enduit d'une couche de matière humide & gluante, qui l'aide à se tenir fixée sur la feuille ou sur la tige où elle marche, ce qu'elle exécute uniquement par le mouvement des anneaux. Quant on la force à jeuner long-temps, le corps s'affaïsse & devient tout ridé, mais ces rides s'effacent à mesure qu'elle se nourrit. Pour se transformer elle se construit une coque brune ronde, en forme de boule, & semblable à une petite vessie qu'elle attache fortement à la feuille ou à la tige. Quoique très-mince, cette coque est assez forte & a une espèce d'élasticité: il y a apparence qu'elle est composée de la matière gluante du corps de la larve; car séchée, elle est friable comme une gomme sèche: peut-être qu'elle est encore mêlée de soye. Elle est un peu transparente, & l'on peut y distinguer l'insecte qui s'y transforme en nymphe & puis en Charançon. Quant ce lui-ci doit sortir de sa coque; il en détache avec ses dents une grande portion en forme de segment de sphère ou de calotte, qui laissant une grande ouverture, lui donne un passage libre. La calotte reste quelquefois attachée à la coque par une petite portion, & représente alors un couvercle à charnière, mais le plus souvent elle tombe entièrement. On trouve souvent ensemble sur la même plante, des larves, des coques, & des Charançons de différents âges.

Il se trouve dans toute l'Europe.

186 CHARANÇON du Verbascum.

CURCULIO Verbasci.

Curculio longirostris femoribus dentatis niger, thoracis lateribus flavescens, elytris punctis albis nigrisque alternis striatis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 107. n°. 121.*

Curculio subglobosus niger, punctis duobus atris, sutura longitudinalis coleopterorum, thorace exalbido. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 296. n°. 44.*

Le Charançon à lozange de la Scrophulaire. GEOFF. *Ib.*

Curculio tuberosus. SCOP. *Ent. carn. n°. 80.*

Curculio Scrophularis. FOURC. *Ent. par. 1. pag. 129. n°. 47.*

Il est à-peu près de la grandeur du Charançon de la Scrophulaire, auquel il ressemble beaucoup. La trompe est noire, mince, un peu plus longue que le corcelet. La tête est noire, arrondie. Le corcelet est noir à la partie supérieure, roussâtre de chaque côté. Les élytres sont noires, avec plusieurs rangées

gées de points très noirs ; élevés , un point très-noir , vers la base , au milieu de la suture , un point blanchâtre derrière le point noir , & un autre moins marqué vers l'extrémité.

Il se trouve en France , à Kiell , sur le Verbascum. Il est commun en Provence sur la Scrophulaire.

187. CHARANSON grave.

CURCULIO gravis,

Curculio longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo variegatis, femoribus canaliculatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 14. fig. 177. a. b.

Curculio gravis. FAB. Syst. ent. p. 140. n°. 69. — Sp. inf. tom. 1. p. 178. n°. 96. — Mant. inf. tom. 1. p. 107. n°. 122.

Il est de la grandeur du Charanson des Noix. La trompe est noire, raboteuse, de la longueur du corcelet. Les antennes sont noires & coudées. La tête est petite, arrondie, noirâtre, raboteuse. Les yeux sont noirs & point saillans. Le corcelet est noir, raboteux, avec trois lignes longitudinales effacées, ferrugineuses. L'écusson est petit & blanchâtre. Les élytres sont raboteuses, striées, avec des points enfoncés dans les stries : elles sont obscures avec quelques taches irrégulières ferrugineuses ; cette couleur est due à de petites écailles imbriquées. Le dessous du corps est obscur, avec quelques écailles d'un gris rouffâtre. Les pattes sont obscures, avec quelques poils griffatés. Les cuisses ont un sillon longitudinal à leur partie inférieure, & elles sont armées d'une dent.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

188. CHARANSON cinq-points.

CURCULIO quinquepunctatus,

Curculio longirostris, femoribus dentatis, elytris sutura alba maculisque duabus. LIN. Syst. nat. p. 614. n°. 64. — FAUN. Suec. n°. 618.

Curculio quinquepunctatus longirostris, femoribus dentatis, elytris sutura punctisque duobus albis. FAB. Syst. ent. pag. 140. n°. 70. — Sp. inf. tom. 1. pag. 178. n°. 97. — Mant. inf. tom. 1. pag. 107. n°. 123.

Curculio quinquepunctatus. FUESL. Archiv. inf. 5. pag. 75. n°. 40 tab. 24. fig. 18. g.

Il a environ deux lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'anus, & il a une forme allongée. La trompe est mince, de la longueur du corcelet. Les antennes sont brunes. Tout le corps est d'un

Hist. Nat. des Insectes. Tom. V.

brun luisant, quelquefois bronzé. Le corcelet a une ligne longitudinale blanche, à sa partie supérieure. Les élytres sont finement striées ; elles ont la suture blanche & deux points blancs oblongs, sur chaque élytre. Le dessous du corps est cendré. Les cuisses sont armées d'une forte dent.

Il se trouve au nord de l'Europe, aux environs de Paris.

189. CHARANSON gouttelette.

CURCULIO guttula.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace tuberculato niger, elytris striatis : puncto postico albo. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 107. n°. 124.

Curculio subglobosus, squamosus, cinereo-fuscus, elytrorum maculis tribus & apice albis. GEOFF. Inf. tom. 1. pag. 299. n°. 47.

Le Charanson brun à points blancs. GEOFF. Ib.

Curculio Urtica. SCOP. Ent. carn. n°. 83.

Curculio Urtica. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 216.

Curculio tripunctatus. FOURC. Ent. par. 1. p. 130. n°. 50.

Il est deux fois plus petit que le Charanson de la Scrophulaire. La trompe est mince, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont brunes, avec la masse qui les termine, noirâtre. Le corcelet est noir, avec les côtés & le dessous cendré ; il a une ligne longitudinale un peu enfoncée, au milieu, & un tubercule presque épineux, de chaque côté. Les élytres sont striées, noires, avec quelques écailles blanches, & un point blanchâtre plus ou moins marqué, vers l'extrémité, & l'extrémité quelquefois blanchâtre. Les pattes sont brunes, & les cuisses sont dentées, & couvertes de quelques écailles cendrées.

Il se trouve en Europe, sur l'Ortie.

190. CHARANSON didyme.

CURCULIO didymus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, supra fuscus, elytris striatis, macula laterali transversa alba. FAB. Sp. inf. tom. 1. p. 178. n°. 98. — Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n°. 125.

Il est petit. Le dessus du corps est noirâtre & le dessous est gris. La trompe est allongée, noire. Les élytres sont obscures, fortement striées, avec une tache transversale blanche, formée de trois points. Les cuisses sont fortement dentées.

Il se trouve en Allemagne.

191. CHARANSON hémorrhoidal.

CURCULIO hamorrhoidalis.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace fusco : lateribus cinerascensibus, elytrorum sutura apice ferruginea. FAB. *Syst. ent.* pag. 140. n°. 71. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 178. n°. 99.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 108. n°. 126.*

Il est de la grandeur du Charanson de la Scrophulaire. Les antennes sont brunes, noirâtres & coudées. La trompe est noire, un peu chagrinée, presque de la longueur du corcelet. La tête est arrondie, noire, chagrinée. Les yeux sont noirs & point saillans. Le corcelet est chagriné; il est noir, avec les côtés couverts d'une poussière d'un gris ferrugineux. L'écusson est oblong, arrondi postérieurement & noir. Les élytres ont des stries régulières, dans lesquelles il y a une suite de gros points enfoncés; elles sont d'un brun noir, avec la suture postérieurement & l'extrémité, couvertes d'une poussière écailleuse, ferrugineuse. Le dessous du corps est noir, & couvert de petites écailles grises ou ferrugineuses. Les pattes sont brunes, noirâtres, avec des écailles grisâtres. Les cuisses sont armées d'une épine.

Il se trouve dans la nouvelle-Hollande.

192. CHARANSON trimaculé.

CURCULIO trimaculatus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, coleoptris nigris, maculis tribus cinereis, postica communi lunata. FAB. *Syst. ent.* pag. 141. n°. 72. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 178. n°. 100.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 108. n°. 127.*

La tête est noire, sans taches. Le corcelet est noirâtre en-dessus, avec une tache de chaque côté, cendrée, vers le bord antérieur, & une ligne longitudinale brune, sur le dos. Les élytres sont noirâtres, avec la suture brune, à la base, un petit point blanc, une grande tache blanche, au milieu du bord extérieur, & une autre en croissant, vers l'extrémité. La poitrine & l'abdomen sont cendrés. Les cuisses sont dentées, noirâtres, avec un cercle cendré.

M. Fabricius dit avoir reçu un individu de Suède, qui avoit une grande tache commune aux deux élytres, placée vers le milieu, indépendamment de celles dont nous venons de parler.

Il se trouve dans l'Alsace.

193. CHARANSON petite-ligne.

CURCULIO liuura.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, albo nigroque varius, rostro atro. FAB. *Syst. ent.* p. 141.

n°. 73. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 178. n°. 101.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n°. 128.*

Il ressemble au Charanson trimaculé. La trompe est très-noire. Le corcelet a une ligne longitudinale au milieu, noire, une petite ligne blanche antérieurement, & un point blanc postérieurement.

Il se trouve en Europe.

194. CHARANSON velu.

CURCULIO villosus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, villosus griseus, scutello fasciaque elytrorum postica albis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 178. n°. 102.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 108. n°. 129.*

Curculio villosus. FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 75. no. 41. tab. 24. fig. 19.*

Il est de la grandeur du précédent. La trompe est avancée, cylindrique, noire. Le corcelet est gris, avec une ligne longitudinale blanchâtre. Les élytres sont grises, avec une bande blanche oblique, vers la partie postérieure, qui ne touche point au bord extérieur. Les pattes sont grises, & toutes les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Allemagne.

195. CHARANSON du Beccabunga.

CURCULIO Beccabunga.

Curculio longirostris fuscus elytris subsanguineis margine anoque fuscis. LIN. *Syst. nat.* pag. 611. n°. 41. — *Faun. suec. n°. 607.*

Curculio Beccabunga longirostris femoribus dentatis niger, elytris rufis : margine omni nigro. FAB. *Mant. inf. t. 1. p. 108. n°. 130.*

Il est petit, noir. La trompe est allongée, arquée, noire. Le corcelet est obscur. Les élytres sont striées, rougâtres, avec la suture & le bord extérieur noirs. Les pattes sont noires, & les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Europe, sur la Véronique d'eau *Veronica Beccabunga.*

196. CHARANSON troglodyte.

CURCULIO troglodytes.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fuscus, thorace lineâ dorsali cinerea, elytris, pedibusque testaceis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. p. 108. n°. 131.*

Il est petit. La tête est obscure. Les antennes sont un peu testacées. Le corcelet est obscur, avec une ligne longitudinale blanchâtre, au milieu. Les élytres sont striées, presque testacées, avec la suture noire. Les pattes sont testacées.

Il se trouve à Kiell.

197. CHARANSON très-atrc.

CURCULIO aterrimus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, ater, elytris nitidis. FAB. *Syst. ent. pag. 141. n° 74.* — *Sp. inf. tom. 1. p. 179. n° 103.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n° 132.*

Curculio aterrimus longirostris ater, elytris nitidis. LIN. *Syst. nat. p. 607. n. 10.* — *Faun. suec. n° 582.*

Il est très-petit. Tout le corps est très-noir. Les élytres sont ovales, avec des stries pointillées. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Europe.

198. CHARANSON du Cerisier.

CURCULIO Cerasi.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, ater, thorace utrinque spina porrecta, elytris striato-punctatis.

Curculio Cerasi longirostris, ater, elytris opacis oblongis. LIN. *Syst. nat. pag. 607. n° 11.* — *Faun. suec. n° 583.* — *It. scan. 355.*

Curculio Cerasi. FAB. *Syst. ent. pag. 141. n° 75.* — *Sp. inf. t. 1. p. 179. n. 104.* — *Mant. inf. t. 1. pag. 108. n° 133.*

Curculio niger, thorace utrinque dentato. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 299. n° 48.*

Le Charanson noir à corcelet armé. GEOFF. *Ib.*

FRISCH. *Inf. tom. 11. p. 31. tab. 23. fig. 1. 3.*

Curculio Cerasi. SCOP. *Ent. carn. n° 84.*

Curculio Cerasi. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 175. n° 8.*

Curculio armiger. FOURC. *Ent. par. 1. pag. 130. n° 51.*

Curculio Cerasi. FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 75. n° 42.*

Il varie pour la grandeur. Il a depuis une ligne & demie jusqu'à deux lignes & demie de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. Il est entièrement noir, sans taches. Le corcelet est pointillé & armé d'une dent de chaque côté antérieurement. Les élytres sont fortement striées, & les stries sont pointillées. Les cuisses sont dentées.

Le corcelet de l'un des deux sexes est arrondi, sans dents, & les cuisses sont simples.

Il se trouve en Europe, sur les feuilles du Cerisier, du Poirier. Je l'ai trouvé très-commun au printemps, dans les chantiers de Paris.

199. CHARANSON violet.

CURCULIO violaceus.

Curculio longirostris violaceus, femoribus dentatis, proboscide thoracis longitudine. LIN. *Syst. nat. pag. 614. n° 63.* — *Faun. suec. n° 579.*

Curculio violaceus longirostris, femoribus dentatis violaceus totus. FAB. *Syst. ent. pag. 141. n° 76.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 179. n° 105.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n° 134.*

Curculio violaceus longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro-carulescente nitido, elytris striatis. DEG. *Mém. inf. t. 5. pag. 213. n° 5.*

Charanson noir-bleuâtre, à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses dentelées, à corps oblong, d'un noir bleuâtre, luisant & à étuis canelés. DEG. *Ib.*

Curculio icosandria. SCOP. *Ent. carn. n° 85.*

Curculio violaceus. LAICHART. *Inf. tom. 1. pag. 207. n° 14.*

Bergstr. nomencl. 1. pag. 16. n° 13. tab. 2. fig. 13.

Il a environ deux lignes & demie de long. La trompe est noire, mince, de la longueur du corcelet. Les antennes sont noires. Tout le corps est d'un bleu noirâtre, luisant. Le corcelet est d'un bleu violet, chagriné. Les élytres ont des stries, dans lesquelles on aperçoit des points enfoncés.

Il se trouve en Europe, sur les fleurs.

200. CHARANSON varié.

CURCULIO varius.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fusco-ferrugineus cinereo irroratus, rostro pedibusque ferrugineis femoribus macula nigra. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 15. fig. 181.*

Curculio varius longirostris femoribus omnibus dentatis, griseus nigroque varius rostro pedibusque rufis. FAB. *Syst. ent. pag. 142. n° 79.* — *Sp. inf. tom. 1. p. 180. n° 108.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n° 137.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 35. fig. 6.*

Il est un peu plus grand que le Charanson des Noisettes. La trompe est ferrugineuse, mince, cylindrique, à-peu-près de la longueur du corps. Le corcelet est d'un brun ferrugineux, légèrement couvert de poils courts, cendrés, avec une ligne longitudinale, au milieu, cendrée. L'écusson est cendré. Les élytres sont striées, d'une couleur ferrugineuse, brune, & couvertes de poils courts, cendrés, qui les font paroître nébuleuses. Les pattes sont ferrugineuses. Les cuisses ont une tache obscure, & sont munies d'une dent.

Il se trouve à Cayenne.

201 CHARANSON des Noisettes:

CURCULIO Nucum.

Curculio longirostris femoribus dentatis, corpore griseo longitudine rostri. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 5. fig. 47. a. b.

Curculio Nucum. LIN. Syst. nat. p. 613. n°. 59. — Faun. succ. n°. 616.

Curculio Nucum. FAB. Syst. ent. pag. 141. n°. 77. — Sp. inf. tom. 1. pag. 179. n°. 106. — Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n°. 135.

Curculio rufo-marmoratus, scutello cordato albo, proboscide subulatâ longissimâ. GEOFF. Inf. tom. 1. pag. 295. n°. 42.

Le Charanson trompette. GEOFF. *Ib.*

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis rufis, corpore oblongo nigro pilis viridibus. DEG. Mem. inf. tom. 5. pag. 205. n°. 2.

Charanson des noisettes, à très-longue trompe, à antennes coudées & à cuisses dentelées roussâtres, à corps ovale noir, avec des poils d'un jaune verdâtre. DEG. *Ib.*

Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis. Uadm. dissert. 24.

RÆSEL. inf. tom. 3. scar. terr. class. 4. tab. 67.

SGHAEFF. Icon. inf. tab. 50. fig. 4.

SULZ. inf. tab. 3. fig. 22.

Curculio Nucum. SCOP. Ent. carn. 2. 405.

PODD. Mus. grac. pag. 29.

Curculio Nucum. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 213.

Curculio Nucum. FOURC. Ent. par. 1. pag. 129. n°. 45.

Curculio Nucum. VILL. Ent. tom. 1. pag. 196. n°. 93.

Il varie un peu pour la grandeur. Il a depuis trois jusqu'à trois lignes & demie de long, de la tête à l'extrémité du corps. La trompe est mince, courbée, brune, luisante, de la longueur de la moitié du corps. Les antennes sont minces, assez longues, brunes, avec les trois derniers articles cendrés. Tout le corps est couvert d'un léger duvet cendré, un peu plus clair dans quelques endroits. Les élytres sont striées. L'écusson est petit, grisâtre, bien distinct. Les pattes sont de la couleur du corps. Toutes les cuisses sont armées d'une forte dent.

La larve de ce Charanson vit dans les Noisettes dont elle rongé la substance intérieure ou le noyau. Elle est grosse & dodue, blanche & de la grandeur d'un grain d'orge. Elle a le corps très-garni de plis & de rides ou d'inégalités, qui forment

vers les côtés, comme des mamelons ou tubercules élevés, de sorte que la peau est très-inégalement en arc & souvent plié en double, de façon que la tête touche au derrière. La tête qui est écaillée & d'un brun jaunâtre, luisante, est ronde & garnie de deux grosses dents, ayant en-dessous une lèvre charnue, à laquelle sont attachés vers les côtés, deux espèces de barbillons aplatis, mobiles, & en-devant, une petite pointe fine, qui paroît être une filière. La larve est absolument dépourvue de pattes, elle n'en a aucunes, quoiqu'en dise M. Rœsel, qui a prétendu qu'elle avoit au devant du corps, des pattes à crochets, quoiqu'à la vérité très-petites, & à peine visibles, comme s'exprime l'auteur; l'examen le plus scrupuleux ne peut y en découvrir la moindre apparence. Néanmoins la larve mise sur un plan uni, comme par exemple sur une table, peut changer de place, & marcher en quelque manière; mais cette démarche qui s'exécute uniquement par le mouvement vermiculaire des anneaux du corps & de leurs mamelons, se fait très-lentement, de sorte que la larve ne fait que glisser sur le plan de position. Parvenue à toute sa grandeur, elle perce la coque de la Noisette, d'un trou rond, & en sort pour se retirer dans la terre, où elle subit ses transformations.

Il se trouve dans toute l'Europe.

202. CHARANSON phalangiste.

CURCULIO phalangium.

Curculio longirostris femoribus dentatis ferrugineus pubescens, pedibus anticis longioribus.

VOET. Coleopt. par. 2. tab. 35. fig. 4.

Il est plus grand que le Charanson longue trompe. Les antennes sont noirâtres, coudées, assez longues. La trompe est brune, luisante, mince, presque de la longueur du corps. Le corcelet est arrondi. Tout le corps est pubescent & d'un brun ferrugineux. Les pattes sont assez longues, les antérieures le sont un peu plus que les autres. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve . . .

203. CHARANSON nasillard.

CURCULIO nasutus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, elytris cinereis apice rufis, rostro brunneo longitudine corporis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. II. fig. 138.

Il ressemble beaucoup au Charanson des Noisettes, mais il est un peu plus grand. Les antennes sont brisées, assez longues, & ferrugineuses. La trompe est cylindrique, mince, presque de la

longueur du corps & brune luisante. La tête est brune, arrondie, & les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est cendré, un peu obscur. L'écusson est petit, arrondi postérieurement, un peu relevé, cendré. Les élytres sont cendrées, & leur extrémité est d'un brun roussâtre; l'angle latéral antérieur est assez saillant. On y remarque quatre lignes longitudinales élevées entre lesquelles il y a deux rangées peu marquées de points enfoncés. Le dessous du corps est brun. Les pattes sont d'un brun roussâtre, un peu cendré, avec les cuisses armées d'une épine assez forte. Les pattes antérieures sont un peu plus longues que les autres.

Il se trouve . . .

204. CHARANSON longue trompe.

CURCULIO proboscideus.

Curculio longirostris femoribus dentatis griseus, rostro corpore duplo longiore. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 127.

Curculio proboscideus. FAB. Syst. ent. pag. 142. n°. 78. — Sp. inf. tom. 1. pag. 180. n°. 107. — Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n°. 136.

Il ressemble beaucoup au *Charanson* des Noisettes, mais il est un peu plus long. Les antennes sont minces, coudées, noires, brunes à leur base. La trompe est mince, droite, un peu courbée à l'extrémité, brune noirâtre & plus longue que le corps. La tête est arrondie, grisâtre, avec les yeux noirs. Tout le corps est couvert de poils courts, d'un gris roussâtre. L'écusson est très-petit & de la couleur du corps. Les élytres ont des stries régulières. Les cuisses sont armées d'une dent.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale,

205. CHARANSON trompette.

CURCULIO haustellatus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, castaneus, elytris striatis, rostro corpore quadruplo longiore. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 14. fig. 171.

Il ressemble au *Charanson* des Noisettes, mais il est un peu plus étroit. La trompe est mince, courbée, trois fois plus longue que le corps. Les antennes sont coudées & insérées vers la base de la trompe. Tout le corps est d'une couleur de marron, les yeux seuls sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est arrondi. L'écusson est petit & arrondi postérieurement. Les élytres sont striées. Les cuisses sont très-légèrement dentées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

206. CHARANSON agréable.

CURCULIO amœnus.

Curculio longirostris femoribus dentatis ater, thorace punctis duobus, coleopteris quinque niveis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 143. a. b.

Curculio amœnus. FAB. Syst. ent. pag. 142. n°. 81. — Sp. inf. tom. 1. pag. 180. n°. 110. — Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n°. 139.

Il ressemble beaucoup pour la forme du corps, au *Charanson* des Noisettes, mais il est deux ou trois fois plus petit. Les antennes sont noires & coudées. Tout le corps est très-noir. La trompe est mince, cylindrique, un peu courbée, de la longueur du corps. La tête est arrondie, noire, avec un peu de blanc sur le front, entre les yeux. Le corcelet est noir, avec un peu de blanc sur le bord latéral antérieur & deux points sur le bord postérieur. L'écusson est noir, petit & arrondi. Les élytres sont striées; elles sont noires, avec une ligne courte, longitudinale de chaque côté de la future, & deux points blancs vers la partie postérieure, l'un vers le bord extérieur, un peu au-delà du milieu, & l'autre vers l'extrémité. Le dessous du corps est noir, & couvert de poils courts très-blancs. Les pattes sont noires, assez longues. Toutes les cuisses sont minces à leur base, renflées vers leur extrémité, & armées d'une épine ou dent assez forte.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

207. CHARANSON des Cerises.

CURCULIO Cerasorum.

Curculio longirostris femoribus acutè dentatis, fuscus, scutello elytrorumque fasciis obsolete cinereis. FAB. Syst. ent. pag. 142. n°. 80. — Sp. inf. tom. 1. pag. 180. n°. 109. — Mant. inf. tom. 1. p. 109. n°. 138.

Il ressemble au *Charanson* des Noisettes, mais il est deux fois plus petit. La trompe est cylindrique, glabre, noire. Le corcelet est noirâtre, avec une ligne longitudinale au milieu, cendrée, peu marquée. L'écusson est cendré. Les élytres sont striées, & ont deux bandes cendrées, peu marquées.

Il se trouve en Angleterre.

208. CHARANSON bicorne.

CURCULIO bicornis.

Curculio longirostris femoribus acutè dentatis capite bidentato. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 180. n°. 111. — Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n°. 140.

Il est à peine de la grandeur du *Charanson* de l'Aulne. Tout le corps est d'un gris roussâtre, plus ou moins obscur. Les antennes sont brunes & coudées. La trompe est obscure, de la longueur

du corcelet. Les yeux sont noirs. La tête est obscure, munie à sa partie supérieure de deux tubercules couverts de poils courts. Le corcelet est simple & presque cylindrique. L'écusson est noirâtre. Les élytres sont striées, & elles ont quelques petits faisceaux de poils courts. Les pattes sont brunes, & les cuisses sont armées d'une dent.

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande.

209. CHARANSON ténuirostre.

CURCULIO tenuirostris.

Curculio longirostris femoribus dentatis niger, elytris albo subfasciatis, antennis rufis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 180. n°. 112.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n°. 141.*

Il est plus petit que le Charanson des Cerises. Les antennes sont d'un brun ferrugineux, coudées, avec la masse oblongue, d'un noir cendré. La trompe est cylindrique, courbée, noire, de la longueur de la moitié du corps. La tête est noire arrondie. Les yeux sont noirs. Le corcelet est noirâtre & légèrement couvert de poils cendrés, très-courts. L'écusson est petit, arrondi & blanchâtre. Les élytres sont striées, obscures, couvertes de poils grisâtres, très-courts, avec quelques bandes irrégulières peu marquées, formées par des poils courts, gris. Tout le dessous du corps est couvert de poils très-courts, gris. Les pattes sont noirâtres, & légèrement couvertes de poils gris très-courts. Les cuisses sont armées d'une épine.

Il se trouve en Angleterre.

210. CHARANSON des Baies.

CURCULIO Druparum.

Curculio longirostris femoribus dentatis, rostro rubro, elytris testaceis obsolete fasciatis. LIN. *Syst. nat. p. 614. n°. 62.* — *Faun. Suec. n°. 617.*

Curculio rectirostris. LIN. *Syst. nat. edit. 10. p. 383. n°. 54.*

Curculio Druparum. FAB. *Syst. ent. pag. 143. n°. 82.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 181. n°. 113.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 109. n°. 142.*

Curculio flavescens, elytris luteo & rufo tessellatis. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 296. n°. 43.*

Le Charanson damier. GEOFF. *It.*

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis corpore oblongo, rufo-fusco, elytris obsolete-fasciatis. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 214. n°. 7.*

Charanson des baies à longue trompe, à antenne coudées & à cuisses dentelées, à corps oblong, d'un

brun roussâtre, à taches obscures sur les étuis' DEG. *Ib.*

Curculio Druparum. SULZ. *Inf. tab. 3. fig. 21.*

SCAEFF. *Icon. inf. tab. 1. fig. 11. a. b.*

Curculio tessellatus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 129. n°. 46.*

Curculio Druparum. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 198. n°. 96.*

Il est une ou deux fois plus petit que le Charanson des Noisettes. La trompe est noire, assez mince, un peu plus longue que le corcelet. Les antennes sont d'un brun fauve, avec la masse noirâtre. La tête est arrondie, & les yeux sont un peu saillans. Tout le corps est brun & couvert de poils courts, légèrement roussâtres, ce qui le fait paroître plus ou moins nébuleux. L'écusson est petit, arrondi, grisâtre. Les élytres ont quelquefois une bande plus claire, peu marquée. Les pattes sont d'un brun ferrugineux. Les cuisses sont dentées. Dans l'un des deux sexes, les cuisses antérieures sont armées d'une dent forte & assez grande.

Il se trouve en Europe.

211. CHARANSON du Frêne.

CURCULIO Fraxini.

Curculio longirostris femoribus dentatis ferrugineis fuscis, capite dorsoque nigris. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n°. 143.*

Curculio Buxini longirostris antennis fractis, femoribus dentatis, corpore subglobofo griseo, coleopttris macula magna fusca dorsali. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 212. n°. 4.*

Charanson du Frêne à longue trompe, à antennes coudées & à cuisses dentelées, à corps court, gris, avec une grande tache brune sur les étuis. DEG. *Ib.*

Il est de la grandeur du Charanson des Baies. La tête est noire & la trompe est courbée. Le corcelet est mélangé de noirâtre & de ferrugineux, avec la partie supérieure noire. Les élytres sont légèrement velues, brunes, avec la partie supérieure noire. Le dessous du corps est d'un brun ferrugineux.

La larve de ce Charanson vit sur les feuilles du Frêne, dont elle ne ronge que la substance charnue, & elle ressemble beaucoup à celle de la Srophulaire : ayant comme elle le corps couvert d'une matière humide & gluante : elle est d'un blanc sale & jaunâtre, mais la tête est noire & écailleuse. Elle n'a point de pattes, marchant uniquement par le mouvement des anneaux. Pour se transformer, elle se construit une coque presque sphérique, d'un jaune brun, & composée comme celle

de la larve déjà citée : cette coque ressemble à une petite vessie , & la larve la place sur les feuilles de Frêne où elle a vécu. Pour en sortir, le *Charanson* détache une grande pièce en forme de calotte ou de segment de sphère, & il ne reste sous la forme de nymphe que peu de jours, la transformation s'achevant dans un tems assez court.

Il se trouve en Suède , sur le Frêne.

212. CHARANSON déprimé.

CURCULIO depressus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, thorace depresso lateribus obtuse angulato. LIN. *Syst. nat. pag. 612. n° 53.* — *Mus. lud. ulr. p. 49.*

Curculio depressus. FAB. *Syst. ent. p. 143. n° 83.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 181. n° 114.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n° 144.*

Le mâle, selon Linné, diffère de la femelle. Voici la description qu'il donne du premier. Tout le corps est gris & couvert de points élevés, noirs, glabres. La trompe est cylindrique, glabre, noire, de la longueur du corcelet. Les antennes sont en masse. La tête est arrondie. Le corcelet est déprimé, presque rhomboïque ou avec un angle de chaque côté, couvert de poils gris. Les élytres sont déprimées, un peu crénelées, avec des stries entre les crénelures, formées par des points élevés. Les cuisses sont dentées, mais la dent des postérieures est un peu moins marquée.

Le corps de la femelle est gris, couvert de points élevés, noirs, glabres. La trompe est cylindrique, courbée, de la longueur du corcelet. Les antennes sont en masse. La tête est presque arrondie. Le corcelet est large presque arrondi. Les élytres sont un peu déprimées, striées; les stries sont élevées & formées par une suite de points noirs. L'angle latéral de la base des élytres, est droit, un peu avancé, & terminé par des poils gris. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

313. CHARANSON des Vergers.

CURCULIO Pomorum.

Curculio longirostris, femoribus anticis dentatis, corpore griseo nebuloso. LIN. *Syst. nat. pag. 612. n° 46.* — *Faun. suec. n° 612.*

Curculio Pomorum. FAB. *Syst. ent. p. 143. n° 84.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 181. n° 115.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n° 145.*

Curculio in floribus arborum. Frisch. *inf. 1. p. 32. tab. 8.*

Curculio Pomorum. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 194. n° 88.*

Il est petit. Tout le corps est nébuleux, ou d'un gris cendré. Les antennes sont obscures. Les élytres ont deux bandes transversales, dont l'antérieure forme un angle vers la suture & dont la postérieure est droite. Les cuisses antérieures sont munies d'une forte dent.

Il se trouve en Europe sur les fleurs de quelques arbres fruitiers.

214. CHARANSON rouleur.

CURCULIO tortrix.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, corpore testaceo, pectore fusco. LIN. *Syst. nat. pag. 615. n° 67.* — *Faun. suec. n° 622.*

Curculio tortrix. FAB. *Syst. ent. pag. 143. n° 85.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 181. n° 116.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n° 146.*

Curculio ferrugineus, elytris striatis, oculis nigris. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 300. n° 51.*

Le *Charanson* couleur de rouille. GEOFF. *Ib.*

Curculio fulvus longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo flavo testaceo, oculis nigris. DEG. *Mém. inf. tom. 5. pag. 214. n° 6.*

Charanson fauve, à longue trompe, à antennes coudées, & à cuisses dentelées, à corps oblong, d'un jaune fauve & à yeux noirs. DEG. *Ib.*

Curculio rubiginus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 131. n° 54.*

Curculio tortrix. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 199. n° 101.*

Il a ordinairement deux lignes & demie de long. La trompe est noire, mince, cylindrique, courbée, plus longue que le corcelet. Tout le corps est d'un jaune fauve. Les yeux sont noirs, & on voit une tache obscure entre les cuisses postérieures. Les antennes sont minces, avec la masse obscure. Les élytres ont des stries pointillées, peu marquées. Les cuisses sont dentées. Les jambes antérieures sont quelquefois plus grandes que les autres.

J'ai une variété de cet insecte, qui me vient de Hongrie, dont tout le corps est obscur. Les antennes & les jambes sont d'un brun ferrugineux.

Il se trouve dans toute l'Europe, sur les Peupliers, dont il tord & roule les feuilles.

215. CHARANSON du Tremble.

CURCULIO Tremulae.

Curculio longirostris femoribus dentatis nigricans, elytris striatis griseo irroratis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n° 147.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au

Chara son rouleur. La trompe est avancée & noire. Le corcelet est noir, lisse, luisant, d'un rouge brillant à sa partie postérieure. Les élytres sont noires, couvertes de petits poils grisâtres; elles ont des stries pointillées.

Il se trouve en Suède, sur le Tremble. *Populus Tremula*.

216. CHARANSON tubané.

CURCULIO taniatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, thorace nigro, margine antico posticoque rufis, elytris pallidis nigro maculatis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. p. 181. n.º. 117.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 109. n.º. 148.*

Il est deux fois plus petit que le *Charanson* rouleur. Les antennes sont ferrugineuses & coudées. La trompe est cylindrique, de la longueur du corcelet, noire, avec l'extrémité d'un brun ferrugineux. La tête est arrondie, & d'un brun noirâtre. Le corcelet est noirâtre au milieu, avec le bord antérieur & le bord postérieur d'un brun ferrugineux. L'écusson est petit & noirâtre. Les élytres sont striées; elles sont couvertes de poils d'un gris roussâtre, & elles ont quelques taches obscures irrégulières. Le dessous du corcelet est un peu brun. La poitrine & l'abdomen sont noirs. Les pattes sont ferrugineuses, brunes, & les cuisses sont armées d'une petite épine.

Il se trouve en France, en Angleterre.

217. CHARANSON allongé.

Curculio elongatus.

Curculio longirostris femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis anticis bidentatis. FAB. *Syst. ent. pag. 144. n.º. 89.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 183. n.º. 122.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 110. n.º. 150.*

Il a la forme allongée du *Brente Anchorago*, mais il est une fois plus petit. Tout le corps est noir. Les élytres sont noires avec deux bandes ferrugineuses; elles ont des stries pointillées.

Il se trouve à la Jamaïque.

218. CHARANSON de l'Ormeau.

CURCULIO Ulmi.

Curculio longirostris femoribus dentatis fusco-rufus, rostro nigro, elytris macula nigricante.

Curculio Ulmi longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo rufo-fusco, elytris macula nigricante, proboscide nigra. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 215. n.º. 8. Pl. 6. fig. 26. & 27.*

Charanson des boutons de l'Orme, à longue trompe noire, à antennes coudées & à cuisses den-

telées, à corps oblong d'un brun roussâtre, à tache noirâtre sur les étuis. DEG. *Id.*

Il est petit, d'une forme ovale allongée. La trompe est noire, mince, assez longue. Les antennes sont coudées. Tout le corps est d'un brun roussâtre. La tête & le corcelet ont une ligne longitudinale blanchâtre, à leur partie supérieure. L'écusson est petit, blanchâtre. Les élytres ont chacune une grande tache noire, vers le milieu, & une autre blanchâtre transversale, vers l'extrémité. Les cuisses sont dentées.

Vers la fin du mois de mai, lorsque l'Orme a déjà poussé d'assez grandes feuilles, on peut remarquer sur les branches plusieurs boutons, qui sont gros & enflés, même assez verts, & dont les feuilles écailleuses ont commencé à s'épanouir, mais qui n'ont pas encore poussé de véritables feuilles, tandis que le reste des branches en est tout chargé. Si venant à soupçonner que quelque insecte a gâté l'organisation de ces boutons tardifs, on veut les ouvrir, on trouve dans chacun une petite larve sans patte & à tête écailleuse, qu'on ne peut méconnoître pour celle d'un *Charanson*. Elle a rongé les tendres feuilles contenues dans le bouton & détruit leur développement. Le corps de cette larve est gros & dodu, d'un blanc de lait, plein de rides & d'inégalités, & ordinairement roulé en cercle: dans son intérieur on voit un grand nombre de petites masses comme de graille blanche, qui paroissent au travers de la peau transparente. Vers la fin de juin elle se transforme en insecte parfait, sans sortir du bouton qui lui sert de demeure, & que le *Charanson* perce ensuite pour se mettre en liberté.

Il se trouve en Suède.

219. CHARANSON de Forster.

CURCULIO Forsteri.

Curculio longirostris femoribus dentatis, pedibus anticis longioribus.

Curculio longimanus longirostris femoribus dentatis, manibus longissimis. FORST. *Nov. Sp. inf. cent. 1. pag. 32.*

Cu culio Forsteri. LIN. *Syst. nat. edit. 1. pag. 1770.*

Il est de la grandeur du *Charanson* des Pommiers. Tout le corps est brun & couvert de petits poils cendrés. Les antennes sont fauves. La trompe est noire, courbée, mince, un peu plus longue que le corcelet. Les élytres sont cendrées & marquées de quelques petits points noirs. Les jambes antérieures sont plus courtes que les autres. Les cuisses sont dentées, les tarses sont fauves.

Il se trouve en Angleterre.

Je soupçonne que cet insecte est le même que le *Curculio Tremula* de M. Fabricius.

220. CHARANSON hispide.

CURCULIO hispidus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, corpore sulcato adperso squammis erectis. LIN. *Syst. nat. pag. 614. n° 65. — Faun. suec. n° 619.*

Il est petit, grisâtre. La trompe est rouge, assez longue. Le corcelet est un peu obscur à sa partie supérieure. Les élytres sont fortement sillonnées, couvertes de petits poils hérissés, avec une bande blanchâtre, linéaire, onnée. Les cuisses sont dentées, grosses, assez longues.

Il se trouve en Europe, sur différentes plantes.

221. CHARANSON pédiculaire.

CURCULIO pedicularius.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, corpore rubro, elytris albido-subfasciatis. LIN. *Syst. nat. pag. 615. n° 66. — Faun. suec. n° 620.*

Il est un peu plus grand que le précédent. La trompe est rouge, droite, presque de la longueur du corps. Les élytres sont grises, avec des bandes blanches peu marquées. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Europe, dans les bois.

222. CHARANSON poudreux.

CURCULIO pollinarius.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, elytris planis abbreviatis, abdomine elytrorumque margine polline cinereo aspersis.

Curculio pollinarius longirostris femoribus omnibus dentatis, elytris depressis planis abbreviatis, ventre, elytrorum margine & pedibus polline aspersis. FORST. *Nov. spec. inf. pag. 33. n° 33.*

Curculio pollinarius. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1771.*

Le corps de ce petit insecte est aplati, obscur en-dessus, renflé & couvert d'une poussière écailleuse grisâtre en-dessous. La trompe est noire, mince, longue, appliquée contre le dessous du corps. Les antennes sont coudées, fauves. Le corcelet a une ligne longitudinale au milieu, & deux points élevés, presque épineux, sur les côtés. Les élytres sont un peu anguleuses à leur base latérale, un peu plus courtes que l'abdomen, & obtuses à leur extrémité; elles sont obscures, avec le bord extérieur couvert d'une poussière grisâtre. Les pattes sont couvertes d'une poussière écailleuse, grisâtre. Les cuisses sont dentées.

Hist. Nat. des Insectes. Tom. V.

Lorsqu'on touche cet insecte, il applique les pattes & la trompe contre le corps & présente la figure d'une petite boule de terre.

Il se trouve en Europe, sur différentes plantes, mais plus ordinairement sur l'Ortie dioïque.

223. CHARANSON écussonné.

CURCULIO scutellatus.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fuscus, scutello albo, elytris macula rufescente.

Curculio fuscus, scutello puncto albo, elytris macula rufescente. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 300. n° 50.*

Le Charanson brun à écusson blanc. GEOFF. *Ib.*

Curculio scutellatus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 131. n° 53.*

Il a environ une ligne & demie de long. La trompe est mince, un peu plus longue que le corcelet. Tout le corps est obscur. Le corcelet est finement chagriné. L'écusson est petit & blanchâtre. Les élytres sont striées, & ont une tache d'un brun rougeâtre, un peu au-delà du milieu, qui forme presque une bande. Les pattes sont de la couleur du corps, & les cuisses sont dentées.

Il se trouve aux environs de Paris.

224. CHARANSON vierge.

CURCULIO virgo.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, oblongus fuscus, villo cinereo aspersus.

Curculio oblongus, villis cinereis aspersus, rostro thoraci aequali. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 301. n° 53.*

Le Charanson vierge. GEOFF. *Ib.*

Curculio virgo. FOURC. *Ent. par. 1. pag. 132. n° 56.*

Il a une ligne de long. La trompe est mince, brune, de la longueur du corcelet. Les yeux sont noirs. Tout le corps est d'un brun foncé, noirâtre, mais légèrement couvert d'un duvet gris blanchâtre. Les élytres sont striées. Les pattes sont brunes & les cuisses sont dentées.

Il se trouve aux environs de Paris, sur les fleurs.

225. CHARANSON du Chardon.

CURCULIO Cardui.

Curculio longirostris, femoribus dentatis, fusco-cinereus, thorace tuberculato, scutello, elytrorum lineola punctoque flavis.

Curculio Cardui gibbus ex flavicante lineis, thorace tuberculato, elytris convexis abbreviatis: lineola, puncto scutelloque flavis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1771.

Curculio Cardui. FUESL. Archiv. inf. 5. pag. 79. n^o. 54. tab. 24. fig. 22. k.

Il a un peu plus d'une ligne & demie de long. La trompe est mince, de la longueur du corcelet. Tout le corps est d'une couleur cendrée obscure, un peu roussâtre. Le corcelet est tuberculé. Les élytres sont globuleuses, striées, avec une ligne longitudinale jaune, sur la suture, un peu au-delà du milieu, & un point de la même couleur à la base basale. L'écusson est jaune. Les pattes ont la couleur du corps. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve à Berlin, sur les Chardons.

*** Trompe allongée. Cuisses postérieures renflées.

226. CHARANSON de l'Aulne.

CURCULIO Alni.

Curculio pedibus saltatoriis niger, coleoptris testaceis, maculis duabus obscuris. FAB. Syst. ent. pag. 144. n^o. 90. — Sp. inf. tom. 1. pag. 183. n^o. 123. — Mant. inf. tom. 1. pag. 110. n^o. 151.

Curculio Alni longirostris, elytris lividis, maculis duabus obscuris. LIN. Syst. nat. p. 611. n^o. 42. — Faun. Suec. n^o. 608.

Curculio rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris maculis quatuor nigris. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 286. n^o. 20.

Le Charanson sauteur à taches noires. GEOFF. Ib.

Curculio saltator alni, saltator longirostris, corpore ovato testaceo, elytris maculis binis fuscis, capite nigro. DEG. Mém. inf. tom. 5. pag. 262. n^o. 49.

Charanson sauteur de l'Aune. Sautent à longue trompe, à corps ovale, d'un jaune d'ocre, avec deux taches brunes sur les étuis & à tête noire. DEG. Ib.

Curculio Alni. FOURC. Ent. par. 1. pag. 122. n^o. 20.

Curculio Alni. VILL. Ent. tom. 1. pag. 192. n^o. 82.

Il a une ligne & demie de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est noire, de la longueur du corcelet. Les antennes sont testacées. La tête est noire. Le corcelet est testacé, sans taches, ou avec un peu de noir à sa partie supérieure. Les élytres sont testacées avec une tache noire à la base, de chaque côté de la suture. Le dessus du corps est noir, avec l'extré-

mité de l'abdomen testacée. Les pattes sont noires, avec les tarses testacés. Les cuisses postérieures sont renflées dentées, un peu crenelées au-dessous de la dentelure. Ce Charanson, ainsi que tous ceux de cette division, sautent comme la Puce, en appliquant les jambes de derrière contre les grosses cuisses & les débandant ensuite avec force. Tout le corps est velu.

La larve vit dans les feuilles de l'Aulne qu'elle mine, & où elle produit un renflement formé par les deux membranes de la feuille, qui ensuite se dessèchent & deviennent brunes.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

227. CHARANSON poiloux.

CURCULIO pilosus.

CURCULIO longirostris pedibus saltatoriis, niger cinereo variegatus. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 183. n^o. 124. — Mant. inf. tom. 1. pag. 110. n^o. 152.

Il est de la grandeur du Charanson de l'Aulne. Les antennes sont coudées, testacées. La trompe est noire, de la longueur du corcelet. Tout le corps est noir, couvert de quelques poils obscurs, & mélangé d'un duvet cendré, qui forme des taches irrégulières. La tête est arrondie, & les yeux sont un peu saillans. L'écusson est petit, triangulaire, cendré. Les élytres sont striées. Les pattes sont noirâtres, avec les tarses testacés. Les cuisses sont sans épines, les postérieures sont renflées, un peu crenelées, & elles servent à l'insecte pour sauter.

Il se trouve en France, en Angleterre; il n'est pas rare aux environs de Paris, sur différents arbres.

228. CHARANSON éperonné.

CURCULIO calcar.

Curculio longirostris femoribus saltatoriis unidentatis niger, antennis plantisque testaceis. FAB. Mant. inf. t. 1. p. 110. n^o. 153.

Il ressemble aux précédens. Le corps est noir. Les antennes sont testacées. Les élytres sont à peine striées. Les pattes sont noires, avec les tarses testacés. Les cuisses postérieures sont renflées, unidentées.

Il se trouve à Kiell.

229. CHARANSON du Saule,

CURCULIO Salicis.

Curculio longirostris pedibus saltatoriis, elytris atris: fuscis duabus albis. LIN. Syst. nat. p. 611. n^o. 43. — Faun. Suec. n^o. 610.

Curculio salicis. FAB. *Syst. ent.* pag. 144. n°. 91.
— *Sp. inf. t. 1.* pag. 183. n°. 125. — *Mant. inf. tom. 1.* pag. 110. n°. 154.

Curculio saltator salicis saltator longirostris, corpore subglobofo atro, elytris fasciis duabus transversis albis maculaque fulva. DEG. *Mém. inf. tom. 5.* pag. 264. n°. 51.

Charanson sauteur du saule, sauteur à longue trompe, à corps court, arrondi, noir, à deux bandes transversales, blanches, & une tache rouille sur les étuis. DEG. *Ib.*

Il est de la grandeur du précédent. Le corps est noir. La trompe est mince, déliée, de la longueur du corcelet. Les élytres ont deux bandes transversales, ondées, un peu inégales : à la base on voit une tache fauve, commune aux deux élytres. L'écusson est blanchâtre.

Il se trouve sur le Saule, dans presque toute l'Europe.

230, CHARANSON de l'Osier.

Curculio Fiminalis.

Curculio longirostris, pedibus saltatoriis, corpore testaceo. FAB. *Syst. ent.* pag. 145. n°. 92. — *Sp. inf. t. 1.* pag. 184. n°. 126. — *Mant. inf. t. 1. p. 110.* n°. 155.

Curculio Quercus longirostris pallide flavus, oculis nigris. LIN. *Syst. nat.* pag. 609. n°. 25. — *Faun. Suec.* n°. 596.

Curculio rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris rufis. GEOFF. *inf. tom. 1.* pag. 286. n°. 19.

Le Charanson sauteur brun. GEOFF. *Ib.*

Curculio saltator Ulmi, saltator longirostris, corpore ovato flavo-testaceo, oculis nigris. DEG. *Mem. inf. tom. 5.* pag. 260. n°. 48. *Pl. 8.* fig. 5.

Charanson sauteur de l'Orme sauteur à longue trompe, à corps ovale d'un jaune d'ocre foncé & à yeux noirs. DEG. *Ib.*

REAUM. *Mém. inf. tom. 3.* pag. 31. *Pl. 3.* fig. 17. 18.

Curculio saltator. FOURC. *Ent. par. 1. p. 121.* n°. 19.

Curculio rufus. SCHRANK. *Enum. inf. aust.* n°. 220. f.

Curculio Quercus. VILL. *Ent. tom. 1.* pag. 180. n°. 21.

Tout le corps est testacé. Les yeux sont noirs, & les élytres sont striées. Cet insecte, aux environs de Paris, a ordinairement la tête noire, l'abdomen noir, avec l'extrémité testacée, les pattes testacées, avec le genou noir.

La larve de ce Charanson vit dans les feuilles de l'Orme, qu'elle mine en grand, se nourrissant de la substance intérieure de la feuille qu'elle ronge en ménageant adroitement les deux membranes. L'endroit où elle se trouve placée, se présente comme une tache circulaire, renflée dans le milieu des deux côtés de la feuille, en forme de petite vessie : ces plaques sont composées des deux membranes de la feuille qui se sont desséchées, la substance qui se trouve entre deux, ayant été consommée par la larve ; c'est pour quoi leur couleur est brune ou feuille-morte, comme une feuille sèche. L'élevation du milieu de l'endroit miné n'est pas seulement produite par la larve qui s'y trouve placée & qui par sa grosseur excède déjà l'épaisseur de la feuille, mais elle est encore augmentée par une coque que la larve file dans l'endroit miné de la feuille, avant que les membranes de cette feuille soient entièrement desséchées, & lorsqu'elles sont encore susceptibles de quelque extension. Ces vessies sont ordinairement placées près des bords de la feuille, parce que les nervures y sont plus tendres & par conséquent plus faciles à ronger ; c'est vers le mois de mai & de juin que l'on découvre cette larve & le nid qui la recèle. Elle est très-petite, de couleur blanche jaunâtre, avec quelques points obscurs. La tête & le premier anneau du corps sont d'un brun obscur. Le corps est divisé en douze anneaux, dont les séparations ou incisions sont profondes & bien marquées ; les côtés sont un peu ridés & le derrière est conique. On voit tout le long du dos à travers la peau, le grand canal des alimens, qui paroît noir quand la larve a bien mangé. Elle a la tête écailleuse, assez semblable à celle des chenilles. Elle est sans pattes. Parvenue au dernier degré d'accroissement, elle file une petite coque très-mince dans la feuille même, & prend ensuite la forme de nymphe, qui est d'un beau jaune, avec les yeux d'un brun clair, & sur laquelle on voit toutes les parties de l'insecte parfait arrangées avec ordre. Vers la fin de juin le Charanson quitte la peau de nymphe, & perce la feuille pour en sortir. Il continue encore de manger les feuilles de l'Orme, & survit l'hiver ; car on le trouve souvent en hiver, sous la vieille écorce à demie détachée des arbres, où il séjourne pour se mettre à l'abri du froid, & c'est au printemps suivant qu'il se multiplie de nouveau.

Il se trouve en Europe.

231. CHARANSON de l'Yeuse.

Curculio Ilicis.

Curculio longirostris femoribus saltatoris nigrimus, elytris striatis cinereo-varietis. FAB. *Mant. inf. tom. 1.* pag. 110. n°. 156.

Il ressemble au précédent. Le corps est noir. Le corcelet a une tache trilobée, cendrée, à sa par-

rie supérieure. Les élytres sont mélangées de cendré.

Il se trouve en Suède, sur le Chêne.

232. CHARANSON ïota.

CURCULIO ïota.

Curculio longirostris femoribus saltatoris ater, elytris striatis suturâ basi albâ. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 110. n.º. 157.*

Il est plus petit que le Charanson de l'Aulne. La trompe est noire, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Tout le corps est noir. Les élytres sont striées, avec la suture blanche à la base. Les cuisses postérieures sont renflées.

Il se trouve en Suède, aux environs de Paris, sur différents arbres.

233. CHARANSON du Hêtre.

CURCULIO Fagi.

Curculio longirostris pedibus saltatoris, corpore atro, femoribus pallidis. LIN. *Syst. nat. pag. 611. n.º. 44. — Faun. suec. n.º. 609. — It. scan. 111.*

Curculio Fagi. FAB. *Syst. ent. pag. 145. n.º. 93. — Sp. inf. tom. 1. pag. 184. n.º. 127. — Mant. inf. tom. 1. pag. 110. n.º. 158.*

Curculio Fagi. SCOP. *Ent. carn. n.º. 73.*

Curculio Fagi. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 193. n.º. 84.*

Tout le corps est noir. La tête & le corcelet sont pointillés. Les élytres sont striées, sans taches. Les pattes sont noires, avec les jambes d'un jaune pâle. Les cuisses postérieures sont renflées.

Il se trouve en Europe, sur les feuilles du Hêtre.

234. CHARANSON céréal.

CURCULIO segetis.

Curculio longirostris, pedibus saltatoris, corpore piceo, elytris oblongis. LIN. *Syst. nat. pag. 612. n.º. 45. — Faun. suec. n.º. 611.*

Curculio saltator segetis saltator longirostris, corpore ovato nigro griseo-nebuloso, antennis plantisque pallide fuscis. DEG. *Mem. inf. t. 5. p. 264. n.º. 50.*

Charanson sauteur des blés sauteur à longue trompe, à corps ovale, noir, nuancé de gris, à antennes & à pieds d'un brun clair. DEG. *ib.*

Curculio segetis. VILL. *Ent. t. 1. p. 193. n.º. 85.*

Il est très-petit. Le corps est oval, d'un brun noirâtre. Les antennes sont fauves. La trompe est mince, courbée, un peu plus longue que le corcelet. Les élytres ont des stries pointillées. Les pattes sont fauves, & les cuisses postérieures sont renflées.

Il se trouve en Europe sur les épis de blé.

*** *Trompe courte, cuisses simples.*

235. CHARANSON fastueux.

CURCULIO fastuosus.

Curculio brevirostris, nigro-viridis, elytris punctato-striatis, basi utrinque gibbis aureo maculatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 5. fig. 51.*

Il ressemble entièrement pour la forme & la grandeur, au Charanson impérial. Les antennes sont noirâtres. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, sillonnée, d'un noir verdâtre. Le corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres; il est d'un noir verdâtre supérieurement & marqué d'un sillon longitudinal doré: les côtés sont dorés & couverts de petits points élevés & noirâtres. Les élytres sont anguleuses de chaque côté de leur base, presque mucronées à leur extrémité; elles sont d'un noir verdâtre, avec des points enfoncés, rangés en stries, dorés, très-brillants, & quelques taches dorées. Les pattes sont noirâtres & pubescentes.

Il se trouve au Brésil.

236. CHARANSON impérial.

CURCULIO imperialis.

Curculio brevirostris, elytris striis elevatis atris sulcisque punctatis viridi-aureis alternis, basi gibbis apice acuminatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 1. fig. 1. a. b. c.*

Curculio imperialis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. pag. 184. n.º. 129. — Mant. inf. tom. 1. pag. 110. n.º. 160.*

Curculio imperialis brevirostris ater, femoribus muticis, thoracis lineâ longitudinali, elytrorum que punctis per strias dispositis viridi-inauratis. FORST. *Nov. Spec. inf. Cent. 1. pag. 34. n.º. 34.*

Curculio imperialis DRURY. *Ill. of inf. tom. 2. tab. 34. fig. 1.*

Naturf. 10. tab. 2. fig. 1.

Ce superbe Charanson a ordinairement quinze lignes de long depuis le bout de la trompe jusqu'à l'extrémité du corps. Les antennes sont noirâtres. La trompe est grosse, d'un vert doré, avec une ligne longitudinale au milieu, & une de chaque côté, noires. La tête est d'un vert doré, avec deux lignes rapprochées, noires. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres, il a un sillon longitudinal, d'un vert argenté, deux larges raies noires, luisantes, presque lisses: les côtés sont d'un vert doré, très-brillant, avec plu-

fleurs petits tubercules arrondis, noirs. Les élytres sont anguleuses à leur base, elles ont des stries élevées, noires, luisantes, & entre ces stries autant de rangées de points enfoncés, assez gros, d'un vert doré, très-brillant; au milieu de chaque enfoncement, on apperçoit un petit point noir. Le dessous du corps & les pattes sont couverts de petites écailles dorées & de quelques poils cendrés. Les cuisses n'ont ni épines, ni dentelures.

Il se trouve au Brésil. Il est très-commun dans les collections de Paris.

237. CHARANSON noble.

CURCULIO nobilis.

Curculio brevirostris viridi-aureus, elytris striis elevatis crenatis nigris basi acutè angulatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 5. fig. 57.

Il ressemble beaucoup au *Charanson* impérial, mais il est un peu plus petit. Les antennes sont noires. La trompe est grosse, d'un vert doré, avec une ligne longitudinale noire, & un sillon longitudinal au milieu. Les yeux sont noirs. Le corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres, d'un vert doré brillant, couvert de tubercules noirs luisans, avec un sillon longitudinal au milieu, doré. L'écusson est grisâtre. Les élytres ont un angle saillant, aigu de chaque côté, à leur base; elles sont d'un vert doré très-brillant, & ont des stries élevées, crénelées, d'un noir luisant. On apperçoit entre les stries de très-petits points noirs, enfoncés. Le dessous du corps & les pattes sont couverts d'écailles d'un vert doré. Les pattes sont quelquefois très-velues.

Il se trouve au Brésil.

238. CHARANSON somptueux.

CURCULIO sumptuosus.

Curculio brevirostris, elytris griseis punctis innumeris elevatis nigro-virescentibus, basi utrinque gibbis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 1. fig. 13.

Il ressemble entièrement, pour la forme & la grandeur, au *Charanson* impérial. Les antennes sont noirâtres. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, sillonnée, d'un noir bleuâtre. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est raboteux, beaucoup plus étroit que les élytres, d'un noir bleuâtre, avec un sillon longitudinal, couvert d'une poussière cendrée. Les élytres sont cendrées, légèrement striées, couvertes de petits tubercules élevés, luisans, d'un noir verdâtre. Les pattes sont d'un noir bleuâtre, légèrement couvertes d'un bleu cendré. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

239. CHARANSON chrysis.

CURCULIO chrysis.

Curculio brevirostris, femoribus muticis, elytris albis fasciis duabus punctisque quatuor aureis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 1. fig. 6.

Il est un peu plus grand que le *Charanson* laitieux. Les antennes sont noires. La trompe est courte, assez grosse, noire, & couverte d'une poussière blanchâtre: on y remarque une ligne longitudinale noire. Les yeux sont noirs. Le corcelet est raboteux, couvert d'une poussière blanche, avec une tache alongée, enfoncée, dorée. Les élytres sont couvertes d'une poussière blanche, elles ont des points enfoncés, noirs, deux bandes vers le milieu, une petite tache à la base, & une autre vers l'extrémité, de couleur d'or; l'extrémité de chaque élytre est terminée en pointe aiguë. Le dessous du corps est cendré & marqué de quatre petites taches dorées. Les pattes sont cendrées. Les cuisses sont sans épines & sans dentelures.

Il se trouve aux Indes orientales.

240. CHARANSON argyrien.

CURCULIO argyreus.

Curculio brevirostris, femoribus submuticis, corpore toto viridi-argenteo aureoque maculato. LIN. Syst. nat. pag. 615. n°. 74. — Mus. Lud. Ulr. pag. 54.

Curculio argyreus. FAB. Syst. ent. pag. 145. n°. 94. — Sp. inf. tom. 1. pag. 184. n°. 128. — Mant. inf. t. 1. pag. 110. n°. 159.

La couleur de cet insecte, est celle d'un blanc d'argent mat, & il ressemble un peu pour la forme du corps au *Charanson* argenté. La trompe est courte, grosse, presque bise à son extrémité. Les antennes sont coudees, en masse, de la couleur du corps. Les yeux sont noirs. Le corcelet est arrondi. Les élytres sont ovales, avec des stries pointillées, parsemées de taches d'un vert doré brillant. L'abdomen est argenté. Les pattes sont verdâtres. Les cuisses sont simples, les premières ont seulement une dent obtuse, très-peu marquée.

Il se trouve aux Indes.

241. CHARANSON royal.

CURCULIO regalis.

Curculio brevirostris femoribus muticis, corpore viridi sericeo: fasciis rubro-aureis repandis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 1. fig. 8. a. b.

Curculio regalis. LIN. Syst. nat. p. 616. n°. 75.

Curculio regalis brevirostris, corpore viridi se-

riceo, fasciis aureis repandis. FAB. *Syst. ent.* pag. 145. n°. 95. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 185. n°. 130.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 111. n°. 161.*

Il a environ sept lignes de long. Les antennes sont noires. La trompe est noire, assez grosse & couverte de quelques écailles bleues & vertes, brillantes. Les yeux sont noirs, arrondis, faillans. Le corcelet est noir, couvert d'écailles bleues & dorées, avec un enfoncement assez grand à sa partie supérieure. Les élytres sont d'un vert doré, avec la base & trois bandes ondées, d'un rouge doré, bordées d'une ligne noire. Le dessous du corps est d'un vert doré très-brillant. Les pattes sont noires, avec un anneau doré sur les cuisses. Les cuisses sont simples.

Il se trouve aux Indes orientales, à Pondichery. Linné dit qu'il se trouve dans le Brésil.

242. CHARANSON marginé.

CURCULIO marginatus.

Curculio brevisrostris fuscus elytrorum suturâ abdominisque marginibus aureis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 7. fig. 82. a.

Curculio marginatus. FAB. *Syst. ent.* pag. 145. n°. 96. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 185. n°. 131.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 111. n°. 162.*

Il a environ huit lignes de long. Les antennes sont noires. La trompe est noire, assez grosse, avec deux légers sillons couverts d'une poussière écailleuse dorée. Le corcelet est noir, un peu raboteux, avec les enfoncements couverts de petites écailles d'un vert doré : on aperçoit de chaque côté, un peu en dessous, une large raie formée par des écailles, tantôt d'un vert argenté, tantôt d'un vert doré. Les élytres sont noires, avec une ligne longitudinale, de chaque côté de la suture, & une autre sur le bord extérieur, formées par de petites écailles d'un blanc argenté ou d'un vert doré : on aperçoit aussi des points enfoncés, rangés en stries. Le dessous du corps est noir, avec deux rangées de taches argentées ou dorées, sur la poitrine & sur l'abdomen. Les pattes sont noires, avec les tarses cendrés. Les cuisses sont simples.

J'ai une variété de cet insecte, dont le corps est brun, au lieu d'être noir.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, aux Antilles,

243. CHARANSON dix-neufs-points.

CURCULIO novemdecimpunctatus.

Curculio brevisrostris canescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris novemdecim. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 3. fig. 25.

Curculio novemdecimpunctatus. FAB. *Syst. ent.* pag. 145. n°. 97. — *Spec. inf. tom. 1. p. 185. n°. 132.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 111. n°. 163.*

Il est de la grandeur du *Charanson* royal. Les antennes sont noires. La trompe est grosse, courte, bleuâtre. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu faillans. Le corcelet est d'un blanc azuré, avec quatre points noirs à sa partie supérieure. L'écusson est noir. Les élytres sont d'un blanc azuré, avec huit points noirs sur chaque, un autre plus petit commun aux deux élytres, placé vers l'extrémité. Les pattes sont bleuâtres. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

244. CHARANSON seize-points.

CURCULIO sexdecimpunctatus.

Curculio brevisrostris carulescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris duodecim. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 2. fig. 17. a. b.

Curculio sexdecimpunctatus. LIN. *Syst. nat.* p. 618. n°. 92. — *Mus. Lud. Ur.* pag. 58.

Curculio sexdecimpunctatus. FAB. *Syst. ent.* p. 146. n°. 98. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 185. n°. 133.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 111. n°. 164.*

Curculio sexdecimpunctatus. DRURY. *Illust. of inf. tom. 3. tab. 49. fig. 4.*

Il est deux ou trois fois plus grand que le précédent. Les antennes sont noires. La trompe est courte, grosse, bleue, marquée à la partie supérieure, d'une ligne longitudinale enfoncée. Les yeux sont noirs, arrondis, faillans. Le corcelet est bleu, un peu enfoncé supérieurement, avec cinq taches noires, une au milieu & deux de chaque côté. Les élytres sont bleues, terminées en pointe, un peu anguleuses à leur base extérieure, avec six taches noires sur chaque, dont deux rapprochées à l'angle de la base, & deux presque réunies, formant une sinuosité, un peu au-delà du milieu, de chaque côté de la suture; les deux autres sont un peu plus grandes & isolées. Le dessous du corps est bleu, avec quelques taches noires. Les pattes sont bleues, simples, avec deux taches sur les cuisses.

On voit dans la collection de M. Banks, une variété fort remarquable de cet insecte. Elle est de la même grandeur; mais tout le corps est d'une couleur verte claire, légèrement bleuâtre & dorée, un peu plus bleue sur les élytres. Les taches des élytres sont noires & séparées. Le corcelet est sans taches, avec un sillon longitudinal enfoncé. Les yeux sont noirs & faillans. Les antennes sont noires & coudées. Les pattes & tout le dessous du corps sont d'un vert très-clair doré, brillant. Le dessous des tarses seul est roux.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, aux Antilles, à Cayenne,

245. CHARANSON décoré.

CURCULIO decorus.

Curculio brevirostris supra fuscus, thorace coeleoprisque vittis duabus viridi-aureis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 152.

Curculio decorus. FAB. Syst. ent. pag. 146. n° 99. — Spec. inf. tom. 1. pag. 185. n° 134. — Mant. inf. tom. 1. p. III. n° 165.

Il est plus petit & il a une figure plus allongée que le *Charanson* royal. Les antennes sont noires, coudées, brunes à leur base. La trompe est courte & assez grosse. Tout le corps en-dessus est noirâtre, mais couvert de petites écailles d'un vert très-clair doré. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est arrondi, & il a deux lignes longitudinales d'un vert clair doré. L'écusson est petit, arrondi postérieurement, doré. Les élytres ont des stries, & chaque strie a une suite de points enfoncés : on voit sur chaque élytre, une ligne longitudinale, d'un vert clair doré, suite de celles du corcelet. Tout le dessous du corps brille d'une belle couleur dorée. Les pattes sont noirâtres, & les cuisses sont sans dents & sans épines.

Il se trouve dans le Brésil.

246. CHARANSON nitidule.

CURCULIO nitidulus.

Curculio brevirostris femoribus muticis viridi tomentosus, elytris punctatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 4. fig. 38. a. b.

Curculio nitidulus. FAB. Syst. ent. pag. 146. n° 100. — Sp. inf. tom. 1. p. 185. n° 135. — Mant. inf. tom. 1. pag. III. n° 166.

Il ressemble au *Charanson* argenté, mais il est un peu plus grand. Les antennes sont noires. La trompe est courte, assez grosse. Tout le corps est couvert d'une poussière écailleuse d'un vert doré brillant.

Il se trouve à Cayenne.

247. CHARANSON candide.

CURCULIO candidus.

Curculio brevirostris, elytris spinosis albis, maculâ laterali fusca. FAB. Syst. ent. pag. 146. n° 101. — Spec. inf. tom. 1. pag. 185. n° 136. — Mant. inf. tom. 1. pag. III. n° 167.

Il est à-peu-près de la grandeur du précédent. La tête est dorée brillante. Le corcelet est obscur à sa partie supérieure & blanc de chaque côté. Les élytres sont blanchâtres, avec une grande tache latérale obscure, de chaque côté vers l'extrémité ; elles ont quelques tubercules élevés, presque épineux. Les pattes sont obscures & les jambes sont fauves.

Il se trouve à Cayenne.

248. CHARANSON blanc-de-neige.

CURCULIO niveus.

Curculio brevirostris niveus, thoracis dorso rostroque fuscis, elytris spinosis acuminatisque. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 14. fig. 173.

Curculio niveus. FAB. Mant. inf. tom. 1. p. III. n° 168.

Il est un peu plus grand que le *Charanson* dix-neuf points. Les antennes sont coudées, roussâtres, avec l'extrémité noire. La trompe est courte, grosse, roussâtre en-dessus, blanche en-dessous. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. La tête est blanche, avec la partie supérieure roussâtre. Le corcelet est blanc, avec une large raie longitudinale roussâtre, à sa partie supérieure. L'écusson est petit & roussâtre. Les élytres sont blanches, avec plusieurs lignes élevées, crénelées : celle qui se trouve à côté de la suture est terminée par une épine. L'extrémité des élytres est terminée en pointe assez longue, dont les deux divergent un peu : on voit une ligne longitudinale courte, sur la suture, qui est une suite de celle de la tête & du corcelet. Tout le dessous du corps & les pattes sont blancs. Les cuisses sont sans dentelures & sans épines.

Il se trouve dans le Brésil, à Cayenne.

249. CHARANSON blanc-de-lait.

CURCULIO lacteus.

Curculio brevirostris albus auro nitidulus, elytris sulcatis acuminatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 14. fig. 172.

Curculio lacteus. FAB. Sp. inf. tom. 1. p. 185. no. 137. — Mant. inf. tom. 1. pag. III. n° 169.

Il est un peu plus petit que le *Charanson* blanc-de-neige. Les antennes sont coudées, cendrées, avec le premier article obscur. La trompe est courte, grosse, blanche, avec l'extrémité obscure. La tête est blanche, avec une raie un peu obscure, dorée, de chaque côté. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est arrondi, pointillé, blanc, légèrement brillant d'or, avec une raie longitudinale un peu obscure & brillante d'or. L'écusson est petit & presque tridenté. Les élytres ont chacune trois lignes longitudinales élevées, & deux rangées de points enfoncés entre chaque ligne : l'extrémité de chaque élytre est terminée en pointe, dont les deux divergent un peu. Le dessous du corps est blanc, avec un reflet un peu doré. Les pattes sont blanches, avec le bout des cuisses & les jambes azurés. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve dans la Jamaïque, au Brésil.

250. CHARANSON émeraude.

CURCULIO smaragdulus.

Curculio breviostris virefcens, *elytris punctatis*, *spina antica posticaque erecta valida*. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 111. n° 170.*

Il ressemble entièrement, pour la forme & la grandeur, au *Charanson* candide. La trompe est courte, échancrée, verdâtre: les antennes sont un peu cendrées. Le corcelet est cylindrique, verdâtre, avec une ligne transversale un peu enfoncée. Les élytres sont vertes, pointillées, avec une épine à la base, vers le bord extérieur, & une autre plus grande, un peu au-delà du milieu, vers la future: on voit encore quelques petites épines peu marquées, qui forment une strie terminée par l'épine postérieure. Le corps est verdâtre.

Il se trouve à Cayenne.

251. CHARANSON octotuberculé.

CURCULIO octotuberculatus.

Curculio breviostris cinereo fuscoque varius, *oleoptis punctatis postice gibbis: tuberculis octo*. FAB. *Mant. inf. t. 1. p. 112. no. 171.*

Il ressemble aux précédens. La trompe est courte, cendrée, presque échancrée. Le corcelet est cylindrique, pointillé, cendré, avec trois lignes longitudinales obscures, dont une de chaque côté, moins marquée. Les élytres sont pointillées, mélangées de cendré & d'obscur; elles ont une gibboité à la partie postérieure, & quatre tubercules rapprochés, obtus. Le corps est cendré, & l'anus est noir.

Il se trouve à Cayenne.

252. CHARANSON spécieux.

CURCULIO speciosus.

Curculio breviostris, femoribus muticis, corpore luteo viridi-nitente, elytris spinis sparsis. LIN. *Syst. nat. pag. 616. n° 77. — Mus. Lud. Ulr. no. 55.*

Il est d'une grandeur moyenne. Le corps est d'un jaune verdâtre brillant. La trompe est courte, un peu déprimée, noire, ciliée, presque bifide à l'extrémité. Le corcelet est presque arrondi. Les élytres sont ovales, striées; elles ont chacune cinq épines élevées, dont la plus grande est au milieu du dos. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

253. CHARANSON serf.

CURCULIO servus.

Curculio breviostris capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris fuscis: punctis maculisque albis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 112. n° 172.*

Il ressemble beaucoup, pour la forme & la

grandeur, au *Charanson* octotuberculé. Les antennes sont coudées, noirâtres, avec le premier article long, ferrugineux. La tête est ferrugineuse, avec un point noir entre les yeux. La trompe est noire, coupée à l'extrémité. Le corcelet est ferrugineux, sans taches. Les élytres ont des stries pointillées; elles sont obscures, ferrugineuses à l'extrémité, avec des taches & des points blancs. Le corps est blanchâtre.

Il se trouve à Cayenne.

254. CHARANSON modeste.

CURCULIO modestus.

Curculio breviostris cinereus, thorace elytrisque fusco maculatis. Ent. ou *hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 14. fig. 178.*

Curculio modestus. FAB. *Spec. inf. t. 1. p. 186. n° 138. — Mant. inf. tom. 1. pag. 112. n° 173.*

Il est petit. Les antennes sont noirâtres & coudées. La trompe & tout le corps sont couverts d'écaillés cendrées, serrées, imbriquées: on voit seulement quelques taches plus obscures sur le corcelet & les élytres. La trompe est courte. La tête est arrondie & les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est aussi large que les élytres: on y voit, avec la loupe, une petite ligne longitudinale, peu enfoncée. L'écusson est très-petit. Les élytres ont des stries régulières, formées par des points enfoncés. Les pattes sont brunes, mais couvertes d'écaillés grises. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures.

Il se trouve dans la nouvelle-Zélande.

255. CHARANSON jaunâtre.

CURCULIO flavescens.

Curculio breviostris obscurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 112. n° 174.*

Il ressemble au *Charanson* vert, mais il est un peu plus grand. La tête est obscure. Le corcelet & les élytres sont d'un brun ferrugineux, avec les côtés jaunes. Les élytres sont pointues à leur extrémité. Le corps est jaunâtre. Les pattes sont vertes.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

256. CHARANSON vert.

CURCULIO viridis.

Curculio breviostris virefcens, thoracis elytrorumque lateribus flavis. Ent. ou *hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 2. fig. 18. a. b.*

Curculio viridis. FAB. *Syst. ent. pag. 146. n° 102. — Sp. inf. tom. 1. pag. 186. n° 139. — Mant. inf. tom. 1. pag. 112. n° 175.*

Curculio viridis brevisrostris, femoribus muticis corpore viridi supra obscuro, subtus flavidiore. LIN. *Syst. nat. pag. 616. n° 76.*—*Faun. Juc. n° 629.*

Curculio flavo cinctus brevisrostris, antennis rectis, corpore oblongo viridi : fascia laterali flava. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 256. n° 45.*

Charanson vert à bande jaune, à courte trompe, & à antennes droites, à corps oblong d'un vert luisant à bande jaune sur les côtés. DEG. *Ib.*

SULZ. *Inf. tab. 3. fig. 24.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 40. fig. 50.*

Rhinomacer. SCHÆFF. *Elem. inf. tab. 108. & Icon. inf. tab. 53. fig. 6. tab. 76. fig. 1. 2. 3.*

Curculio viridis. SCHRANK *Enum. inf. aust. n° 233.*

Cerambyx viridis. POD. *Mus. grac. pag. 30.*

Curculio viridis. LAICHART. *Inf. tom. 1. p. 236. n° 26.*

Curculio viridis. VILL. *Ent. tom. 1. p. 207. n° 144.*

Il a environ cinq lignes de long. Les antennes sont noirâtres, avec le premier article un peu plus court que dans les autres espèces. La trompe est courte, assez grosse & couverte de quelques écailles vertes, & marquée d'une ligne longitudinale élevée. Le corcelet est arrondi, verdâtre, avec les côtés d'un vert jaunâtre doré. Les élytres sont verdâtres, striées, terminées en pointe, avec les côtés d'un jaune vert doré. Le dessous du corps est jaunâtre. Les pattes sont noirâtres & couvertes de quelques écailles dorées.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, sur différens arbres.

257. CHARANSON porte-bosse.

CURCULIO gibber.

Curculio brevisrostris virescenti-albus, elytris basi indidentatis posticè gibbosis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 15. fig. 189.*

Curculio gibber. FAB. *Mant. inf. tom. 1. p. 112. n° 176.*

Curculio gibber brevisrostris, totus carulescenti-candidus, elytris nervosis, gibbere postico communi. PAL. *Icon. inf. sib. pag. 32. tab. B. fig. 14.*

Il est de la grandeur du Charanson blanc-de-neige. Les antennes sont coudées, cendrées, avec l'extrémité noire. La trompe est courte, grosse, avec une ligne longitudinale enfoncée. Tout le corps est blanc, avec une légère teinte d'un vert bleuâtre. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. La tête a une ligne longitudinale enfoncée. Le cor-

Hist. Nat. des Insectes, Tom. V.

celet a trois élévations longitudinales, peu saillantes. L'écusson est petit. Les élytres sont comme raborcuses, elles ont des points enfoncés rangés en stries, & quelques lignes longitudinales élevées : il y a à la base latérale, une élévation horizontale déprimée, & la partie supérieure un peu postérieure est relevée en bosse, au milieu des deux élytres sur la suture. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve à Cayenne.

258. CHARANSON fauve.

CURCULIO fulvus.

Curculio brevisrostris fulvus, capitis basi pedibusque fuscis, rostro emarginato. FAB. *Mant. inf. tom. 1. p. 113. n° 177.*

Il est petit. La tête est fauve, obscure à sa base. La trompe est courte, échancrée à son extrémité. Le corcelet est bossu, lisse, fauve, sans taches. Les élytres sont obscures, à peine striées. Les pattes sont noirâtres.

Il se trouve en Saxe.

259. CHARANSON. mantelé.

CURCULIO palliatus.

Curculio brevisrostris fuscus, thoracis elytrorumque margine cinereo. FAB. *Mant. inf. tom. 1. p. 113. n° 178.*

Il ressemble beaucoup au Charanson vert, mais il est un peu plus petit. Le dessus du corps est obscur, le dessous est cendré. Cette dernière couleur s'étend un peu sur le bord extérieur des élytres & du corcelet.

Il se trouve en Allemagne.

260. CHARANSON aurifère.

CURCULIO aurifer.

Curculio brevisrostris, corpore ferrugineo, aureo maculato. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 10. fig. 124.*

Curculio aurifer. FAB. *Syst. ent. p. 147. n° 103. —Sp. inf. tom. 1. pag. 186. n° 140. —Mant. inf. tom. 1. pag. 113. n° 179.*

Curculio aurifer. DRURY. *Illust. of inf. tom. 1. tab 32. fig. 1.*

Il ressemble un peu, pour la forme & la grandeur, au Charanson nébuleux. Les antennes sont coudées, noires, presque brunes à leur base. La trompe est courte, noire, avec un peu de vert doré à la base. La tête est d'un noir un peu brun, avec un peu de vert doré. Le corcelet est brun, avec les côtés & quatre raies longitudinales dorées : ces raies ne vont pas jusqu'au bord postérieur, &

les deux latérales s'unissent au vert du bord à leur partie antérieure. L'écusson est petit, arrondi & vert doré. Les élytres sont brunes, avec la base & plusieurs raies longitudinales plus ou moins longues, & quelques points distincts, d'une belle couleur verte dorée très-brillante. Le dessous du corps est mélangé de brun & de vert doré brillant. Les pattes sont brunes, avec la base & l'extrémité des cuisses vertes dorées. Les cuisses sont simples, sans dents & sans épines, les antérieures sont un peu plus longues que les autres.

Il se trouve dans l'Amérique, à la Jamaïque.

261. CHARANSON cyanipede.

CURCULIO cyanipes.

Curculio brevisrostris albus, elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyanæis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 15. fig. 190.

Curculio cyanipes. FAB. Mant. inf. tom. I. p. 113. n°. 180.

Il est de la grandeur du Charanson dix-neuf points. Les antennes sont coudées, noirâtres, avec le premier article bleu. La trompe est grosse, très-courte blanche. La tête est blanche, & les yeux sont petits, arrondis, noirs, un peu saillans. Le corcelet est blanc, avec une légère dépression. Les élytres sont blanches, avec des points enfoncés, presque rangés en stries; elles ont chacune une ligne longitudinale élevée, bleue, latéralement dentelée. Elle se termine un peu au-delà du milieu. Le dessous du corps est blanc. Les pattes sont blanches, mais le bout des cuisses & les jambes sont azurés. Les cuisses n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve à Cayenne.

262. CHARANSON du Tamaris.

CURCULIO Tamarisci.

Curculio brevisrostris viridi-nitens, elytris viridi ferrugineo nigro cinereoque variis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 6. fig. 71. a. b.

Curculio Tamarisci. FAB. Mant. inf. t. I. p. 113. n°. 181.

Il a environ deux lignes & demie de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est mince, presque de la longueur du corcelet, ferrugineuse, un peu obscure à sa base. Les antennes sont ferrugineuses. Les yeux sont noirs, arrondis, peu saillans. Tout le corps est couvert d'écaillés, d'une belle couleur verte dorée. Le corcelet est un peu obscur à sa partie supérieure. Les élytres sont mélangées de vert, de cendré, de ferrugineux & d'obscur. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Afrique. Il est très-commun en Provence, dans le mois d'avril, sur le Tamaris.

263. CHARANSON splendeur.

CURCULIO splendidulus.

Curculio brevisrostris viridi nitens, coleopterorum disco cinereo-cupreo nigro fasciato. FAB. Sp. inf. tom. I. pag. 186. n°. 141. — Mant. inf. tom. I. p. 113. n°. 182.

Il ressemble beaucoup au Charanson argenté; mais il est un peu plus petit, & les cuisses sont simples. La tête est cendrée, & la trompe est un peu testacée à l'extrémité. Le corcelet est vert, brillant, avec le dos cendré, marqué de deux lignes longitudinales noires. Le bord des élytres est d'un vert brillant: le disque est cendré, un peu cuivreux, avec une bande au milieu anguleuse, & une petite ligne postérieure, noires. Le dessous du corps est d'un vert brillant.

Il se trouve en Sibérie.

264. CHARANSON curvipède.

Curculio curvipes.

Curculio brevisrostris argenteo squamosus, tibiis posticis arcuatis intus dentatis ciliatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 7. fig. 84. a. b.

Curculio curvipes. FAB. Mant. inf. t. I. p. 113. n°. 183.

Il a environ quatre lignes de long. Les antennes sont noirâtres, avec le premier article allongé, brun. Tout le corps est noir, luisant, légèrement couvert de petites écailles blanches, argentées, qu'on ne peut bien voir qu'à l'aide de la loupe. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en stries. Les cuisses sont simples. Les jambes postérieures dans l'un des deux sexes, sont arquées, velues à leur partie interne, & munies d'une forte dent vers leur base. Les jambes de l'autre sexe sont droites, sans poils & sans dents.

Il se trouve à la Guadeloupe, d'où il a été apporté par feu M. de Badier. M. Fabricius dit qu'il se trouve aux Indes orientales.

265. CHARANSON nébuleux.

CURCULIO nebulosus.

Curculio brevisrostris oblongus, canus, elytris fasciis obliquis nigris. LIN. Syst. nat. pag. 617. n°. 84. — Faun. juéc. n°. 635.

Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine. LIN. Faun. juéc. edit. I. n°. 448.

Curculio nebulosus. FAB. Syst. ent. pag. 147. n°. 104. — Sp. inf. tom. I. pag. 186. n°. 142. — Mant. inf. tom. I. pag. 114. n°. 184.

Curculio nigro-fuscus, thorace utrinque fascia

longitudinali, elytris duplici transversa cinerea. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 280. n° 7.*

Le Charanson à deux bandes transversales. GEOFF. *Ib.*

Curculio carinatus breviostris carinatus, antennis fractis femoribus muticis, corpore oblongo nigro maculis fasciisque albidis, elytris gibbosis. DEG. *Mém. inf. tom. 5. pag. 241. n° 27.*

Charanson à trompe, à arrête, à courte & grosse trompe, à arrête, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps oblong noir, avec des taches & nuances blanches, & à bosses sur les étuis. DEG. *Ib.*

Curculio nebulosus, breviostris, oblongus, albo nigro rufoque varius, rostro carinato. BONSD. *Hist. Curc. suec. pag. 20. n° 3. tab. fig. 4.*

FRISCH. *Inf. 11. pag. 32. tab. 23. fig. 5.*

SCHÆFF. *Icon. inf. tab. 25. fig. 3.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 39. fig. 37.*

Curculio inersf. SCOP. *Ent. carn. n° 68.*

Curculio nebulosus. SCHRANK. *Enum. inf. austr. n° 229.*

Curculio nebulosus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 210. n° 152.*

Il a environ cinq lignes de long & deux de large. La trompe est grosse, presque aussi longue que le corcelet, noire sur les côtés, grise en-dessus, avec une ligne longitudinale, noire, élevée, au milieu. Les antennes sont coudées, d'un noir un peu cendré. La couleur de cet insecte est noire; mais elle paroît nébuleuse par les poils courts, d'un gris cendré, qui le couvrent entièrement. Les élytres ont deux bandes transversales obliques, noires. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, sur les chemins & dans les champs.

266. CHARANSON sulcirostre.

Curculio sulcirostris.

Curculio breviostris oblongus cinereus subnebulosus: rostro trifurcato. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 3; fig. 24.*

Curculio sulcirostris. LIN. *Syst. nat. pag. 617. n° 85.*

Curculio sulcirostris. FAB. *Spec. inf. tom. 1. pag. 187. n° 143. — Mant. inf. tom. 1. pag. 114. n° 185.*

Curculio albo nigroque varius, proboscide pla-

niuscula carinata, thoracis longitudine. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 278. n° 1.*

Le Charanson à trompe sillonnée. GEOFF. *Ib.*

Curculio breviostris, antennis fractis femoribus muticis, corpore oblongo cinereo, elytris maculis fasciisque obliquis nigris. DEG. *Mém. inf. tom. 5. p. 240. n° 26.*

Charanson à trompe sillonnée à courte & grosse trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps oblong cendré, avec des taches & nuances noires obliques sur les étuis. DEG. *Ib.*

Curculio sulcirostris, breviostris, oblongus, canescens, fasciis obliquis nigris, rostro trifurcato. BONSD. *Hist. Curc. suec. pag. 21. n° 4. tab. fig. 5.*

Curculio sulcirostris. SCHRANK. *Enum. inf. austr. n° 228.*

Curculio sulcirostris. LAICHART. *tom. 1. pag. 233. n° 24.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 39. fig. 39.*

Curculio nebulosus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 116. n° 1.*

Curculio sulcirostris. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 210. n° 153.*

Cet insecte diffère du précédent en ce qu'il est beaucoup plus grand, que la trompe à trois sillons, au lieu que celle du précédent a une ligne longitudinale élevée. Les antennes sont courtes, noires, légèrement cendrées. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet. Les yeux sont noirs, oblongs, point du tout saillans, entourés d'un duvet roussâtre. Tout le corps est noir, mais couvert de poils gris & cendrés, courts, qui le font paroître nébuleux. On remarque sur le corcelet quelques lignes longitudinales plus claires, & trois bandes obliques, peu marquées, sur les élytres. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans presque toute l'Europe. Il est très-commun aux environs de Paris.

267. CHARANSON tigré.

CURCULIO tigrinus.

Curculio breviostris cinereus, elytris fasciis quatuor abbreviatis albis, rostro tricarinato.

Curculio tigrinus: breviostris oblongus niger, elytris fasciis cinereo-villosis decussatis, abdomine pedibusque punctis glabris atris. NATURF. *24. p. 21. n° 29. tab. 1. fig. 29.*

Il a environ sept lignes de long & deux de large. Les antennes sont d'un noir cendré. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, couverte d'un duvet roussâtre, avec une élévation longitudinale au milieu, & une autre de chaque côté. Les yeux

sont noirs, à peine saillans. Le corcelet est cendré, couvert de petits tubercules noirs, lisses, avec une ligne longitudinale blanchâtre, au milieu, & une autre de chaque côté, qui s'élargit au milieu. Les élytres sont cendrées, un peu nébuleuses, couvertes de petits tubercules noirs, élevés, avec quatre bandes blanchâtres, courtes, obliques, interrompues à la suture. Le dessous du corps & les pattes sont cendrés, & marqués de petits points noirs. Les cuisses sont simples.

Il se trouve à Lyon d'où il m'a été envoyé, à Nuremberg.

268. CHARANSON plissé.

CURCULIO plicatus.

Curculio brevirostris cinereus, thorace plicato, elytris fasciis duabus undatis cinereis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 6. fig. 65.

Curculio fusco-nebulosus, thorace sulcato; elytris striatis. GEOFF. Inf. tom. 1. pag. 278. n°. 3.

Le Charanson à corcelet sillonné. GEOFF. *Ib.*

Il a environ six lignes de long. Les antennes sont coudées, cendrées, avec la masse obscure. Tout le corps est cendré. La trompe est grosse, un peu plus courte que le corcelet, sillonnée. Le corcelet a huit ou dix plis longitudinaux. Les élytres sont raboteuses : on y remarque des points enfoncés, rangés en stries, quelques poils courts, & deux bandes ondées, grises. Le dessous du corps est gris, avec deux taches noires, rapprochées, sur l'abdomen. Les pattes sont cendrées, avec un anneau gris, sur les cuisses.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France, & rarement aux environs de Paris.

269. CHARANSON échancré.

CURCULIO emarginatus.

Curculio brevirostris oblongus fuscus, coleoptorum dorso cinereo : lineis duabus punctorum impressorum atrorum. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 114. n°. 186.

Il ressemble beaucoup au Charanson nébuleux. La trompe est courte, grosse, noirâtre, marquée de deux sillons. Les antennes sont obscures, cendrées à leur extrémité. Le corcelet est obscur, avec une ligne longitudinale blanchâtre, de chaque côté. Les élytres ont des points élevés, très-petits, presque rangés en stries ; elles sont noirâtres, cendrées vers la suture, avec une frise de points noirs. L'extrémité des élytres paroît échancrée.

Il se trouve en Saxe.

270. CHARANSON perlé.

CURCULIO perlatus.

Curculio brevirostris niger, abdomine albo : punctis elevatis glabris atris, rostro sulcato. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 114. n°. 187.

Il ressemble, pour la forme & la grandeur, au Charanson sulcirostre. La trompe est grosse, noire, sillonnée. Le corcelet est noir, avec une ligne blanche, de chaque côté ; il a des points élevés qui le rendent raboteux. Les élytres sont légèrement velues, pointillées, noirâtres, avec un petit point blanchâtre, à la base. L'abdomen est velu, blanc, avec des points élevés, noirs, glabres.

Il se trouve dans la Chine.

271. CHARANSON glauque.

CURCULIO glaucus.

Curculio brevirostris rostro carinato thoraceque inaequali obscuris, elytris glaucis : puncto postice elevato. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 114. n°. 188.

Curculio glaucus. Naturf. 24. pag. 22. n°. 30. tab. 1. fig. 30.

Il est un peu plus petit que le Charanson nébuleux. La trompe est courte, grosse, noirâtre, ferrugineuse à sa partie supérieure, avec une ligne longitudinale élevée, un peu tranchante. Les antennes sont obscures, avec la masse cendrée. Le corcelet est inégal, mélangé de noir & de cendré. Les élytres sont lisses, glauques, avec un point élevé postérieur, un peu cintré, noir. Le dessous du corps & les pattes sont livides & sans taches.

Il se trouve à Kiell.

272. CHARANSON blanchâtre.

CURCULIO albidus.

Curculio brevirostris oblongus fuscus, elytris albidis : fascia media lituraque bascos apicisque fuscis. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 114. n°. 189.

Curculio candidus. FUESL. Archiv. inf. 5. p. 83. n°. 75. tab. 24. fig. 31.

Il est un plus petit que le Charanson nébuleux. La tête est noirâtre. Le corcelet est noirâtre, avec une petite ligne de chaque côté, antérieure, blanche, pointillée de noir. Les élytres sont blanchâtres, avec une petite ligne à la base, une bande souvent courte, au milieu, & une petite ligne à l'extrémité, noires. La trompe est carenée. L'abdomen est blanc, avec plusieurs lignes de points élevés, noirs.

Il se trouve en Allemagne.

273. CHARANSON portugais.

CURCULIO lusitanicus.

Curculio brevirostris oblongus supra fuscus, ely-

tris macula basæ alba. Ent. ou hist. nat. des inf.
CHARANSON. Pl. 16. fig. 102.

Curculio lusitanicus. FAB. Sp. inf. tom. 1. p. 187.
n°. 144. — *Mant. inf. tom. 1. p. 115. n°. 190.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au Charanson incane. Le corcelet est un peu convexe, arrondi, pointillé, noirâtre en-dessus, avec de petites écailles dorées en dessous. Les élytres sont pointillées, noirâtres, avec les bords latéraux & un point à la base, argentés. L'abdomen est noir, & couvert sur les côtés, de petites écailles argentées. Les pattes sont simples, noires, & couvertes de très-petites écailles argentees.

Il se trouve dans le Portugal.

274. CHARANSON crénelé.

CURCULIO crenulatus.

Curculio breviostris cinereus, elytris lineis tribus elevatis, crenulatis atris. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 129.

Curculio crenulatus. FAB. Syst. ent. pag. 147.
n°. 105. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 187. n°. 145.* —
Mant. inf. tom. 1. pag. 115 n°. 191.

Il est un peu plus grand que le Charanson du Troëne. Les antennes sont coudées, cendrées, avec les derniers articles en masse obscure. La trompe est courte, assez grosse, un peu sillonnée, grisâtre. Les yeux sont noirs. La tête est grisâtre, avec la partie supérieure noirâtre. L'écusson est noir & à peine apparent. Les élytres ont chacune trois lignes longitudinales élevées, noires, entre lesquelles il y a des sillons pointillés grisâtres. Tout le dessous du corps est grisâtre : toute cette couleur grisâtre, est due, tant en-dessus qu'en-dessous, à de petites écailles imbriquées. Les pattes sont noires & les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

275. CHARANSON ponctulé.

CURCULIO punctatulus.

Curculio breviostris niger, elytris punctis nigris albisque alternis holosericeis striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 119.

Curculio punctatulus. FAB. Sp. inf. tom. 1. p. 187.
n°. 146. — *Mant. inf. tom. 1. pag. 115. n°. 192.*

Il est à peine plus grand que le Charanson du Troëne. La trompe est sillonnée, un peu plus courte que le corcelet. Tout l'insecte est noir, mais couvert de poils gris roussâtres, couchés sur le corps. La tête est arrondie, & les yeux ne sont presque pas saillans. Le corcelet est arrondi & il a une ligne longitudinale peu élevée. L'écusson est arrondi postérieurement. Les élytres ont des stries

régulières formées par des points enfoncés d'un noir de velours : entre ces points, il y a beaucoup plus de poils gris. Les pattes sont noires & couvertes ainsi que le corps, de poils gris roussâtres. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, à Terre-Neuve.

276. CHARANSON incane.

CURCULIO incanus.

Curculio breviostris cinereus oblongus, elytris obtusifoveolis. LIN. Syst. nat. p. 616. n°. 81. — *Faun. suec. n°. 631.*

Curculio incanus breviostris oblongus fuscus thoracis dorso plano. FAB. Syst. ent. p. 147. n°. 106. — *Sp. inf. tom. 1. p. 187. n°. 147.* — *Mant. inf. t. 1. p. 115. n°. 193.*

Curculio cinereus, squamosus, alis carens, elytris striatis. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 282. n°. 10.

Le Charanson gris, strié & sans ailes. GEOFF. *ib.*

Curculio griseo-apterus breviostris, antennis fractis longissimis rufis, femoribus muticis, corpore oblongo nigrofusco : pilis nitidis griseis. DEG. Mém. inf. tom. 5. pag. 242. no. 28.

Charanson gris non ailé, non ailé à courte & grosse trompe, à antennes coudées rouffes très-longues, & à cuisses simples, à corps oblong d'un brun noirâtre, couvert de poils gris luisans. DEG. *ib.*

Scarabeus fuscus, lanugine incanus. LIST. Scar. ang. pag. 394. tit. 30.

Curculio incanus. BONSD. Hist. Curc. suec. pag. 41. n°. 36. tab. fig. 37.

La trompe est courte, très-grosse. Les antennes sont minces, longues, d'un brun ferrugineux, avec la masse cendrée. Tout le corps est noir, mais légèrement couvert d'un duvet cendré. Les yeux sont arrondis, saillans. Le corcelet est un peu chagriné. Les élytres sont ovales, légèrement striées, & les stries sont pointillées. Les élytres embrassent une partie de l'abdomen, & elles sont réunies à leur suture; au-dessous, il n'y a point d'ailes. Les cuisses sont simples. Les pattes sont de la couleur du corps.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

277. CHARANSON carené.

CURCULIO carinatus.

Curculio breviostris fuscus, thorace carinato, elytris angulatis tuberculatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 6. fig. 73.

Curculio carinatus abbrevirostris niger, thorace subcarinato, elytris angulatis tuberculatis. LIN. Syst. nat. add. pag. 1066.

Curculio totus fuscus rugosus. GEOFF. *inf.* tom 1. pag. 278. n^o. 2.

Le Charanfon ridé. GEOFF. *Ib.*

Curculio rugosus. FOURC. *Ent. par.* 1. pag. 117. n^o. 2.

Il a de quatre à cinq lignes de long. Tout le corps est d'un noir cendré obscur. La trompe est grosse, un peu plus courte que le corcelet. Les antennes sont coudées, de la longueur de la tête. Le corcelet est reboteux, marqué d'une ligne longitudinale élevée au milieu. Les élytres sont reboteuses, réunies; elles ont trois ou quatre lignes longitudinales, peu élevées, presque crénelées. Le dessous du corps & les pattes sont noirâtres.

Il se trouve aux environs de Paris, dans les provinces méridionales de la France, en Portugal.

278. CHARANSON à côtes.

CURCULIO costatus.

Curculio brevirostris cinereus, thorace nigro; lineis quatuor cinereis. FAB. *Mant. inf.* tom. 1. pag. 115, no. 194.

Il est de la grandeur du Charanfon incane. Les antennes sont coudées, ferrugineuses à leur base. La trompe est courte un peu renflée à son extrémité, noire, avec la partie supérieure cendrée. Le corcelet est arrondi, noir, avec une ligne longitudinale à la partie supérieure, un peu élevée, plus noire. Les élytres & les pattes sont cendrées.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France.

279. CHARANSON barbaresque.

CURCULIO barbarus.

Curculio brevirostris fuscus ferrugineo irroratus, orbitâ oculorum albâ.

Il est un peu plus grand que le Charanfon fulcirostre. Les antennes sont noirâtres, avec la masse cendrée. La trompe est cylindrique, un peu plus courte que le corcelet; elle a à sa partie supérieure, une ligne longitudinale un peu élevée. Tout le corps est noir, mais légèrement couvert de poils très-courts, ferrugineux. Les yeux sont noirs & entourés d'un cercle blanc. Le corcelet est arrondi & très-légèrement chagriné. L'abdomen a

quatre petits points noirs. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Barbarie, & m'a été communiqué par M. Marsham.

280. CHARANSON ophthalmique.

CURCULIO ophthalmicus.

Curculio brevirostris fusco-cinereus, elytris punctis sex griseis.

Il est un peu plus grand que le Charanfon fulcirostre. Les antennes sont courtes, coudées, d'un noir cendré. La trompe est courte, grosse, tricarénée. Tout le corps est noir & couvert de poils courts, cendrés. Le corcelet a deux lignes longitudinales sinuées, peu marquées, grisâtres de chaque côté. Les élytres ont chacune trois points grisâtres, entourés de noir, placés sur une ligne longitudinale: le point du milieu est un peu plus gros que les autres, & ceux-ci sont très-petits & à peine marqués. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Provence, dans les champs.

281. CHARANSON tabide.

CURCULIO tabidus.

Curculio brevirostris fuscus ferrugineo irroratus; thorace lineis duabus, elytris margine punctis duobus cinereis

Curculio lateralis longirostris cylindricus ferrugineus, thorace margine striga oblonga, elytrisque lateribus punctis duobus cinereis. *Naturf.* 24. p. 10. n^o. 27. ~~1801~~ 1802. 27.

Il a environ six lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. Les antennes sont d'un noir cendré. Tout le corps est noir, mais légèrement couvert de poils courts d'un gris ferrugineux. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, carénée à sa partie supérieure. Les yeux sont entourés d'un cercle blanc. Le corcelet est presque cylindrique, un peu reboteux, muni d'une ligne longitudinale élevée & d'une ligne blanche, de chaque côté. Les élytres ont un point blanc à leur base extérieure, & un autre oblong, vers le milieu du bord extérieur: on remarque, au moyen de la loupe, des points enfoncés, rangés en stries. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France, en Italie.

282. CHARANSON grammique.

CURCULIO grammicus.

Curculio brevirostris fuscus, thorace utrinque lineola, elytris baseos puncto cinereo.

Curculio grammicus brevisoftris, thorace margine lineola, elytrisque bascos puncto cinereo. Naturf. 24. pag. 21. n°. 28. tab. 1. fig. 28.

Il est un peu plus petit que le précédent. Tout le corps est noir, très-légèrement couvert de poils gris, courts. Les antennes sont noires, avec l'extrémité cendrée. La trompe est courte, avec une ligne longitudinale peu élevée à sa partie supérieure. Les yeux sont entourés d'un cercle blanchâtre. Le corcelet est légèrement raboteux ; il a une ligne longitudinale élevée, à peine marquée, qui ne va pas jusqu'au bord postérieur. De chaque côté on voit une ligne longitudinale blanche. Les élytres ont un point blanc, à leur base. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France, en Italie.

283. CHARANSON de Bonfidorff.

CURCULIO Bonfidorffii.

Curculio brevisoftris canescens, thoracis dorso, elytris maculis tribus transversis nigris.

Curculio niveus. BORDO, Hist. Curc. suec. p. 21. n°. 5. tab. fig. 6.

Curculio candidus. FUESL. Arch. inf. 5. p. 83. n°. 75. tab. 24. fig. 31.

Il ressemble pour la forme & la grandeur au *Charanson* nébuleux. Les antennes sont noires. La trompe est noire, courte, assez grosse, inégale. Les yeux sont noirs, presqu'entourés d'un cercle blanc. Le corcelet est un peu raboteux en-dessous & sur les côtés ; il est noir à sa partie supérieure. Les élytres sont blanchâtres, avec une tache irrégulière à la base, une autre transversale au milieu, & une plus petite, vers l'extrémité, noires. Le dessous du corps & les pattes sont blanchâtres. Les cuisses sont simples.

La couleur blanche de cet insecte est due à des poils courts, ferrés.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France.

284. CHARANSON interrompu.

CURCULIO interruptus.

Curculio brevisoftris obscurus, coleoptorum fasci interrupta alba. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 122.

Curculio interruptus. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 188. n°. 148. — Mant. inf. tom. 1. pag. 115. n°. 195.

Il est à peu près de la grandeur du *Charanson* du Polygonum. Les antennes sont cendrées, obs-

cures, coudées. Tout le corps est couvert de petites écailles imbriquées, serrées, cendrées. La trompe est assez grosse & plus courte que le corcelet. La tête est un peu arrondie, & les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est arrondi, avec quelques lignes longitudinales peu marquées, d'un gris plus clair. L'écusson est petit, coupé postérieurement, d'un gris blanchâtre. Les élytres sont régulièrement striées, & dans chaque strie il y a des points enfoncés. Les côtés & toute leur partie postérieure, sont d'un gris plus clair. Le dessous du corps & les pattes sont cendrés. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

285. CHARANSON scutellaire.

Curculio scutellaris.

Curculio brevisoftris ater, elytris crenato-striatis, pedibus anticis elongatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 142.

Curculio scutellaris. FAB. Mant. inf. tom. 1. p. 115. n°. 196.

Il est grand. Tout le corps est noir, glabre, sans taches. Les antennes sont coudées. La trompe est grosse, assez courte, sillonnée. Les yeux sont petits, arrondis, saillans. La tête est lisse. Le corcelet est arrondi, irrégulièrement pointillé. L'écusson est petit, arrondi, relevé. Les élytres ont des stries ferrées, dans lesquelles il y a des points enfoncés, très-rapprochés : on voit une élévation vers la partie postérieure de chaque. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures ; les antérieures sont assez grosses, & un peu plus longues que les autres.

Il se trouve dans la terre de Diémen.

286. CHARANSON longimanus.

CURCULIO longimanus.

Curculio brevisoftris fuscus, thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 114.

Curculio longimanus. FAB. Syst. ent. pag. 147. n°. 107. — Sp. inf. tom. 1. pag. 188. n°. 149. — Mant. inf. tom. 1. pag. 115. n°. 197.

Il est de la grandeur du *Charanson* incane. Les antennes sont ferrugineuses obscures, légèrement poilueuses, coudées. La tête est noirâtre, couverte de quelques écailles verdâtres dorées. La trompe est courte. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est arrondi, noirâtre, couvert de quelques écailles verdâtres, avec deux taches

à la partie postérieure, le bord antérieur & les côtés ferrugineux dorés. L'écusson est vert & triangulaire. Les élytres sont obscures, couvertes d'écaillés verdâtres dorées; elles ont des stries régulières, dans lesquelles il y a des points enfoncés transversalement, très-serrés. Les pattes antérieures sont obscures, un peu plus longues que les autres, avec les cuisses renflées, sans épines, & les jambes garnies intérieurement de plusieurs épines courtes. Les autres pattes sont ferrugineuses obscures, sans épines & sans dentelures.

La couleur du corcelet varie. Il est quelquefois presque tout ferrugineux, avec une ligne longitudinale obscure au milieu, ainsi que le bord extérieur des élytres.

Il se trouve dans le Brésil.

287. CHARANSON raucue.

CURCULIO raucus.

Curculio brevirostris nigricans, elytris griseis cinereo punctatis. FAB. *Gen. inf. app. pag. 226.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 188. n° 152.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 115. n° 198.*

Curculio raucus. *Naturf. 24. pag. 23. n° 31. tab. 1. fig. 31.*

Curculio raucus. *FUESL. Arch. inf. p. 82. n° 64. tab. 24. fig. 25.*

Il est plus petit que le Charanson du Troëne. Les antennes sont noirâtres, un peu poilues, coudées. La trompe est courte, couverte d'écaillés cendrées. Tout le corps est couvert de pareilles écaillés. Les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est arrondi. L'écusson est très-petit. Les élytres ont des stries régulières; celles que j'ai vues étoient cendrées obscures, & plus ou moins parsemées de points irréguliers gris. Les pattes sont brunes, avec des écaillés & des poils cendrés. Les cuisses sont simples, sans épines & sans dentelures.

Il se trouve en Allemagne.

288. CHARANSON cotonneux.

CURCULIO tomentosus.

Curculio brevirostris fuscus, thorace maculâ laterali albâ, elytris tuberculatis albis utrinque macula fusca. *Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 153. a. b.*

Il est de la grandeur du Charanson du Polygonum. Les antennes sont brunes. La trompe est grosse, courte, obscure. La tête est obscure, avec les yeux noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est obscur, avec une grande tache blanche de chaque côté. L'écusson est obscur. Les élytres sont couvertes d'un duvet cotonneux blanchâtre, avec une tache obscure de chaque côté, & plu-

sieurs tubercules élevés presque épineux, sur le dos. Les pattes sont obscures, & les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

289. CHARANSON porte-épine.

CURCULIO spinifex.

Curculio brevirostris cinereus fusco irroratus, thorace acute spinoso. *FAB. Mant. inf. t. 1. p. 115. n° 199.*

Il est de grandeur moyenne, & son corps est très-convexe. La trompe est courte, grosse, unie à la partie supérieure. Le corcelet a une épine aigue, de chaque côté. Il est cendré & parsemé de petits points noirâtres. Les élytres sont striées, cendrées, parsemées de points noirâtres, l'abdomen est noirâtre, avec trois rangées de points blancs.

Il se trouve.....

290. CHARANSON du Polygonum.

CURCULIO Polygoni.

Curculio brevirostris, thorace lineato, elytris cinereis, lineolis fuscis suturaque nigro punctata. *Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 4. fig. 41.*

Curculio Polygoni. *FAB. Sp. inf. tom. 1. p. 188. n° 151.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 116. n° 200.*

Curculio Polygoni brevirostris testaceus, coleopterorum sutura nigra repanda. *LIN. Syst. nat. p. 609. n° 26.* — *Faun. fusc. n° 597.*

Curculio Polygoni. *VILL. Ent. tom. 1. pag. 180. n° 22.*

Il est de grandeur moyenne. La trompe est assez mince, plus courte que le corcelet, cendrée, avec un peu de gris à sa partie supérieure. Le corcelet est cendré, avec trois lignes longitudinales blanches. Les élytres sont cendrées, avec une ligne à la base, & deux autres vers le milieu, blanchâtres; la suture est blanchâtre, avec de petits points noirâtres. Le bord extérieur dans quelques espèces est blanchâtre. Les pattes sont cendrées. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Europe, sur la Renouée *Polygonum aviculare.*

291. CHARANSON gris.

CURCULIO griseus.

Curculio brevirostris supra griseo-fuscus subtus cinereus, rostro canaliculato. *FAB. Syst. ent. pag. 148. n° 108.* — *Sp. inf. tom. 1. p. 188. n° 152.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 216. n° 201.*

Il ressemble au *Charanson* linéé, mais il est un peu plus long. La trompe est cylindrique, avec un sillon longitudinal assez profond. Tout le dessus du corps est d'un gris obscur, sans taches. Le dessous est cendré. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Angleterre.

292. CHARANSON trimoucheté.

CURCULIO *triguttatus*.

Curculio brevirostris nigricans, *elytris griseis*, *maculis duabus albis*, *posteriori majori communi*. FAB. *Syst. ent. pag. 148. n° 109.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 188. n° 153.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 116. n° 202.*

Curculio cordiger. SULZ. *Hist. inf. tab. 4. fig. 11.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au *Charanson* triste. La trompe est courte, cannelée. Le corcelet est obscur, sans taches. Les élytres sont presque striées, griffées, avec un point blanc, vers le milieu, & une tache plus grande, commune aux deux élytres, vers l'extrémité.

Il se trouve en Angleterre, dans les endroits sablonneux, près Richmond.

293. CHARANSON géminé.

CURCULIO *geminatus*.

Curculio brevirostris cinereus, *thorace trilineato*, *elytris striis numerosis fuscis per paria approximatis*. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 116. n° 203.*

Il est de grandeur moyenne, presque globuleux. Les antennes sont coudées, terminées en masse ferrugineuse. La trompe est courte, grosse, cendrée. Le corcelet est arrondi, cendré, avec trois larges lignes longitudinales, obscures. Les élytres sont globuleuses, cendrées, avec des stries longitudinales obscures, disposées par paires. Les pattes sont cendrées.

Il se trouve à Kiell.

294. CHARANSON diadème.

CURCULIO *diadema*.

Curculio brevirostris flavescenti villosus, *rostrum apice retuso atro*. FAB. *Mant. inf. tom. 1. p. 116. n° 204.*

Il ressemble au *Charanson* du Coudrier, mais il est un peu plus grand. Les antennes sont coudées, cendrées. La trompe est courte, obscure, tronquée & noire à son extrémité. Le corcelet & les élytres sont couverts de poils courts, jaunâtres. Les pattes sont cendrées.

Il se trouve à Cayenne.
Hist. Nat. Insect. Tom. V.

295. CHARANSON du Coudrier.

CURCULIO *Coryli*.

Curculio brevirostris cinereo fuscoque varius, *elytrorum sutura dimidiata atra*. FAB. *Syst. ent. p. 148. n° 110.* — *Sp. inf. t. 1. p. 189. n° 154.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 116. n° 205.*

Curculio capitatus brevirostris antennis fractis fuscis, *femoribus muticis*, *capite lato*, *corpore subgloboso griseo-cinereo*, *pedibus fuscis*. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 245. n° 32.*

Charanson gris, à large tête, à courte trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps court & ovale, d'un gris cendré, à pattes & antennes brunes. DEG. *Ib.*

Curculio capitatus brevirostris, *fusco-cinereus*, *sutura*, *elytrorum basi nigra*, *rostrum brevissimo*, *lato*, *adomine subgloboso*. BONSD. *Hist. curc. succ. p. 33. n° 23. tab. fig. 24.*

Il ressemble au *Charanson* cervine. La trompe est courte, noire à son extrémité. Le corcelet, les élytres sont glabres, mélangés de cendré & d'obscur. La future, depuis la base jusqu'au milieu, est noire, glabre.

Il se trouve en Angleterre, sur le Coudrier.

296. CHARANSON linéé.

Curculio *lineatus*.

Curculio brevirostris griseus, *thorace striis tribus pallidioribus*. LIN. *Syst. nat. p. 616. n° 80.* — *Faun. succ. n° 630.*

Curculio lineatus. FAB. *Syst. ent. p. 148. n° 111.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 189. n° 155.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 116. n° 206.*

Curculio rostrum thoracis longitudine, *thorace tribus striis pallidioribus*. GEOFF. *Inf. tom. 1. p. 283. n° 13?*

Le *Charanson* à corcelet rayé. GEOFF. *Ib.*

Curculio brevirostris, *antennis fractis*, *femoribus muticis*, *corpore oblongo griseo*, *thorace striis tribus pallidioribus*. DEG. *Mem. inf. tom. 5. p. 247. n° 35.*

Charanson rayé à courte trompe. A courte trompe, à antennes coudées, à cuisses simples, à corps ovale gris, avec trois bandes plus pâles sur le corcelet. DEG. *Ib.*

Curculio lineatus. BONSD. *Hist. curc. succ. p. 129. n° 16. tab. fig. 16. 17.*

Curculio lineatus. SCHRANK. *Enum. inf. aust. n° 242.*

SCHAEFF. *Icon. inf. tab. 103. fig. 8.*

Curculio fasciolatus. FOURC. *Entom. par.* 1. pag. 110. n^o. 13. ?

Curculio lineatus. VILL. *Ent. tom.* 1. pag. 208. n^o. 148.

Il a environ deux lignes & demie de long & une de large. La trompe est courte, grosse, à peine plus longue que la tête. Les antennes sont coudées, brunes, assez longues. Tout le corps est grisâtre. Le corcelet a trois lignes longitudinales d'un gris plus clair que le reste du corps. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés. Les pattes sont d'un brun roussâtre. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, sur les arbres & sur les buissons.

297. CHARANSON lunulé.

CURCULIO lunatus.

Curculio brevirostris, coleoptris elevato-striatis, fascia semicirculari maculaque postica albis, lunula nigra. FAB. *Syst. ent.* p. 148. n^o. 112. — *Sp. inf.* tom. 1. p. 189. n^o. 156. — *Mant. inf. t. 1.* pag. 116. n^o. 207.

Il est petit & il ressemble au Charanson linéé. La trompe est courte, grosse, cendrée, avec un point enfoncé, sur le front. Les élytres ont trois ou quatre lignes élevées, un peu tranchantes, qui ne vont pas jusqu'à l'extrémité de l'élytre, elles sont cendrées, avec une bande blanche, semi-circulaire, qui part de l'angle extérieur de la base, & descend jusqu'au milieu des élytres : on voit postérieurement une grande tache blanche, commune aux deux élytres, dans laquelle se trouve une autre tache plus petite, en croissant, noire. Les pattes sont cendrées, avec des bandes obscures.

Il se trouve en Angleterre.

298. CHARANSON fulvipède.

CURCULIO fulvipes.

Curculio brevirostris tomentoso virescens, pedibus testaceis. FAB. *Mant. inf.* tom. 1. pag. 116. n^o. 208.

Il a la forme du Charanson linéé. La trompe est courte, unie à sa partie supérieure. Le corps est pubescent, verdâtre. L'abdomen est argenté. Les antennes sont coudées, obscures. Les pattes sont testacées.

Il se trouve en Saxe. & aux environs de Paris.

299. CHARANSON ruficolle.

CURCULIO ruficollis.

Curculio brevirostris testaceus, capite elytrisque striatis cinereo fuscis. FAB. *Mant. inf.* tom. 1. pag. 116. n^o. 209.

Il est petit. La tête est obscure. Les antennes sont coudées, fauves, avec la masse obscure. Le corcelet est lisse, testacé. Les élytres sont striées, d'une couleur cendrée, obscure.

Il se trouve en Saxe.

300. CHARANSON ondé :

CURCULIO undatus.

Curculio brevirostris fuscus, elytris apice pallidis, striga undata fusca. FAB. *Sp. inf.* tom. 1. pag. 189. n^o. 157. — *Mant. inf. t. 1.* p. 117. n^o. 210.

Il est petit, & ressemble beaucoup au Charanson lunulé. La trompe est courte. Tout le corps est obscur. Les élytres sont pâles à l'extrémité, & elles ont une ligne transversale, onnée, obscure. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Allemagne.

301. CHARANSON hispidule.

CURCULIO hispidulus.

Curculio brevirostris fuscus, thorace cinereo lineato, elytris hispidis, punctis obscurioribus striatis. FAB. *Gen. inf. mant.* p. 226. — *Sp. inf. t. 1.* p. 189. n^o. 158. — *Mant. inf. tom. 1.* p. 117. n^o. 211.

Il est petit & ressemble au Charanson linéé. Les antennes sont coudées ; le premier article est long. Le corcelet est pointillé, obscur, avec trois lignes longitudinales cendrées : l'intermédiaire est plus étroite que les autres : on voit de chaque côté du corcelet un point cendré. Les élytres sont obscures, avec des poils élevés, roides, & des points noirâtres rangés en stries : les poils sont insérés, entre les points, ce qui forme des lignes interrompues, blanches & noires. Les pattes sont noirâtres.

Il se trouve à Kiell, sur les plantes aquatiques.

302. CHARANSON scabricule.

CURCULIO scabriculus.

Curculio brevirostris, corpore cinereo hispido. FAB. *Syst. ent.* pag. 149. n^o. 113. — *Sp. inf. t. 1.* p. 189. n^o. 159. — *Mant. inf. tom. 1.* p. 117. n^o. 212.

Curculio scabriusculus brevirostris, femoribus mucicis cinereus, elytris hispidis. LIN. *Mant.* p. 531.

Curculio scabriculus brevirostris, subglobosus, rostro canaliculato, corpore cinereo hispido. BOND. *Hist. curc. suec.* pag. 32. n^o. 20. tab. fig. 21.

La trompe est raboteuse, sillonnée. Les yeux sont arrondis, peu saillans. Les antennes sont coudées, d'une couleur fauve, un peu cendrée. Le corcelet est raboteux, & muni d'un tubercule assez grand, de chaque côté. Les élytres sont arrondies, presque globuleuses, souvent réunies, raboteuses, striées, couvertes de poils courts, élevés, roides

Le dessous du corps & les pattes sont d'une couleur cendrée obscure. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans les endroits sablonneux de la Suède, au commencement du printemps.

303. CHARANSON cervine.

CURCULIO cervinus.

Curculio brevisrostris griseus, antennis basi rufescentibus. FAB. *Syst. ent. pag. 149. n° 114. — Sp. inf. tom. 1. pag. 190. n° 160. — Mant. inf. tom. 1. p. 117. n° 213.*

Curculio cervinus brevisrostris, femoribus dentatis, antennis basi rufescentibus. LIN. *Syst. nat. pag. 615. n° 70. — Faun. suec. n° 627.*

Curculio griseo-aneus, brevisrostris, antennis fractis rufis, femoribus dentatis, corpore oblongo griseo-aneo nitido. DEG. *Mem. inf. tom. 5. p. 220. n° 13.*

Charanson gris-bronzé à courte trompe, à antennes coudées rousses & à cuisses dentelées, à corps oblong, d'un gris bronzé, luisant. DEG. *ib.*

Curculio cervinus brevisrostris oblongo ovatus, cinereus, nigro irroratus, antennis basi rufis. BONSD. *Hist. curc. suec. pag. 29. n° 15. tab. fig. 15.*

Curculio cervinus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 203. n° 124.*

Il a environ deux lignes & demie de long & une de large. La trompe est courte, grosse, de la longueur de la tête. Les antennes sont coudées, assez longues, fauves, avec la masse qui les termine, noirâtre. Tout le corps est couvert de petites écailles cendrées. L'écusson est petit & blanchâtre. Les élytres ont neuf stries, formées par des points enfoncés. Les pattes sont obscures. Les cuisses, suivant Linné & de Geer, ont une petite épine.

Il se trouve au nord de l'Europe.

304. CHARANSON hérissé.

CURCULIO echinatus.

Curculio brevisrostris, ferrugineus, abdomine globoso, elytris setis erectis dense echinatis. BONSD. *Hist. curc. suec. pag. 33. n° 21. tab. fig. 22.*

Curculio scaber. MULL. *Zool. Dan. 86. 947.*

Il est un peu plus ovale que le Charanson cervine. La trompe est courte, anguleuse à son extrémité. Les antennes sont ferrugineuses. Les yeux sont arrondis, à peine saillans. Le corcelet est cylindrique, étroit, hérissé. Les élytres sont réunies, renflées, ferrugineuses avec huit stries pointillées,

& des poils élevés, roides, qui les font paroître hérissées. La poitrine & l'abdomen sont noirâtres, & l'anus est fauve. Les pattes sont d'un jaune ferrugineux. Les cuisses sont simples.

Il se trouve au nord de l'Europe.

305. CHARANSON strié.

CURCULIO striatus.

Curculio brevisrostris fuscus, elytris striis cineris nigro punctatis. FAB. *Mant. inf. t. 1. pag. 117. n° 214.*

Il est petit. La tête est noirâtre. Le corcelet est noirâtre, avec une ligne longitudinal cendrée, à la partie supérieure. Les élytres sont noirâtres, avec trois stries longitudinales & la suture cendrée, veloutées, ponctuées de noir.

Il se trouve en Afrique.

306. CHARANSON Lézard.

CURCULIO Lacerta.

Curculio brevisrostris griseus, elytris striatis, antennis apice nigris. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 6. fig. 68. & pl. 12. fig. 148.*

Curculio Lacerta. FAB. *Sp. inf. t. 1. pag. 190. n° 161. — Mant. inf. tom. 1. p. 117. n° 215.*

Il est un peu plus gros que le Charanson du Troëne. Les antennes sont coudées, grises, avec l'extrémité noirâtre. La trompe est grosse & courte. Tout le corps est grisâtre, un peu plus obscur en-dessus qu'en dessous. Les yeux sont petits, arrondis, noirs & saillans. Le corcelet a une ligne longitudinale peu enfoncée, au milieu. Les élytres sont ovales; elles ont des stries régulières crénelées, & vers leur milieu, une bande moins obscure. L'écusson est imperceptible. Les cuisses sont simples.

Il se trouve aux Indes orientales.

307. CHARANSON écailleux.

CURCULIO squamosus.

Curculio brevisrostris, femoribus muticis, griseus, elytris punctato-striatis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 8. fig. 96.*

Il ressemble beaucoup au Charanson Lézard. Tout le corps est couvert d'une poussière écailleuse grisâtre. La trompe est courte. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est arrondi. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés, & une tache transversale obscure, très-peu marquée. Les pattes n'ont ni épines ni dentelures.

Il se trouve à Madagascar.

308. CHARANSON sombre.

CURCULIO fuscus.

Curculio brevirostris, femoribus muticis, fusco cinereoque varius, elytris punctato-striatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 8. fig. 93.

Il est un peu plus petit que le Charanson nébuleux. Tout le corps est mélangé d'obscur & de cendré. Les antennes sont obscures. La trompe est grosse, courte, marquée d'une ligne longitudinale élevée. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés. Toutes les cuisses sont sans épines & sans dentelures.

Il se trouve au Sénégal.

309. CHARANSON agile.

CURCULIO velox.

Curculio brevirostris pilosus niger, elytris marginè puncto baseos fascia interrupta punctoque apicis albis. FAB. Mant. inf. t. 1. p. 117. n°. 216.

Il est petit. Les antennes sont coudées, noires. La tête est carénée, noire, sans taches. Le corcelet est arrondi, noir, avec une ligne blanche, de chaque côté. Les élytres sont poileuses, striées, noires, avec le bord extérieur, un grand point, à la base, une bande au milieu, interrompue, & un point à l'extrémité, blancs. Les pattes sont noires.

Il se trouve à Cayenne.

310. CHARANSON ruficorne.

CURCULIO ruficornis.

Curculio brevirostris ater, antennis rubris, thorace utrinque bituberculato. FAB. Syst. ent. p. 149. n°. 115. — Sp. inf. tom. 1. pag. 190. n°. 162. — Mant. inf. tom. 1. pag. 117. n°. 217.

Curculio ruficornis brevirostris, femoribus muticis, corpore atro, thorace bituberculato, antennis rubris. LIN. Syst. nat. pag. 616. n°. 78. — Faun. suec. n°. 636.

Curculio ruficornis brevirostris oblongo ovatus, thorace cylindrico utrinque bituberculato, antennis pedibusque rufis. BONSD. Hist. curc. suec. p. 27. n°. 13. tab. fig. 13.

Il a environ deux lignes de long. Le corps est ovale, oblong, noirâtre. Les antennes sont rougeâtres, coudées. La trompe est courte, assez grosse, avec un sillon un peu plus enfoncé vers l'extrémité. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est cylindrique, muni de deux tubercules de chaque côté. Les élytres sont striées, cendrées, avec trois bandes roussâtres, la première peu marquée, à la base, la seconde droite, au milieu, la troisième ondée, vers l'extrémité. L'anus est fauve.

Les pattes sont rougeâtres. Les cuisses sont simples.

Il se trouve au nord de l'Europe.

311. CHARANSON chloropède.

CURCULIO chloropus.

Curculio brevirostris niger antennis pedibusque rufis. FAB. Syst. ent. p. 149. n°. 116. — Sp. inf. tom. 1. p. 190. n°. 163. — Mant. inf. tom. 1. pag. 117. n°. 218.

Curculio chloropus. LIN. Syst. Nat. pag. 617. n°. 82. — Faun. suec. n°. 635.

Curculio chloropus brevirostris, elongatus totus niger, antennis pedibusque rufescentibus. BONSD. Hist. curc. suec. pag. 31. n°. 18. tab. fig. 19.

Il a à peine deux lignes de long. Tout le corps est noir. Les antennes sont rougeâtres. La trompe est courte, à peine sillonnée. Les yeux sont noirs, arrondis, très-saillans. Le corcelet est lisse, légèrement pointillé. Les élytres sont oblongues, avec des stries pointillées. La poitrine & l'abdomen sont noirs, légèrement couverts d'écailles cendrées. Les cuisses sont simples, noires, ferrugineuses à leur base. Les jambes & les tarses sont rougeâtres.

Il se trouve dans le nord de l'Europe sur différentes plantes.

312. CHARANSON ater.

CURCULIO ater.

Curculio brevirostris oblongus ater, antennis rufis. LIN. Syst. nat. pag. 617. n°. 86. — Faun. suec. n°. 637.

Curculio ater brevirostris, linearis ater, thorace longissimo, antennis pedibusque piceis. BONSD. Hist. curc. suec. pag. 31. n°. 19. tab. fig. 20.

Le corps est noir, alongé, linéaire, un peu plus petit que celui du précédent. La trompe est courte. Les antennes sont coudées, d'un brun noirâtre, avec le premier article ferrugineux. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est long, presque aussi large que les élytres, fortement pointillé. Les élytres sont glabres, obtuses, avec huit stries pointillées. Les pattes sont courtes, d'un brun noirâtre. Les cuisses sont simples, un peu renflées.

M. Fabricius a regardé cet insecte, comme une variété du précédent.

Il se trouve au nord de l'Europe.

313. CHARANSON triste.

CURCULIO tristis.

Curculio brevirostris niger, elytris striatis ei

neris. FAB. *Syst. ent. pag. 149. n° 117.*—*Sp. inf. tom. 1. pag. 190. n° 164.*—*Mant. inf. tom. 1. pag. 117. n° 219.*

Curculio tristis brevirostris, ovatus, niger, elytris cinereis profunde striatis. BONSD. *Hist. curc. fuzc. pag. 36. n° 27. tab. fig. 28.*

Il ressemble au *Charanson* du Troëne, mais il est deux ou trois fois plus petit. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est noire, courte, un peu plus étroite au milieu. La tête est noire & arrondie. Les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est arrondi, finement chagriné. L'écusson est noir & très-petit, à peine visible. Les élytres sont ovales, striées, avec des points enfoncés & bien marqués dans chaque strie; elles sont d'une couleur cendrée roussâtre, un peu obscure. Le dessous du corps est noir. Les cuisses sont noires, simples, sans épines. Les jambes sont brunes.

Il se trouve en Angleterre.

314. CHARANSON saupoudré.

CURCULIO adpersus.

Curculio brevirostris ater, elytris posticè albo maculatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 13. fig. 156. a. b.*

Curculio adpersus. FAB. *Syst. ent. pag. 149. n° 118.*—*Sp. inf. tom. 1. pag. 190. n° 164.*—*Mant. inf. tom. 1. pag. 117. n° 220.*

Il ressemble un peu au *Charanson* triste, mais il est une fois plus petit. Les antennes sont coudées, noires, assez longues. Tout le corps est d'un noir très-foncé & couvert en quelques endroits d'écailles blanches. La trompe est courte. Les yeux sont arrondis, peu saillans. Le corcelet est arrondi & pointillé. L'écusson n'est pas apparent. Les élytres sont ovales, avec des stries de points enfoncés assez grands; elles ont quelques écailles blanches, sur-tout vers leur partie postérieure. Les pattes sont noires, avec des écailles peu nombreuses, blanches. Les cuisses sont simples sans épines & sans dentelures.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

315. CHARANSON ponctué.

CURCULIO punctatus.

Curculio brevirostris fuscus, elytris punctis holosericeis elevatis margineque flavo. FAB. *Syst. ent. pag. 150. n° 119.*—*Sp. inf. tom. 1. pag. 190. n° 166.*—*Mant. inf. tom. 1. pag. 117. n° 221.*

Curculio punctatus. LAICHART. *Inf. t. 1. p. 221. n° 16.*

Curculio fuscus, fulvo maculatus, elytris striatis, striis alternatim nigro maculatis. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 279. n° 5.*

Le Charanson à côtes tachetées. GEOFF. *Ib.*

Il est plus grand que le précédent. Le corps est ovale, obscur. La trompe est courte. Le corcelet est glabre, élevé. Les élytres ont des stries pointillées, & des points élevés noirs, foyeux, parmi lesquels se trouvent des points blanchâtres. Les pattes sont simples.

Il se trouve en Suède.

316. CHARANSON obscur.

CURCULIO obscurus.

Curculio brevirostris ovatus ferrugineo-fuscus, FAB. *Syst. ent. pag. 150. n° 120.*—*Sp. inf. tom. 1. pag. 191. n° 167.*—*Mant. inf. tom. 1. p. 118. n° 222.*

Tout le corps de cet insecte est d'une couleur ferrugineuse obscure. Les élytres ont quelques lignes élevées, peu marquées.

Il se trouve en Suède.

317. CHARANSON noir.

CURCULIO niger.

Curculio brevirostris ovatus scaber niger, pedibus rufis. FAB. *Syst. ent. pag. 150. n° 121.*—*Sp. inf. tom. 1. pag. 191. n° 168.*—*Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n° 223.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au *Charanson* triste. Tout le corps est noir, obscur, couvert de petits points élevés, qui le rendent un peu raboteux. Les antennes sont noires. Les pattes sont fauves, avec les genoux & les tarses noirs.

Il se trouve en Allemagne.

318. CHARANSON variolé.

CURCULIO variolosus.

Curculio brevirostris niger, thorace carinato variolosus, elytris striatis. FAB. *Syst. ent. p. 150. n° 122.*—*Sp. inf. tom. 1. pag. 191. n° 169.*—*Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n° 224.*

Il ressemble au *Charanson* ponctué. Tout le corps est noir. La trompe est courte. Le corcelet est carené, couvert de points enfoncés, irréguliers. Les élytres sont réunies pointues à leur extrémité. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Saxe, dans les champs.

319. CHARANSON stictique.

CURCULIO sticticus.

Curculio brevirostris thorace elytrisque variolosus nigris albo punctatis. FAB. *Gen. inf. mant. p. 226.*—*Spec. inf. tom. 1. pag. 191. n° 170.*—*Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n° 225.*

Il est petit. La tête est noire, sans taches. La trompe est courte. Le corcelet est variolé, noir, pointillé de blanc. Les élytres sont variolées, noires, avec une bande noire, vers l'extrémité. Le dessous du corps & les pattes sont noirs.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

320. CHARANSON cagneux.

CURCULIO valgus.

Curculio brevisrostris ater, nitens, elytris punctato striatis, f. minoribus annulo cinereo. FAB. Syst. ent. p. 150. n°. 123. — *Sp. inf. tom. 1. p. 191. n°. 171.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 118. n°. 226.*

Il est de grandeur moyenne, & il ressemble un peu au Charanson du Poirier. Tout le corps est noir, luisant. Les élytres ont des stries pointillées. Les pattes sont noires. Les cuisses sont simples, & elles ont vers leur extrémité, un anneau cendré, peu marqué.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

321. CHARANSON marginelle.

CURCULIO marginellus.

Curculio brevisrostris niger, thorace elytrisque marginibus albis, elytris linea longitudinali interrupta alba. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 134.

Curculio succinctus brevisrostris ater, elytris margine lineolisque duabus albis. FAB. Gen. inf. mant. pag. 226. — *Sp. inf. tom. 1. p. 191. n°. 172.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n°. 227.*

Curculio marginellus brevisrostris niger, thoracis elytrorumque margine albis. FAB. Sp. inf. tom. 1. p. 193. n°. 182. — *Mant. inf. tom. 1. pag. 119. n°. 240.*

Curculio albator crassirostris oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, postice compressis pubescentibus, fasciis lateralibus niveis. Pall. inf. fib. pag. 36. tab. B. fig. 21.

Il est plus étroit & un peu plus long que le Charanson nébuleux. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est noire, un peu plus longue que la tête, avec quelques impressions longitudinales. La tête est noire, avec un peu de blanc de chaque côté. Le corcelet est presque cylindrique, noir, chagriné, avec une ligne longitudinale sur les bords extérieurs. L'écusson est noir, petit & arrondi. Les élytres sont un peu comprimées par les côtés, elles ont des stries régulières, formées par des points enfoncés: on y remarque le bord extérieur blanc, une raie longitudinale, qui part obliquement de ce bord, une ligne longitudinale droite depuis la base jusqu'au milieu, & formant à cet endroit un angle obtus, une autre

ligne irrégulière au-delà du milieu. Le corps est noir en-dessous, & mélangé de blanc. L'abdomen de chaque côté a une raie longitudinale blanche. Les pattes sont noires, & les cuisses sont sans épines & sans dentelures.

Il se trouve.....

322. CHARANSON à-bandelettes.

CURCULIO vittatus.

Curculio brevisrostris ater, elytris striis albis rubrisque abbreviatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 15. fig. 192.

Curculio vittatus. FAB. Syst. ent. p. 150. n°. 124. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 191. n°. 173.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n°. 228.*

Curculio vittatus longirostris elytris lineis albis luteisque. LIN. Syst. nat. pag. 610. n°. 33.

Scarabeus Curculio proboscide longa, dorsum arcuatum, elytris fasciis albis & luteis variegatis. Sloan. hist. of jam. tom. 2. pag. 210.

Il ressemble beaucoup pour la forme & la grandeur, au Charanson superbe. Les antennes sont cendrées, noirâtres, & noires à leur base. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, noire. Les yeux sont saillans. La tête a un peu de blanc ou de vert au tour des yeux; elle est noire. Le corcelet est noir, finement chagriné, avec quelques taches vertes ou blanches à leur partie latérale. L'écusson est vert ou blanchâtre, arrondi postérieurement. Les élytres sont noires, avec de légères stries de points enfoncés: on y remarque une raie sur la suture blanche ou verdâtre, qui descend de la base jusqu'au-delà du milieu, une autre raie de la même longueur rougeâtre, presque couleur de rose, un peu enfoncée, assez large, une autre verte ou blanchâtre, à côté; enfin, une autre d'un rouge fauve vers le bord extérieur: l'extrémité est grisâtre. Le dessous du corps est noir, avec les côtés blancs ou verdâtres. Les pattes sont noires. Les cuisses sont simples, un peu renflées.

Cet insecte varie. Tout le noir est souvent brun.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à la Jamaïque.

323. CHARANSON de Spengler.

CURCULIO Spengleri.

Curculio brevisrostris, elytris flavis, lineis atris glaberrimis abbreviatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 2. fig. 15. a. b. c. & pl. 7. fig. 82. b.

Curculio Spengleri. FAB. Syst. ent. pag. 151. n°. 125. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 191. n°. 174.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n°. 229.*

Curculio spengleri longirostris fuscus, elytris flavis: lineis atris glaberrimis abbreviatis inaequalibus pedibus ferrugineis. LIN. *Syst. nat. p. 609. n^o. 32.*

Curculio Spengleri. *Añ. Soc. Berol. phys. 4. tab 7. fig. 7.*

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 39. fig. 41.*

Il a de huit à neuf lignes de long. Les antennes sont noires, un peu cendrées. La trompe est assez grosse plus courte que le corcelet, noire, couverte d'une poussière verte, dorée en-dessus, blanche sur les côtés: la partie supérieure est presque carenée. Les yeux sont noirs, arrondis, peu saillans. Le corcelet est noir, un peu raboteux à sa partie supérieure, avec une poussière écailleuse, verdâtre & blanche dans les enfoncemens, & une large raie blanchâtre de chaque côté. Les élytres ont des stries pointillées; elles sont couvertes de petites écailles, tantôt blanches, tantôt jaunâtres, avec quelques lignes longitudinales élevées, lisses, qui partent de la base, & se terminent un peu en-delà du milieu. Le dessous du corps est blanchâtre, avec le milieu de la poitrine & de l'abdomen, d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun noirâtre. Les cuisses sont simples.

Il se trouve aux Antilles. Il est très-commun à la Guadeloupe, sur les fleurs des orangers.

324. CHARANSON birayé.

CURCULIO bivittatus.

Curculio brevisrostris niger, elytris punctato-striatis: vitta marginali dorsaliq. interrupta flavis. *Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 3. fig. 23.*

Curculio bivittatus. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n^o. 230.*

Il ressemble un peu, pour la forme & la grandeur, au précédent. Les antennes sont coudées, blanchâtres au milieu, avec le premier & le dernier articles très-noirs. La trompe est unie, pointillée. Tout le corps est très-noir. Le corcelet a quelques petits points blancs. Les élytres sont fortement pointillées; & ont chacune deux raies longitudinales, dont l'une placée vers la future, interrompue en-deçà du milieu, & l'autre entière, vers le bord postérieur: la future est blanche. Le dessous du corps est noir, avec quelques taches blanches. Les pattes sont noires. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale, à l'île Saint-Thomas.

325. CHARANSON livide.

CURCULIO lividus.

Curculio brevisrostris griseus, thorace elytrisque

cinereo atroque maculatis. *Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 5. fig. 59.*

Curculio lividus. FAB. *Spec. inf. tom. 1. p. 191. n^o. 175.—Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n^o. 231.*

Curculio lividus. BROWN. *Illust. pag. 129. tab. fig. 8.*

Il ressemble au *Charanson* rétréci; mais il est beaucoup plus grand. Les antennes sont grises & coudées. La trompe est assez grosse, plus courte que le corcelet, & couverte d'une poussière roussâtre. La tête est couverte de la même poussière. Les yeux sont noirs, oblongs, point du tout saillans. Le corcelet est grisâtre, avec quatre raies longitudinales rousses & quelques points noirs. L'écusson est à peine apparent. Les élytres sont variées de gris & de cendré roussâtre, avec plusieurs points & taches noirs. Le dessous du corps & les pattes sont cendrés roussâtres. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

326. CHARANSON superbe.

CURCULIO pulcher.

Curculio brevisrostris, coleoptris atris, striis sex dorsalibus approximatis abbreviatis albis. *Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 150.*

Curculio pulcher. FAB. *Sp. inf. tom. 1. p. 192. n^o. 176.—Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n^o. 232.*

Curculio pulcher. BROWN. *Illust. pag. 126. tab. 49. fig. 6.*

Il varie beaucoup pour la grandeur. Il est ordinairement aussi grand que le *Charanson* à bandes-lettres. La trompe est noire, assez grosse, une fois plus courte que le corcelet. La tête est à peine plus grosse que la trompe. Les yeux sont arrondis un peu saillans. Les antennes sont noirâtres, coudées. Le corcelet est très-finement chagriné; il a au milieu une ligne très-petite & peu marquée. Les élytres sont noires, avec sept sillons larges, peu enfoncés, très-blancs, couverts d'une poussière ou de petites écailles blanches, imbriquées, très-serrées: la raie du milieu est commune & plus large que les autres; on voit quelquefois des commencemens d'une autre raie sur les côtés; à la base extérieure de chaque élytre, il y a une tache allongée, rougeâtre. Les élytres ont des stries formées par des points sur les côtés extérieurs. Le dessous du corps est noir, avec un peu de gris sur les côtés. Les pattes sont noires. Les cuisses sont simples. Les tarses sont d'un noir cendré.

Il se trouve à la Jamaïque.

327. CHARANSON Caméléon.

CURCULIO Caméleon.

Curculio brevirostris aureus, elytris sutura vittaque abbreviata viridi-aurea. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 166.

Curculio rufescens, Curculio sumiis. DRURY. Ill. of inf. t. 2. tab. 33. fig. 4. 5.

Il ressemble au *Charanson* à bandelettes, mais il est ordinairement plus grand. Il varie cependant beaucoup pour les couleurs & pour la grandeur. Les antennes sont cendrées, avec la première pièce un peu cuivreuse, & l'extrémité obscure. Tout le corps est couvert d'une poussière écailleuse, imbriquée, d'une belle couleur cuivreuse, plus ou moins dorée. La trompe est grosse & courte. Les yeux sont arrondis, noirs & saillans. Le corcelet est arrondi. L'écusson est arrondi postérieurement, il est ordinairement de la couleur du corps & quelquefois d'un vert doré. Les élytres sont quelquefois d'une seule couleur, & quelquefois elles ont leur suture & une raie longitudinale courte, d'un vert brillant ou d'une couleur dorée brillante: on remarque sur les élytres des stries régulières, formées par des points enfoncés, qui vont se réunir deux à deux postérieurement. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses sont simples.

Il se trouve à la Jamaïque.

328. CHARANSON histronique.

CURCULIO histronicus.

Curculio brevirostris griseus, thorace lineis lateralis fulvis, elytris albis, maculis atris fulvisque. FAB. Gen. inf. mant. pag. 227. — Sp. inf. tom. 1. pag. 192. n^o. 177. — Mant. inf. tom. 1. p. 118. n^o. 233.

Il est grand. La tête est grisâtre. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet. Les antennes sont coudées. Le corcelet est grisâtre supérieurement, avec une ligne de chaque côté, large, fauve, & le bord blanc. Les élytres sont blanches, avec plusieurs taches élevées, noires, & deux autres oblongues, fauves. L'abdomen est blanchâtre, avec une rangée longitudinale de points noirs, de chaque côté. Les pattes sont cendrées, & les cuisses sont simples.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

329. CHARANSON de Rohr.

CURCULIO Rohrii.

Curculio brevirostris, elytris acuminatis griseis, margine bascos flavescente. FAB. Syst. ent. p. 151. n^o. 126. — Sp. inf. tom. 1. pag. 192. n^o. 178. — Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n^o. 234.

Il ressemble beaucoup pour la forme & la grandeur, au *Charanson* de Spengler. La trompe est noire, avec deux sillons à sa partie supérieure. Le corcelet est noirâtre, couvert d'une poussière blan-

che, avec les bords jaunâtres. Les élytres sont noires, terminées en pointe. Les pattes sont noires. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

330. CHARANSON famélique.

CURCULIO famelicus.

Curculio brevirostris niger, elytris punctato-striatis, apice acutis.

Il ressemble beaucoup, pour la forme & la grandeur, au *Charanson* de Spengler. Les antennes sont noires, coudées. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, unie à sa partie supérieure. Tout le corps est noir, plus foncé & plus luisant en-dessous qu'en dessus. Les yeux sont arrondis, très-noirs, peu saillans. Le corcelet est à peine raboteux. Les élytres ont des points enfoncés, très-marqués, rangés en stries; l'extrémité est terminée en pointe. Les pattes sont noires, & les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. Il est commun à la Guadeloupe, sur les fleurs.

331. CHARANSON imprimé.

CURCULIO impressus.

Curculio brevirostris niger thorace elytrisque punctis impressis albis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 126. & pl. 5. fig. 58.

Curculio impressus. FAB. Sp. inf. tom. 1. p. 192. n^o. 179. — Mant. inf. tom. 1. pag. 118. n^o. 235.

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au *Charanson* marginé. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est courte, assez grosse, avec deux lignes blanchâtres à sa base. La tête est noire, & les yeux sont un peu saillans. Le corcelet est noir, luisant, avec six petites taches enfoncées blanchâtres, deux petites de chaque côté & deux plus grandes vers le bord postérieur. L'écusson est petit, noir, arrondi, presque coupé postérieurement. Les élytres ont des stries peu marquées, formées par des points peu enfoncés, avec deux rangées de taches blanches, très-peu enfoncées. Le dessous du corps est noir, avec les côtés de l'abdomen un peu blanchâtres. Les pattes sont noires, sans taches. Les cuisses sont simples.

Il se trouve à la Jamaïque.

332. CHARANSON albigède.

Curculio albipes.

Curculio brevirostris, thorace angulato, niger; elytris tuberculatis basi apiceque cinereis, tibiis griseis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 9. fig. 102.

Il a environ dix lignes de long. Les antennes sont noires. La trompe est noire avec le tour des yeux grisâtre. Le corcelet a un angle peu saillant, de chaque côté. Il est caréné à sa partie supérieure, antérieurement, tuberculé, noir, avec la partie supérieure cendrée. Les élytres sont tuberculées, noires, cendrées à la base & à l'extrémité. Les pattes sont grisâtres, avec les tarses & la base des cuisses noirs. Les cuisses sont sans épines & sans dentelures.

Il se trouve à Madagascar.

333. CHARANSON riverain.

CURCULIO rivulosus.

Curculio brevisostri nigricans, thorace linea impressa maculisque cinereo rubescentibus, elytris striatis lineis tribus impressis cinereis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 133.

Il est un peu plus grand que le Charanson nébuleux, & il a la forme ovale arrondie du Charanson du Troène. Les antennes sont noirâtres, coudées, assez longues. La trompe est grosse, courte, noirâtre, avec un sillon assez large, longitudinal, à sa partie supérieure. La tête n'est guère plus large que la trompe; elle est noirâtre, avec les yeux noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est noirâtre, & il a une ligne longitudinale enfoncée, d'un gris rougeâtre à sa partie supérieure, une ligne transversale de chaque côté du bord antérieur, & une tache irrégulière de la même couleur, de chaque côté du bord postérieur. L'écusson est petit & grisâtre. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés: on y remarque trois lignes longitudinales, cendrées, un peu enfoncées, l'une placée vers le bord extérieur, & les deux autres plus rapprochées vers la suture: la ligne intermédiaire se divise vers le milieu & forme comme deux petites isles oblongues. Le dessous du corps est noir, & couvert de poils gris très-courts. Les pattes sont noirâtres & les cuisses sont simples.

Il se trouve aux Indes orientales.

334. CHARANSON verruqueux.

CURCULIO verrucosus.

Curculio brevisostri aneo-niger elevato punctatus elytris postice biverrucosis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 10. fig. 125.

Curculio verrucosus. LIN. Syst. nat. pag. 618. n° 90. — Mus. Lud. ulr. p. 60. n° 19.

Curculio verrucosus. FAB. Syst. ent. pag. 152. n° 129. — Sp. inf. tom. 1. pag. 193. n° 183. — Mant. inf. tom. 1. pag. 119. n° 241.

Curculio verrucosus. DRURY. Ill. of inf. t. 1. tab. 32. fig. 5.

Hist. nat. Insectes. Tome V.

Il est grand & oblong. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est noire, grosse, sillonnée, un peu étranglée à sa base. La tête est noire, lisse & arrondie, & les yeux ne sont pas saillans, mais sont entourés d'une ligne enfoncée. Le corcelet est noir, & tout couvert de points élevés arrondis. L'écusson est à peine apparent. Les élytres sont d'un noir bronzé; elles ont chacune trois stries formées par des points élevés assez gros, presque épineux: entre chaque strie, il y en a une autre de points élevés plus petits; l'extrémité est avancée & verruqueuse. Le dessous du corps & les pattes sont noirs, presque bronzés, les cuisses sont simples.

Il se trouve en Afrique.

335. CHARANSON fixrayé.

CURCULIO sexvittatus.

Curculio brevisostri niger, thorace elytrisque vittis sex albis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 12. fig. 149.

Il est grand, allongé, semblable au Charanson verruqueux. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est grosse, presque de la longueur du corcelet, sillonnée, noire, avec deux lignes longitudinales blanches, depuis la base jusqu'au milieu. La tête est arrondie, noire, avec quatre lignes blanches. Le corcelet est noir, chagriné, avec trois raies longitudinales blanches, de chaque côté. L'écusson est petit, noir, un peu marqué de blanc. Les élytres ont des sillons & des lignes saillantes crénelées; elles sont terminées en pointe; leur couleur est noire, avec trois raies longitudinales blanches sur chaque: entre chaque raie est une ligne un peu élevée & crénelée, & les raies sont un peu enfoncées, avec des points enfoncés. Le dessous du corps est mélangé de noir & de blanc. Les pattes sont noires avec un peu de blanc aux cuisses. Les cuisses sont simples.

Nota. Les raies blanches sont dues à de petites écailles imbriquées.

Il se trouve....

336. CHARANSON du Cap.

CURCULIO capensis.

Curculio brevisostri ater, thorace elevato punctato, coleoptris striis crenatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 5. fig. 52.

Curculio capensis. LIN. Syst. nat. pag. 618. n° 89. — Mus. Lud. ulr. p. 59. n° 18.

Curculio capensis. FAB. Syst. ent. pag. 152. n° 130. — Sp. inf. tom. 1. pag. 193. n° 184. — Mant. inf. tom. 1. pag. 119. n° 242.

Il varie pour la grandeur. Il est plus grand que le *Charanson* Jacchus. Les antennes sont noires & coudées. Tout le corps est noir, point du tout luisant, sans taches. La trompe est grosse, sillonnée, presque carrée, à peine plus courte que le corcelet, avec un étranglement bien marqué, à sa base. La tête est lisse & arrondie. Les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est arrondi & entièrement chagriné. L'écusson est imperceptible. Les élytres ont des stries, dans lesquelles il y a des points enfoncés : les lignes élevées entre chaque strie sont crénelées. Les pattes sont noires, & les cuisses sont simples.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

337. CHARANSON Veau.

CURCULIO Vitulus.

Curculio breviostris niger, fronte bidentato, elytris unispinosis. FAB. *Syst. ent. p. 152. n° 131.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 193. n° 185.* — *Mant. inf. tom. 1. p. 119. n° 243.*

Il est plus allongé que le *Charanson* du Cap. Les antennes sont noires & coudées. Tout le corps est noir, sans taches. La trompe est assez grosse & sillonnée. La tête est armée de deux petites cornes courtes, à la partie antérieure, qui semblent défendre les yeux. Les yeux sont arrondis, saillans, distincts. Le corcelet est raboteux & a deux petites élévations à sa partie antérieure. L'écusson est très-petit. Les élytres sont raboteuses; elles ont des points assez gros, irréguliers, enfoncés : entre le milieu & l'extrémité de chaque élytre, il y a une élévation arrondie, assez grande. Les pattes sont noires, & les cuisses sont simples.

Il se trouve à la Terre de Feu.

338. CHARANSON inégal.

CURCULIO inaequalis.

Curculio breviostris griseus, thorace inaequali antice prominulo, elytris sulcatis postice bidentatis, rostro trifurco. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 1. fig. 164.*

Curculio inaequalis. FAB. *Sp. inf. tom. 1. p. 193. n° 186.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 119. n° 244.*

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont coudées, ferrugineuses, brunes, avec le premier article noir. Tout le corps est d'un gris obscur. La trompe est courte, assez grosse, avec trois sillons longitudinaux, à sa partie supérieure. Le corcelet est très-raboteux; il a un sillon inégal, au milieu, & il avance un peu antérieurement sur la tête. Les élytres sont raboteuses; elles ont chacune trois lignes longitudinales élevées, crénelées, presque épineuses, & au-delà du milieu, on voit sur la ligne interne, une élévation assez grosse. Les pattes

sont chagrinées, cendrées, obscures, & elles ont quelques poils gris, courts, assez gros. Les cuisses sont sans épines & sans dentelures.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

339. CHARANSON aigu.

CURCULIO acuminatus.

Curculio breviostris cylindricus fuscus, elytris apice acuminatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 11. fig. 139.*

Curculio acuminatus. FAB. *Syst. ent. pag. 152. n° 132.* — *Sp. inf. t. 1. p. 194. n. 189.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 119. n° 247.*

Ce *Charanson* est étroit & allongé. Les antennes sont noirâtres & coudées. Tout le corps est d'un brun plus ou moins foncé. La trompe est courte. La tête est cylindrique & très-longue. Les yeux sont noirs, arrondis, peu saillans. Le corcelet est mince, long & cylindrique. L'écusson est très-petit. Les élytres sont régulièrement striées, & dans chaque strie il y a des points enfoncés; elles sont terminées chacune par une pointe aiguë assez longue. Les pattes sont ferrugineuses, brunes, & les cuisses sont simples.

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande.

340. CHARANSON emmufelé.

CURCULIO capistratus.

Curculio breviostris fuscus, elytris acuminatis renato striatis, rostro sulcato. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 120. n° 248.*

Il est plus grand que le *Charanson* du Cap. La trompe est courte, grosse, noire, marquée de plusieurs sillons. Les antennes sont coudées, d'un brun noirâtre. Le corcelet a plusieurs petits tubercules élevés. Les élytres sont pointues & marquées de plusieurs lignes fortement crénelées. Le dessous du corps & les pattes sont noirs.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

341. CHARANSON émérite.

CURCULIO emeritus.

Curculio breviostris niger, thorace elytrisque spinosis, fronte excavata. LIN. *Syst. nat. pag. 617. n° 87.* — *Mus. lud. ulr. n° 56.*

Curculio emeritus. FAB. *Syst. ent. p. 152. n° 133.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 194. n° 190.* — *Mant. inf. tom. 1. pag. 120. n° 249.*

Il est assez grand, d'un noir obscur. La trompe est courte raboteuse. La partie supérieure de la tête a deux petits enfoncemens. Les antennes sont courtes, en masse. Au dessus des yeux on voit une ligne

élevée. Le corcelet est presque arrondi, muni d'une épine de chaque côté, avec un enfoncement à sa partie supérieure. Les élytres sont couvertes de tubercules verruqueux, poileux; elles ont un avancement conique, pointu, avancé de chaque côté de la base. Les cuisses sont simples.

Il se trouve aux Indes orientales.

342. CHARANSON crispé.

CURCULIO crispatus.

Curculio brevirostris, thorace mutico scabro, elytris lineis tribus elevatis dentatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 160.

Curculio crispatus. FAB. Sp. inf. t. 1. pag. 194. n°. 192. — Mant. inf. tom. 1. pag. 120. n°. 252.

Il est plus grand que le Charanson du Cap. Tout le corps est noirâtre, sans taches. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, sillonnée, un peu raboteuse. La tête est un peu raboteuse, & elle a un léger sillon à la partie supérieure. Les yeux sont petits & point saillans. Le corcelet est raboteux, couvert de points élevés, avec un sillon longitudinal, au milieu. L'écusson est petit, triangulaire & grisâtre. Les élytres sont raboteuses; elles ont chacune six lignes élevées, formées par des tubercules distincts: trois sont plus élevées, & elles sont placées alternativement. Les pattes sont noirâtres. Les cuisses sont simples.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

343. CHARANSON tranchant.

CURCULIO cultratus.

Curculio brevirostris, thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis postice cinereis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 157.

Curculio cultratus. FAB. Syst. ent. p. 153. n°. 136. — Sp. inf. tom. 1. pag. 195. n°. 196. — Mant. inf. tom. 1. p. 120. n°. 256.

Il est de la grandeur du Charanson de la Patience. Les antennes sont noires & coudées. La trompe est courte, assez grosse & noire. La tête est arrondie & couverte d'une poussière roussâtre. Le corcelet est chagriné, avec deux tubercules élevés, latéralement comprimés, placés l'un à côté de l'autre, à la partie antérieure; il est noir avec un peu de poussière roussâtre, sur le bord antérieur. L'écusson est petit, arrondi & relevé. Les élytres ont des stries crenclées & six tubercules élevés; quatre à la partie antérieure, sur une ligne transversale, & un au-delà du milieu de chaque côté de la suture; elles sont noires, avec la partie postérieure roussâtre. Le dessous du corps & les

pattes sont noirs & couverts d'une poussière roussâtre. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande.

344. CHARANSON tribule.

CURCULIO tribulus.

Curculio brevirostris cinereus, thorace scabro antice impresso, elytris spinosis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 161.

Curculio tribulus. FAB. Syst. ent. p. 153. n°. 138. Sp. inf. tom. 1. pag. 195. n°. 198. — Mant. inf. tom. 1. p. 120. n°. 258.

Il n'est gueres plus grand que le Charanson du Troène. Les antennes sont cendrées, coudées: le premier article est long, & les autres sont un peu poileux. La trompe est noire, sillonnée, plus grosse à son extrémité & gueres plus courte que le corcelet. La tête est arrondie. Les yeux sont oblongs, point saillans, entourés d'une ligne blanchâtre. Le corcelet est arrondi & raboteux. Les élytres sont raboteuses, & ont chacune trois rangées d'épines assez grosses & courtes: il y en a une de chaque côté de la suture, vers la partie postérieure, une fois plus longue que les autres. Tout le dessus du corps est cendré, obscur; le dessous est cendré, un peu plus clair que le dessus. Les pattes sont cendrées, & les cuisses sont simples.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

345. CHARANSON quadrident.

CURCULIO quadridens.

Curculio brevirostris cinereus, thorace scabro, elytris spinosis spinis quatuor posticis longioribus. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 15. fig. 187.

Curculio quadridens. FAB. Syst. ent. pag. 153. n°. 139. — Sp. inf. tom. 1. pag. 196. n°. 200. — Mant. inf. tom. 1. pag. 120. n°. 260.

Il est de la grandeur du Charanson tribule. Les antennes sont coudées & cendrées. Tout le corps est cendré. La trompe est sillonnée, un peu plus courte que le corcelet. La tête est arrondie, & les yeux ne sont pas saillans. Le corcelet est arrondi, raboteux. L'écusson est arrondi, à peine apparent. Les élytres sont raboteuses; elles ont chacune trois rangées de tubercules petits & élevés, & vers la partie postérieure, ces rangées sont terminées par deux tubercules plus gros, plus élevés sur chaque élytre. Le dessous du corps & les pattes sont gris. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

346. CHARANSON quadriépineux.

CURCULIO quadrispinosus.

Curculio brevirostris albidus, elytris quadrispinosis. Z z z

nohis, rostro fusco. FAB. *Gen. inf. mant. pag. 128.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 196. n°.* 201. — *Mant. inf. tom. 1. p. 121. n°.* 261.

Il est plus petit que le *Charanson* quadrident. La trompe est courte, canaliculée, obscure. Le corcelet est arrondi, blanchâtre, sans taches; la partie supérieure est unie. Les élytres sont blanchâtres, & ont quatre épines élevées très-fortes, une à la base, deux au milieu, & la quatrième vers l'extrémité. Les pattes sont blanchâtres, & les cuilles sont simples.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

347. CHARANSON clavellé.

CURCULIO clavus.

Curculio brevirostris albicans, thorace canaliculato; coleoptris spinosis, lineolis tribus baseos rubris. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 162.

Curculio clavus. FAB. *Syst. ent. pag. 154. n°.* 140. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 196. n°.* 202. — *Mant. inf. tom. 1. p. 121. n°.* 262.

Il ressemble au *Charanson* tribulé, mais il est un peu plus grand. Tout le corps est d'une couleur grise blanchâtre, due à une poussière écailleuse imbriquée. Les antennes sont coudées & cendrées. La trompe est assez grosse, plus courte que le corcelet; elle a au milieu une petite ligne longitudinale élevée. La tête est arrondie, & les yeux sont noirs, point du tout saillans. Le corcelet est arrondi, un peu raboteux; il a un sillon assez profond, couvert d'une poussière écailleuse rougeâtre, le long de sa partie supérieure. Les élytres ont des stries de points enfoncés, avec trois rangées chacune de petites épines: la première épine de la rangée externe & la dernière de la rangée interne sont plus grosses & plus longues que les autres; on remarque une tache oblongue rougeâtre, de chaque côté, & une autre commune sur la suture, à la base des élytres. Le dessous du corps & les pattes sont blanchâtres. Les cuilles sont simples.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande.

348. CHARANSON noduleux.

CURCULIO nodulosus.

Curculio brevirostris, thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 15. fig. 188.

Curculio nodulosus. FAB. *Syst. ent. pag. 154. n°.* 141. — *Sp. inf. tom. 1. pag. 196. n°.* 203. — *Mant. inf. tom. 1. pag. 121. n°.* 263.

Il ressemble un peu par la forme & la grandeur, au *Charanson* tribulé. Tout le corps est d'une couleur cendrée obscure. Les antennes sont coudées. La trompe est sillonnée sur les côtés; elle est grosse & de la longueur du corcelet. Le cor-

celet est arrondi, & a six rangées longitudinales d'élevations arrondies, noires, & semblables à de petits boutons. L'écusson est petit, triangulaire & grisâtre. Les élytres ont plusieurs rangées de tubercules élevés, dont les postérieurs sont épineux: à la base de chaque élytre, on remarque une élévation plus grosse, plus arrondie que les autres; l'extrémité des élytres est un peu pointue. Les pattes & le dessous du corps sont obscurs. Les cuilles sont simples.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

349. CHARANSON rubifère.

CURCULIO rubifer.

Curculio brevirostris cinereus, thorace scabro, elytris spinis elevatis sanguineis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 13. fig. 159.

Curculio rubifer. FAB. *Syst. ent. append. p. 822.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 196. n°.* 204. — *Mant. inf. tom. 1. pag. 121. n°.* 264.

Il est presque une fois plus grand que le *Charanson* du Cap. Le dessus du corps est d'une couleur cendrée obscure, & le dessous est d'un gris blanchâtre. Les antennes sont noirâtres & coudées. La trompe est grosse, de la longueur du corcelet, avec une ligne longitudinale peu élevée, peu marquée, à sa partie supérieure. La tête est arrondie, & les yeux sont noirs & point saillans. Le corcelet est couvert de points élevés arrondis, d'un rouge de grenat; le milieu a un large sillon couvert d'une poussière écailleuse grise. L'écusson est petit, triangulaire, gris. Les élytres sont couvertes de tubercules arrondis, un peu épineux postérieurement, d'un rouge de grenat; l'extrémité de chaque élytre est terminée en pointe aiguë. Les bords latéraux du corcelet & des élytres sont gris. Les pattes sont grises, & les cuilles sont simples.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

350. CHARANSON globulifère.

CURCULIO globifer.

Curculio brevirostris, thorace scabro, elytris spinosis, postice acuminatis. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 11. fig. 135.

Curculio globifer. FAB. *Syst. ent. append. p. 823.* — *Sp. inf. tom. 1. pag. 196. n°.* 205. — *Mant. inf. tom. 1. p. 121. n°.* 265.

VOET. *Coleopt. pars 2. tab. 38. fig. 27.*

Il ressemble au *Charanson* verruqueux, mais il est plus grand. Les antennes sont noirâtres & coudées. La trompe est noire, grosse, presque carrée, plus renflée à sa base, un peu plus courte que le corcelet. La tête est arrondie, noire, couverte de poils roussâtres. Le corcelet est arrondi & couvert de tubercules élevés, arrondis, noirs: il a un sillon longitudinal, au milieu, grisâtre, & au mi-

lieu du sillon, on aperçoit une petite ligne sail-
lante. Les élytres sont couvertes de tubercules éle-
vés arrondis, dont quelques uns plus élevés, ran-
gés en stries longitudinales; elles sont cendrées ob-
scurés, avec la suture, une ou deux raies longi-
tudinales & les bords extérieurs, d'un gris blan-
châtre; l'extrémité de chaque élytre est avancée
& presque verruqueuse. Le dessus du corps est cou-
vert d'une poussière écailleuse blanchâtre. Les pat-
tes ont quelques écailles à poils courts cendrés.
Les cuisses sont simples.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

351. CHARANSON pillulaire.

CURCULIO pillularius.

Curculio brevis *striis*, thorace utrinque spinoso
noduloso, elytris tuberculato-striatis apice acumi-
natis. FAB. Mant. inf. tom. 1. pag. 121. n°. 265.

Il ressemble beaucoup au Charanson globulifère.
La trompe est unie en-dessus & renflée à son ex-
trémité. Le corcelet est épineux de chaque côté,
noir, couvert de petits tubercules arrondis, très-
élevés, lisses. Les élytres sont noires, terminées
en pointe, couvertes de petits tubercules très-éle-
vés, presque épineux. Le dessous du corps & les
pattes sont noirs, les cuisses sont simples.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

352. CHARANSON frontal.

CURCULIO frontalis.

Curculio brevis *striis* ater, fronte retusa, thorace
elytrisque tuberculato-seriatis. LIN. Syst. nat. edit.
13. p. 1791.

SPARM. nov. act. Stockh. 1785. 1. n°. 4. p. 43.
n°. 14.

Il ressemble aux précédens. Le corcelet a qua-
tre rangées de tubercules élevées. Les élytres ont
chacune trois rangées de tubercules coniques.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

353. CHARANSON court.

CURCULIO brevis.

Curculio brevis *striis* subfuscus, elytris griseis:
striis atris glabris elevatis abbreviatis.

Curculio abbreviatus. LIN. Syst. nat. pag. 618.
n°. 94. — Mus. Lud. Ulr. p. 62.

GRON. Zooph. 597.

Il est de la grandeur du Charanson du Pin. La
trompe est courte, déprimée, cendrée, presque de la
longueur du corcelet. Le corcelet est presque ovale,
noir, avec des points enfoncés, grisâtres; le des-
sous est grisâtre. Les élytres sont convexes, cou-

vertes d'une poussière écailleuse grisâtre, avec
la suture, le rebord & quelques lignes lon-
gitudinales élevées, courtes, noires. Les pattes
sont ferrugineuses. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

354. CHARANSON indérien.

CURCULIO inderiensis.

Curculio brevis *striis* griseus, thorace utrinque mu-
cronato, elytris punctato-striatis.

Curculio inderiensis brevis *striis*, apterus ovatus,
opalino-albus, thorace utrinque mucronato, elytris
excavato punctatis. PALL. Inj. sib. pag. 26. n°. 5.
tab. 8. fig. 5.

Curculio inderiensis. PALL. Itin. 1. app. pag. 464.
n°. 36.

Curculio albicans. LEPECH. Itin. russ. 1. pag. 503.
tab. 16. fig. 5.

Curculio inderiensis. LIN. Syst. nat. edit. 13.
p. 1796.

Il a environ sept lignes de long & trois de
large. La trompe est courte, grosse, presque quar-
rée. Les antennes sont coudées, mais le premier
article est court. Tout le corps est d'un gris blan-
châtre. Le corcelet est couvert de petits points
élevés, il est armé de chaque côté d'une spine
aiguë, un peu courbée postérieurement. Les ély-
tres sont réunies, & elles ont des points enfoncés,
assez grands, rangés en stries. Les ailes manquent.
L'abdomen a deux rangées de points noirs. Les
pattes sont de la couleur du corps, & les cuisses
sont simples.

Il se trouve dans la Sibérie, près le Lac indé-
rien.

355. CHARANSON nomade.

CURCULIO nomas.

Curculio brevis *striis* albicans, thorace scabro,
elytris lituris obliquis fuscis.

Curculio nomas crassirostris, dealbatus, rostro
biporcato, thorace scaberrimo, elytris fusco oblique
lituratis. PALL. Inj. sib. pag. 27. n°. 6. tab. B. f. 6.

Curculio nomas. PALL. Itin. 1. app. pag. 463.
n°. 31.

Curculio nomas. LIN. Syst. nat. edit. 13.
pag. 1796.

Il ressemble beaucoup au Charanson nébuleux
& sulcirostre, mais il est un peu plus grand. La
trompe est grosse, presque de la longueur du cor-
celet, avec deux élévations longitudinales à la par-
tie supérieure. Tout le corps est blanchâtre. Le
corcelet est raboteux, presque muriqué, noirâtre

au milieu, avec les côtés blanchâtres ; il est enfoncé & un peu avancé postérieurement. Les élytres ont deux bandes obliques, obscures, quelques points élevés vers la base, & des stries formées par des points enfoncés. Les ailes sont jaunâtres. L'abdomen a quatre rangées de points noirs, luisans. Les pattes sont blanchâtres. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans les déserts arides de la Russie méridionale, près de la mer Caspienne.

356. CHARANSON candidat.

CURCULIO candidatus.

Curculio brevirostris, albo fuscoque nebulosus, thoracis dorso cinereo, linea punctisque duobus niveis.

Curculio candidatus crassirostris alba nebulosus, rostro stria trifurca, thoracis dorso cinereo, linea punctisque duobus niveis. PALL. *Inf. sib. pag. 28. n^o. 7. tab. B. fig. 7.*

Curculio candidatus. PALL. *Itin. 1. app. p. 463. n^o. 32.*

Curculio candidatus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1796.*

Il est un peu plus épais que le *Charanson* fulcirostre. Tout le dessus du corps est mélangé de blanc & de cendré, le dessous est d'un blanc sans taches. La trompe est courte, marquée de trois lignes élevées, qui se réunissent sur le front. Le corcelet a une ligne blanche, au milieu, une tache de chaque côté, postérieure, une petite ligne moins distincte, & un point latéral blanc. Les élytres sont striées. Les pattes sont de la couleur du corps & les cuisses sont simples.

Il se trouve dans les déserts de la Russie méridionale, près de la mer Caspienne.

357. CHARANSON arrosé.

CURCULIO roridus.

Curculio brevirostris albicans, supra lituris punctisque elevatis nigris, rostro porcato.

Curculio roridus crassirostris, apterus, rufescente albus, supra lituris punctisque subverrucosis nigris, porco rostri longitudinali. PALL. *Inf. sib. pag. 28. n^o. 8. tab. B. fig. 8.*

Curculio roridus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1796.*

Il ressemble au *Charanson* fulcirostre. La trompe est grosse, courte ; blanchâtre, marquée à sa partie supérieure, d'une ligne longitudinale, élevée, noire. Les antennes sont coudées, obscures, blanchâtres à leur extrémité. La tête est obscure, blanchâtre à sa partie postérieure. Tout le dessus du

corps est blanchâtre, avec des taches irrégulières obscures. Le corcelet a des points noirs, arrondis, élevés. Les élytres ont des points semblables, depuis la base jusqu'au milieu ; elles sont réunies & ont des stries peu-marquées. Le dessous du corps & les pattes sont blanchâtres & parsemées de points obscurs. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans la Russie méridionale, vers le Volga.

358. CHARANSON *Cenchrus*.

Curculio Cenchrus.

Curculio brevirostris albicans, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis, nigro punctatis, rostro porcato.

Curculio Cenchrus crassirostris dealbatus, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis, nigroque punctatis, rostro uniporcato. PALL. *Inf. sib. p. 29. n^o. 9. tab. B. fig. 9.*

Curculio Cenchrus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1796.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur au *Charanson* fulcirostre. La trompe est grosse, presque de la longueur du corcelet, blanchâtre, avec une ligne longitudinale élevée, noire, à la partie supérieure. Les antennes sont blanches, coudées. Le corcelet a quatre lignes longitudinales élevées, d'un blanc obscur. Les élytres ont des lignes cendrées, inégales, confluentes, pointillées de noir, & des stries à peine visibles, sous le duvet qui couvre les élytres : on aperçoit quelques points élevés noirs. Le dessous du corps & les pattes sont noirs.

Il se trouve dans la Russie méridionale, près du Volga.

359. CHARANSON quadrilinée.

CURCULIO tetragrammus.

Curculio brevirostris cinereus, thorace fusco lineis quatuor albis, elytris lituris quatuor nigris.

Curculio tetragrammus crassirostris, apterus, cinerascens, thorace fusco, lineis quatuor laetis, elytrorum lituris quatuor nigris. PALL. *Inf. sib. pag. 29. tab. B. fig. 10.*

Curculio brevirostris, thorace scabio, elytris nebulosis, punctis duobus prope apicem nigris, nitidis. LEPECH. *Itin. russ. 2. app. pag. 329. tab. 11. fig. 28.*

Curculio tetragrammus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1797.*

Il est de la grandeur du *Charanson* nébuleux. La trompe est grosse, presque de la longueur du corcelet, d'un gris roussâtre, avec une ligne longitudinale élevée noire. Le corcelet est obscur,

marqué de points enfoncés & de quatre lignes longitudinales blanches. Les élytres sont réunies, un peu pointues à leur extrémité, cendrées, avec des points enfoncés, rangés en stries, une petite tache noire, vers la base, & une ligne presque longitudinale, de la même couleur, vers l'extrémité. Le dessous du corps est d'un blanc roussâtre. Les pattes sont blanchâtres. Les cuisses sont simples; les quatre postérieures ont extérieurement deux points obscurs.

Il se trouve dans les déserts arides de la Russie méridionale, près du Volga.

360. CHARANSON rayure-noire.

CURCULIO nigrivittis.

Curculio brevirostris albicans, thorace utrinque vittata nigra, rostro carinato.

Curculio nigrivittis brevirostris cylindraceus, dealbatus, capite thoraceque subcarinatis, fascia utrinque longitudinali fusca. PALL. *Inf. sib. pag. 31. tab. B. fig. 12.*

Curculio nigrivittis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1797.*

Il est de la grandeur du Charanson sulcirostre, mais un peu plus étroit. La trompe est courte, grosse, un peu plus mince vers l'extrémité, blanche, carenée, noirâtre de chaque côté. Le corcelet est blanc, presque cylindrique, avec une ligne longitudinale, noire de chaque côté, & une autre élevée, noire, à la partie supérieure. Les élytres sont blanchâtres & marquées de stries, dans lesquelles on aperçoit de petits points enfoncés, obscurs. Le dessous du corps & les pattes sont blanchâtres. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans les déserts arides de la Russie méridionale.

361. CHARANSON marqué.

CURCULIO vibex.

Curculio brevirostris cylindricus albus thorace elytrisque utrinque vittata nigra.

Curculio vibex brevirostris cylindraceus albissimus, striga utrinque nigra per thoracem elytraque longitudinali. PALL. *Inf. sib. pag. 31. tab. B. fig. 13.*

Curculio vibex. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1797.*

Il a environ quatre lignes de long, & il est presque d'une forme cylindrique. La trompe est grosse, presque de la longueur du corcelet. Tout le corps est blanchâtre, avec une ligne longitudinale noire, de chaque côté du corcelet & des élytres. Les élytres sont un peu pointues à leur extrémité, & ont des stries pointillées. Les pattes sont simples.

Il se trouve à Sélinga, dans la Tartarie russe.

362. CHARANSON fenestré.

CURCULIO fenestratus.

Curculio brevirostris albus, elytris maculis sex rhombeis fuscis.

Curculio fenestratus crassirostris apterus albatus elytrorum maculis sex rhombeis fuscis. PALL. *Inf. sib. pag. 33. tab. H. fig. B. 16.*

Curculio fenestratus. LIN. *Syst. nat. pag. 1797.*

Il est un peu plus petit que le Charanson nébuleux. La trompe est courte, blanchâtre, anguleuse, carenée à la partie supérieure. Le corcelet est bleu en-dessous, & sur les côtés, à la partie supérieure, avec une tache obscure, de chaque côté de la partie postérieure, & quelques points noirs enfoncés. Les élytres sont réunies, striées, d'un blanc pâle, grisâtres à leur base, avec deux taches carrées obliquement parallèles, noirâtres, & une petite ligne presque longitudinale vers l'extrémité. Le dessous du corps & les pattes sont blanchâtres, pointillées de noir. Les côtés de la poitrine & les bords des anneaux de l'abdomen sont un peu roussâtres. Les pattes & sur-tout les postérieures sont assez grosses.

Il se trouve à Sélinga, dans la Tartarie russe.

363. CHARANSON tête-jaune.

CURCULIO flaviceps.

Curculio brevirostris albicans capite flavescente, thorace elytrisque albo lineatis fusco interruptis.

Curculio flaviceps crassirostris, apterus albus: capite flavescente lateribus rufis, thorace elytrisque albo-lineatis, fusco interruptis. PALL. *Inf. sib. pag. 34. tab. B. fig. 17.*

Curculio brevirostris corpore cano, elytris sulcatis, nigro maculatis. LEPECH. *Itin. 2. app. pag. 327. tab. 11. fig. 27.*

Curculio flaviceps. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1797.*

Il a près de six lignes de long. La trompe est courte, blanchâtre, marquée de deux sillons & d'une ligne élevée, noire, au milieu. La tête est jaunâtre en-dessus, & fauve sur les côtés. Le corcelet est marqué de six lignes blanches, & de six lignes obscures, alternes. Les élytres sont réunies, blanches, sillonnées, avec la suture & l'intervalle des sillons, élevés: on aperçoit quelques points obscurs, dans les sillons. L'abdomen est blanchâtre, avec une raie longitudinale obscure. Les pattes sont blanches, pointillées; les postérieures sont un peu plus grandes que les autres.

Il se trouve dans la Russie méridionale, près Sélinga, & rarement dans les déserts de la Tartarie.

364. CHARANSON peint.

CURCULIO pictus.

Curculio brevirostris albus, thorace lineis tribus, elytris fascia arcuata, fuscis.

Curculio pictus crassirostris, albatius, thorace fasciis tribus longitudinalibus, elytrorum arcuata, fuscis. PALL. *Inf. sib. pag. 35. tab. H. fig. B. 18.* — *Itin. 1. app. pag. 463. n.º. 33.*

Curculio pictus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1797.*

Il est de la grandeur du précédent, mais il a une forme plus allongée. Tout le corps est blanc. La trompe est courte, grosse, munie d'une ligne longitudinale élevée. La tête est d'un blanc rouffâtre. Le corcelet a une large raie longitudinale obscure, au milieu, & une autre de chaque côté, de la même couleur. Les élytres sont légèrement striées; elles ont une petite ligne & quatre points obscurs, une bande arquée, vers le milieu.

Il se trouve dans les déserts arides de la Russie méridionale, & près le Lac Indérien.

365. CHARANSON yeux-noirs.

CURCULIO hololeucus.

Curculio brevirostris, subcylindricus albus immaculatus, oculis atris.

Curculio hololeucus crassirostris, subcylindræus: totus dealbatus, immaculatus, oculis atris. PALL. *Inf. sib. pag. 35. tab. H. fig. B. 19.*

Curculio hololeucus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1797.*

Il a environ cinq lignes de long, & il a une forme un peu allongée. Tout le corps est d'une couleur blanchâtre, sans taches. La trompe est grosse & marquée supérieurement d'une ligne longitudinale élevée. Les élytres ont des points enfoncés, peu marqués, rangés en stries; l'extrémité est un peu terminée en pointe. Les pattes sont blanches; les antérieures sont un peu plus grandes que les autres. Les cuisses sont simples.

Il se trouve dans les déserts de la Russie méridionale.

366. CHARANSON ténébrioïde.

CURCULIO tenebrioïdes.

Curculio brevirostris apterus ater glaber, elytris levigatis.

Curculio tenebrioides sublongirostris, apterus, aterrimus glaber, elytris levigatis. PALL. *Inf. sib. pag. 36. tab. B. fig. 20.*

SCHAEFF. *Icon. inf. tab. 62. fig. 11.*

FRISCH. *Inf. 13. p. 28. tab. 26. 2*

Curculio tenebrioïdes. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1798.*

Il a huit lignes de long, 'depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est grosse, un peu plus courte que le corcelet. Tout le corps est très-noir, un peu luisant. Les yeux sont ovales, point du tout faillans. Le corcelet est finement pointillé. Les élytres sont ovales, lisses. Les pattes sont simples.

Il se trouve dans la Russie méridionale, en Allemagne, dans les provinces méridionales de la France.

367. CHARANSON ténébreux.

CURCULIO tenebricosus.

Curculio brevirostris niger nitidus, thorace rotundato scabro, elytris connatis striato-punctatis.

Curculio tenebricosus niger nitidus, oculis fuscis elytris connatis acuminatis excavato-punctatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1798.*

Curculio tenebricosus. FUESL. *Archiv. p. 81. n.º. 67. tab. 24. fig. 27.*

Il a environ six lignes de long, & il ressemble un peu au *Charanson* perlé. Tout le corps est très-noir & un peu luisant. La trompe est courte, un peu chagrinée. Les antennes sont coudées, de la longueur du corcelet. Les yeux sont petits, arrondis, peu faillans. Le corcelet est arrondi, chagriné. Les élytres sont ovales, réunies, avec quelques petits points enfoncés; réunis, peu marqués, rangés en stries. Les cuisses sont simples, un peu renflées.

Il se trouve en France, en Allemagne, à Berlin.

368. CHARANSON fabricant.

CURCULIO faber.

Curculio brevirostris niger, antennis fuscis, elytris connatis, punctorum excavatorum seriebus octo.

Curculio faber. FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 81. n.º. 68. tab. 24. fig. 28.*

Curculio faber. LIN. *Syst. edit. 13. pag. 1799.*

Il a près de quatre lignes de long. Tout le corps est noir. Les antennes sont coudées, de la longueur du corcelet. La trompe est courte, large. Les élytres ont chacune huit stries pointillées. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Allemagne.

369. CHARANSON majeur.

CURCULIO major.

Curculio brevirostris niger cinereo villosus, thorace punctato rugoso, elytris punctato-striatis.

Curculio major niger albido villosus, thorace punctato rugoso rostrum aquante, elytris punctato-striatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1799.*

Curculio major. FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 81. n° 69. tab. 24. fig. 29.*

Il a près de neuf lignes de long. Tout le corps est noir & couvert d'un léger duvet cendré. La trompe est grosse, presque de la longueur du corcelet. Les antennes sont coudées. Le corcelet est pointillé, raboteux. Les élytres ont des stries pointillées.

Il se trouve en Allemagne.

370. CHARANSON globuleux.

CURCULIO globatus.

Curculio brevirostris fuscus, elytris globosis, vittis cinereis maculisque bifoveatis albis.

Curculio globatus. FUESL. *Archiv. inf. 5. p. 83. n° 76. tab. 24. fig. 32.*

Curculio globatus capite thoraceque fuscescentibus subaneis, thoracis margine arcubusque duobus mediis longitudinalibus cinereis, abdomine subgloboso, elytris connatis punctato-striatis: interstitiis fasciis alternis cinereis & fuscescentibus maculisque obsolete albidis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1799.*

Il a environ trois lignes de long. La trompe est courte, obscure. Le corcelet est obscur, un peu bronzé, avec deux lignes longitudinales arquées, cendrées, à la partie supérieure, & les bords extérieurs cendrés. Les élytres sont globuleuses, réunies, obscures, avec des stries pointillées, des lignes longitudinales cendrées, & quelques taches blanchâtres peu marquées.

Il se trouve à Berlin.

371. CHARANSON singulier.

Curculio singularis.

Curculio subbrevirostris cinereus elytris striis punctatis: punctis excavatis centro eminentibus. LIN. *Syst. nat. add. pag. 1066.*

Il est de grandeur moyenne. Le corps est cendré. La trompe est un peu plus courte que le corcelet. Les élytres sont légèrement striées. Les stries sont formées par des points enfoncés, & chacun de ces points en porte un autre petit élevé. Les cuisses sont un peu renflées.

Il se trouve en Portugal.

372. CHARANSON américain.

CURCULIO noveboracensis.

Hist. Nat. des Insectes. Tom. V.

Curculio brevirostris canus, elytris striis quinque albidis nigro punctatis, scutello flavicante.

Curculio noveboracensis brevirostris muticus, canus, elytris subfastigiatis, striis quinque albidis nigro punctatis, scutello flavicante. FORST. *Nov. spec. inf. pag. 35. n° 35.*

Curculio noveboracensis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1798.*

Il a environ sept lignes de long. Tout le corps est couvert d'écaillés blanchâtres. La trompe est grosse, marquée d'une ligne longitudinale noire, au milieu de sa partie supérieure. Les yeux sont noirâtres, entourés de poils roussâtres. Le corcelet est arrondi. L'écusson est jaunâtre. Les élytres sont convexes, oblongues, avec des stries pointillées & dix lignes longitudinales de petits points noirs.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

373. CHARANSON grifette,

CURCULIO humilis.

Curculio brevirostris rufus, capite nigricante elytris punctato-striatis.

Curculio rufus, subvillosus, capite nigricante, rostro thorace brevior. GEOFF. *Inf. t. 1. p. 284. n° 15.*

Le Charanson grifette. GEOFF. *Ib.*

Curculio modestus. FOURC. *Ent. par. 1. pag. 120. n° 15.*

Curculio nitidulus. SCHRANK. *Enum. inf. auct. no. 206.*

Il a environ une ligne & demie de long. La trompe est grosse, courte. La tête est noirâtre. Le corcelet est irrégulièrement pointillé, roussâtre. Les élytres sont roussâtres, & ont chacune dix stries formées par des points enfoncés. Tout le corps, vu à la loupe, paroît couvert de poils clair-semés.

Il se trouve aux environs de Paris.

374. CHARANSON téréticolle.

CURCULIO tereticollis.

Curculio brevirostris oblongo-ovatus, capite thoraceque cylindricis, elytris cinereis nigro lituratis.

Curculio tereticollis brevirostris, antennis fractis pedibusque rufis, femoribus muticis, capite cylindrico, corpore oblongo griseo-cinereo. DEG. *Mém. inf. t. 5. pag. 246. n° 33.*

Charanson gris à tête cylindrique, à courte trompe, à antennes coudées, rouffes & à cuisses simples, à corps oblong, d'un gris cendré, à pattes rouffes & à tête cylindrique. DEG. *Ib.*

Curculio tereticollis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1795.*

Curculio tereticollis. BONSD. *Hist. curc. suec.* pag. 28. no. 14. tab. fig. 14.

Il a environ trois lignes de long. La trompe est courte, mince, cendrée. Les yeux sont noirs, globuleux, peu saillans. Les antennes sont fauves, coudées, une fois plus longues que la tête. Le corcelet est cylindrique, beaucoup plus étroit que les élytres, obscur à sa partie supérieure, plus pâle sur les côtés. Les élytres ont des stries pointillées; elles varient beaucoup pour les couleurs: tantôt elles sont cendrées, avec un point postérieur, & une bande peu marquée, obscurs; tantôt elles sont plus obscures à la partie supérieure, avec des points & des lignes divergentes, inégales, noires: elles sont cendrées sur les côtés & pâles postérieurement, avec une bande obscure, oncée, peu marquée. La poitrine & l'abdomen sont blancs. Les pattes sont d'un jaune pâle, & les cuisses sont simples.

Il se trouve en Suède.

375. CHARANSON linéelle.

CURCULIO lineellus.

Curculio breviostris, oblongus, cinereo-fuscus, thorace striis tribus pallidioribus, elytris utrinque linea longitudinali albida. BONSD. *Hist. curc. suec.* pag. 30. n°. 17. tab. fig. 18.

Curculio cinereus fasciis longitudinalibus dilutionibus. LIN. *Faun. suec. edit. 1. n°. 472. edit. 2. p. 546. n°. 2274.*

Curculio lineellus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1795.*

Il n'a gueres plus d'une ligne de long. La trompe est courte, largement sillonnée. Les yeux sont globuleux, d'un brun noirâtre. Les antennes sont fauves, coudées, de la longueur de la tête. Le corcelet est cylindrique, obscur en-dessus, avec trois lignes longitudinales pâles, dont une au milieu, une de chaque côté. Les élytres sont d'une couleur cendrée, obscure, avec une ligne longitudinale blanchâtre, au milieu, qui va se joindre à la ligne latérale du corcelet: on apperçoit sur chaque élytre dix stries pointillées. La poitrine & l'abdomen sont cendrés. Les cuisses sont simples, d'un brun noirâtre. Les jambes sont fauves, & les tarses bruns.

Il se trouve au nord de l'Europe.

376. CHARANSON tronçonné.

CURCULIO trunculus.

Curculio breviostris, ater, abdomine subglobofo, rostro brevissimo, antennis pedibusque rufis. BONSD. *Hist. curc. suec.* pag. 33. n°. 22. tab. fig. 23.

La trompe est courte, mince, tronquée. Les antennes sont fauves, un peu plus longues que le corps. Les yeux sont arrondis, très-saillans, noirâtres. Le corcelet est globuleux, beaucoup plus étroit que les élytres, couvert de points enfoncés & relevés, qui le rendent raboteux. Les élytres sont réunies, glabres, très-noires, marquées de huit stries pointillées. La poitrine & l'abdomen sont obscurs. Les pattes sont fauves, & les cuisses sont simples.

Il se trouve au nord de l'Europe.

377. CHARANSON clavipède.

CURCULIO clavipes.

Curculio breviostris, oblongo-ovatus, gibbus, totus ater, antennis nigris, pedibus longis rufis, femoribus clavatis crassis. BONSD. *Hist. curc. suec.* pag. 40. n°. 35. tab. fig. 36.

Curculio clavipes. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1796.*

Il a un peu plus de quatre lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est mince, obtuse, raboteuse, & un peu plus courte que le corcelet. Les yeux sont arrondis, saillans, d'un brun noirâtre. Les antennes sont coudées, assez longues, noirâtres. Le corcelet est arrondi, relevé, raboteux, glabre, plus étroit que les élytres. Les élytres sont oblongues, un peu renflées, plus étroites postérieurement, glabres, luisantes, avec des stries pointillées. Tout le corps est noir. Les pattes sont fauves, assez longues. Les tarses sont obscurs. Les cuisses sont simples & renflées.

Il se trouve en Suède.

378. CHARANSON obtus.

CURCULIO obtusus.

Curculio breviostris, ovatus, postice obtusissimus, thorace carinulato, obscurus, antennis & pedibus fuscis. BONSD. *Hist. curc. suec.* pag. 37. n°. 29. tab. fig. 30.

Curculio suecicus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1796.*

Il a environ trois lignes de long depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est d'un gris obscur, noire & mince à l'extrémité, de la longueur du corcelet. Les yeux sont noirs, point du tout saillans. Les antennes sont coudées, obscures, une fois plus longues que la trompe. Le corcelet est cylindrique, une fois plus étroit que l'abdomen, raboteux, avec une ligne longitudinale au milieu. Les élytres sont presque coupées postérieurement, avec la future un peu élevée; elles sont écailleuses, tachetées de noirâtre & de gris; elles ont des stries pointillées, & les côtés sont un peu

anguleux. La poitrine & l'abdomen sont noirâtres. Les pattes sont obscures. Les cuisses sont simples.

Il se trouve en Suède.

379. CHARANSON entrecoupé.

CURCULIO intersectus.

Curculio brevirostris fuscus, thorace elytrisque vittis aeneis.

Curculio rostro thorace brevior, squamis nitentibus, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 284. n° 14.*

Le Charanson écaillé à bandes. GEOFF. *Ib.*

Curculio intersectus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 120. n° 14.*

Il a environ deux lignes de long. La trompe est grosse, courte. Tout le corps est brun & couvert d'écaillés cuivreuses, qui forment trois lignes longitudinales sur le corcelet, dont une au milieu & une de chaque côté. Les élytres ont des stries pointillées, formées par des points enfoncés, & quatre lignes longitudinales cuivreuses, moins marquées que sur le corcelet.

Il se trouve aux environs de Paris, sur les fleurs.

380. CHARANSON quadrille.

CURCULIO quadrilis.

Curculio brevirostris cinereus, elytris punctis quatuor nigris.

Curculio cinereus, elytrorum puncto quadruplici nigricante, proboscide thorace brevior. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 287. n° 21.*

Charanson quadrille à courte trompe. GEOFF. *Ib.*

Curculio quadrilis. FOURC. *Ent. par. 1. p. 122. n° 21.*

Il a environ une ligne & demie de long. Il est allongé, d'un gris cendré. La trompe est plus courte que le corcelet. La tête est obscure. Le corcelet a deux lignes longitudinales, obscures, terminées postérieurement par une tache noire. Les élytres sont striées, & ont chacune deux points noirs, séparés par un point blanc.

Il se trouve aux environs de Paris.

* * * * Trompe courte, cuisses dentées.

381. CHARANSON admirable.

CURCULIO spectabilis.

Curculio brevirostris femoribus dentatis, corpore viridi nigroque variegato. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 14. fig. 180.*

Curculio spectabilis. FAB. *Syst. ent. pag. 155. n° 144.—Sp. inf. tom. 1. p. 197. n° 208.—Mant. inf. tom. 1. pag. 121. n° 269.*

Il n'est guère plus grand que le Charanson nébuleux. Les antennes sont coudées, noires, avec l'extrémité un peu roussâtre. La trompe est grosse, plus courte que le corcelet, noire, & plus ou moins couverte d'une poussière écaillée verte brillante. Le corcelet est arrondi, raboteux, avec trois raies longitudinales & les côtés verts. L'écusson est vert & arrondi postérieurement. Les élytres ont des stries très-serrées de points enfoncés assez gros; elles sont mélangées de noir & de vert brillant. Le dessous du corps & les pattes sont mélangées de noir & de vert brillant. Les cuisses sont armées d'une dent ou épine courte.

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande,

382. CHARANSON renflé.

CURCULIO pinguis.

Curculio brevirostris femoribus anticis dentatis, gibbus nigricans, thorace lineis elytris strigis aeneis lineaque apicis flavescens. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 121. n° 270.*

Il est grand. La trompe est courte, grosse, cylindrique, noire, sans taches. Le corcelet est noir, avec un reflet vert, & deux lignes longitudinales jaunes, courtes, de chaque côté. Les élytres ont des stries pointillées, elles sont de la couleur du corcelet; elles ont deux lignes obliques, jaunes, & une autre petite vers l'extrémité: on voit encore une raie longitudinale jaune presque marginale, qui s'étend depuis la ligne antérieure jusqu'à l'extrémité, à la base de chaque élytre il y a une épine courte, obtuse. Les pattes sont noires, & les cuisses antérieures sont dentées.

Il se trouve à Cayenne.

383. CHARANSON trident.

CURCULIO tridens.

Curculio brevirostris femoribus dentatis, cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. Ent. ou *hist. nat. des inf.* CHARANSON. *Pl. 13. fig. 154.*

Curculio tridens. FAB. *Mant. inf. t. 1. p. 122. no. 271.*

Il est de la grandeur du Charanson nébuleux. Les premiers articles des antennes sont allongés presque cylindriques; le premier est un peu renflé à son extrémité; elles sont cendrées & brunes à leur base. Tout le corps est gris cendré. La trompe est courte, noire à son extrémité. Les yeux sont noirs, petits, arrondis, très-saillans. La tête est presque cylindrique. Le corcelet est très-légèrement raboteux. Les élytres ont chacune trois élévations as-

lez grosses, un peu oblongues, elles sont terminées en pointe aiguë, dont les deux forment comme une échancrure. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses sont légèrement renflées & armées d'un très-petite dent.

Il se trouve dans la Nouvelle-Zélande.

384. CHARANSON tache-obscur.

CURCULIO fuscomaculatus.

Curculio brevirostris femoribus subdentatis ater, thorace elytrisque levibus fusco maculatis. FAB. *Mant. inf. tom. 1. pag. 122. n° 272.*

Il est grand, lisse, glabre, très-noir. Le corcelet a des taches latérales obscures. Les élytres sont lisses, & ont plusieurs taches obscures. Les pattes sont noires, & les cuisses sont un peu dentées.

Il se trouve en Allemagne.

5. CHARANSON de la Liveche.

CURCULIO Ligustici.

Curculio brevirostris femoribus dentatis, corpore obscuro. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. *Pl. 7. fig. 77.*

Curculio Ligustici. FAB. *Syst. ent. p. 155. n° 145. — Sp. inf. tom. 1. pag. 197. n° 209. — Mant. inf. tom. 1. pag. 122. n° 273.*

Curculio Ligustici brevirostris, femoribus subdentatis abdomine subovato murino. LIN. *Syst. nat. p. 615. n° 68. — Faun. Suec. n° 621.*

Curculio cinereus, squamosus, alis carens, elytris rugosis. GEOFF. *inf. tom. 1. pag. 292. n° 36.*

Le Charanson gris à écus réunis & chagrinés. GEOFF. *Ib.*

Curculio apterus brevirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro-ufco : squamulis griseis nitidis. DEG. *Mém. inf. tom. 5. pag. 218. n° 10.*

Charanson du *Ligusticum* non-ailé, à courte trompe à antennes coudées, & à cuisses dentelées, à corps oblong d'un brun noir, couvert d'écaillés grises luifantes. DEG. *Ib.*

SCHAEFF. *Icon. inf. tab. 2. fig. 12.*

Curculio monopterus. FOURC. *Ent. par. 1. p. 127. n° 38.*

Curculio Ligustici. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 202. n° 122.*

Curculio Ligustici brevirostris, ovatus, niger, cinereo squamatus, rostro carinato, elytris scabris. BONSD. *Hist. curc. suec. p. 38. n° 32. tab. fig. 33.*

Il a environ six lignes de long. Tout le corps est cendré, un peu noirâtre. La trompe est courte

assez grosse & marquée à sa partie supérieure, d'une ligne longitudinale élevée. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le corcelet est arrondi, chagriné. Les élytres sont ovales, finement chagrinées, sans aucune strie. Les pattes sont noirâtres. Les cuisses sont légèrement dentées.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, sur la Liveche, *Ligusticum levisticum.*

385. CHARANSON nubile.

CURCULIO nubilus.

Curculio brevirostris femoribus dentatis griseus, elytris punctis obscurioribus numerosis. FAB. *Gen. inf. mant. pag. 228. — Sp. inf. tom. 1. pag. 197. n° 210. — Mant. inf. tom. 1. pag. 122. n° 274.*

Curculio murinus. BONSD. *Hist. curc. suec. p. 37. n° 30. tab. fig. 31.*

Il ressemble pour la forme & la grandeur, au Charanson de la Liveche. Les antennes sont noires terminées en masse aiguë, à l'tête & le corcelet sont gris, sans taches. Les élytres ont des stries pointillées; elles sont grisâtres, avec plusieurs points obscurs, distincts. Tout le corps est grisâtre. Les cuisses sont dentées; les postérieures ont un anneau blanc.

Il se trouve à Hambourg.

386. CHARANSON nègre.

CURCULIO nigrita.

Curculio brevirostris femoribus dentatis niger obscurus, thorace scabro, elytris crenato striatis. FAB. *Spec. inf. t. 1. p. 197. n° 211. — Mant. inf. tom. 1. pag. 122. n° 275.*

Il ressemble, pour la forme & la grandeur, au Charanson fillonné; il en diffère seulement en ce que les élytres sont sans taches.

Il se trouve en Italie.

388. CHARANSON fillonné.

CURCULIO sulcatus.

Curculio brevirostris, femoribus dentatis, ater, elytris striatis ferrugineo maculatis. FAB. *Syst. ent. pag. 155. n° 146. — Sp. inf. t. 1. pag. 197. n° 212. — Mant. inf. tom. 1. pag. 122. n° 276.*

Curculio griseo punctatus brevirostris, antennis longis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro : punctis flavescensibus sparsis. DEG. *Mem. inf. tom. 5. pag. 217. n° 9.*

Charanson noir, à points gris à courte trompe, à antennes coudées longues & à cuisses dentelées, à corps oblong, noir, avec des points d'un gris jaunâtre. DEG. *Ib.*

Curculio sulcatus brevirostris, ovatus, totus ater, elytris profunde striatis, antennis ferrugineo-aneis irroratis. BONSD. *Hist. curc. suec. pag. 40. n° 34. tab. fig. 35.*

Il ressemble entièrement, pour la forme & la grandeur au *Charanson gemmifère*. Les antennes sont coudées, assez longues & noires. La trompe est noire, courte & légèrement fillonnée. Le corcelet est arrondi & chagriné; il est tout couvert de points arrondis, élevés. Les élytres sont ovales noires, avec quelques points testacés, formés par des poils courts; elles ont des stries crénelées. Le dessous du corps & les pattes sont noirs. Les cuisses sont armées d'une dent ou petite épine.

Il se trouve en France, en Saxe, dans les bois.

389. CHARANSON gemmifère.

CURCULIO gemmatus.

Curculio breviostris femoribus dentatis ater, elytris punctatis viridibus. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 6. fig. 74.

Curculio gemmatus. FAB. Gen. inf. mant. p. 229. — Spec. inf. tom. 1. p. 197. n°. 213. — Mant. inf. tom. 1. pag. 122. n°. 277.

Curculio gemmatus. SCOP. Ent. carn. n°. 90.

Curculio gemmatus. Naturf. 6. tab. 4. fig. 6.

Curculio fulv. SC RANK. Enum. inf. aust. n°. 221.

Curculio gemmatus. LAICHART. Inf. tom. 1. p. 205. n°. 2.

Il a cinq lignes de long, & il ressemble beaucoup au *Charanson* de la Livèche. Les antennes sont noirâtres, coudées, assez longues. La trompe est courte, assez grosse, inégale. Les yeux sont arrondis, saillans. Tout le corps est très-noir. Le corcelet est arrondi, chagriné, sans taches. Les élytres sont chagrinées, marquées de plusieurs points d'un blanc verdâtre, formées par de petites écailles. Les pattes sont de la couleur du corps. Les cuisses sont munies d'une dent.

Il se trouve en Allemagne, dans la Hongrie.

390. CHARANSON picipède.

CURCULIO picipes.

Curculio breviostris femoribus dentatis griseus, elytris nebulosis, femoribus posticis rufis. FAB. Gen. inf. mant. pag. 229. — Sp. inf. tom. 1. pag. 197. n°. 214. — Mant. inf. tom. 1. pag. 122. n°. 278.

Curculio notatus breviostris, ovatus, griseo fuscus, elytris sulcatis, punctatis & strigis transversis pallidioribus notatis. BONSD. Hist. curc. suec. p. 39, n°. 33. tab. fig. 34.

Il est plus petit que le *Charanson* nébuleux. Les antennes sont coudées. Tout le corps est grisâtre. La trompe est grosse, courte, obtuse, noire à son extrémité. Le corcelet est couvert de petits points élevés, globuleux. Les élytres sont nébuleuses, & ont des

points relevés, rangées en stries. Les pattes sont grisâtres, avec les cuisses dentées, rougeâtres.

Il se trouve à Kiell.

391. CHARANSON morio.

CURCULIO morio.

Curculio breviostris femoribus dentatis ater nitens, elytris glabris. Ent. ou hist. nat. des inf. CHARANSON. Pl. 3. fig. 26.

Curculio morio. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 198. n°. 215. — Mant. inf. tom. 1. p. 122. n°. 279.

Curculio atro-apterus apterus breviostris, antennis fractis, femoribus mucicis, corpore oblongo nigro nitido lavi. DEG. Inf. tom. 5. pag. 243. n°. 29. Pl. 7. fig. 22.

Charanson non-ailé noir, non-ailé à courte & grosse trompe, à antennes coudées & à cuisses simples, à corps oblong noir, luisant & uni. DEG. Ib.

Curculio morio breviostris, ovatus, ater, elytris glabris nitidis, antennis pedibusque piceis. BONSD. Hist. curc. suec. pag. 36. n°. 28. tab. fig. 29.

ISNARD. Obs. sur les inf. de l'Oliv. Pl. 1. fig. 19.

Il est un peu plus petit que le *Charanson* gemmifère. Tout le corps est noir, luisant. Les antennes sont coudées, assez longues, d'un noir cendré à l'extrémité. La trompe est courte, assez grosse, avec trois lignes longitudinales, peu élevées, à la partie supérieure. Les yeux sont arrondis, peu saillans. Le corcelet est arrondi, chagriné. Les élytres sont légèrement chagrinées, & ont des stries pointillées, à peine marquées. Les pattes sont noires. Les cuisses sont renflées, rarement dentées.

Il se trouve dans presque toute l'Europe sur le tronc des arbres.

392. CHARANSON bifilloné.

CURCULIO bifulcatus.

Curculio breviostris femoribus dentatis niger, coeleptorum limbo cinereo, rostro bifulcato. FAB. Sp. inf. tom. 1. pag. 198. n°. 216. — Mant. inf. tom. 1. p. 122. n°. 280.

Il ressemble au *Charanson* fillonné. La trompe est courte, un peu renflée à son extrémité, marquée de deux sillons à sa partie supérieure. Le corcelet est noir à sa partie supérieure, cendré de chaque côté. Les élytres sont légèrement striées, avec la base & les bords latéraux cendrés. Les pattes sont noires & les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Italie.

393. CHARANSON arénaire.

CURCULIO arenarius.

Curculio brevirostris femoribus dentatis, niger glaber, elytris punctato-striatis, antennis basi piceis.

Il a une forme plus allongée que celle des précédens. Les antennes sont de la longueur de la tête, noires, avec le premier article brun. Tout le corps est noir, glabre luisant. La trompe est un peu plus courte que le corcelet. Les yeux sont oblongs, point du tout faillans. Le corcelet est un peu raboteux. Les élytres ont des points enfoncés, assez gros. Le dessous du corps est noir, avec quelques poils écailleux blanchâtres, à la partie inférieure du corcelet, sur la poitrine & à la partie interne des cuisses. Les cuisses antérieures ont une dent très-petite.

Il se trouve aux Indes orientales.

394. CHARANSON du Poirier.

CURCULIO Pyri.

Curculio brevirostris, femoribus dentatis, aeneofuscus. Ent. ou hist. nat. des ins. CHARANSON. Pl. 3. fig. 30. a. b.

Curculio Pyri. LIN. Syst. nat. pag. 615. n°. 72. — Faun. suec. n°. 623.

Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuscis. LIN. It. scan. p. 355.

Curculio Pyri. FAB. Syst. ent. p. 155. n°. 147. — Sp. inf. tom. 1. p. 198. n°. 217. — Mant. inf. t. 1. p. 122. n°. 281.

Curculio squamoso-viridis, rostro thorace brevior, pedibus rufis. GEOFF. inf. tom. 1. p. 282. n°. 12.

Le Charanson à écailles vertes & à pattes fauves. GEOFF. *Ib.*

Curculio brevirostris, antennis fractis rufis, femoribus muticis, corpore oblongo aeneo-nitido, pedibus rufis. DE G. Mém. inf. tom. 5. pag. 246. n°. 34.

Charanson bronzé du Poirier, à courte trompe, à antennes coudées rouffes & à cuisses simples, à corps oblong, couleur de bronze luisant & à pattes rouffes. DEG. *Ib.*

Scarabæus majusculus è nigro rufescens. L I S T. pag. 394. tit. 31.

Curculio mollis, griseo auratus nitens, femoribus muticis, elytris molliibus. ACT. Nidr. tom. 4. pag. 321. n°. 12.

Curculio acuminatus oblongiusculus aeneo fuscus. aët. nps. 1736. p. 16. n°. 2.

Curculio Pyri brevirostris, oblongo-ovatus, fusco-auratus, antennis brevibus pedibusque rufis. BONSD. Hist. curc. suec. pag. 24. n°. 8. tab. fig. 9.

MULL. Zool. Dan. 87. 960.

SULZ. Inf. tab. 3. fig. 23.

Curculio argentatus. FOURC. Ent. par. 1. p. 119. n°. 12.

Curculio Pyri. VILL. Ent. tom. 1. pag. 204. n°. 126.

Il a environ quatre lignes de long. Tout le corps est noirâtre & recouvert d'écailles bronzées ou cuivreuses, qui le font paroître plus ou moins brillant. Les antennes sont fauves. La trompe est courte, unie à sa partie supérieure. Les yeux sont noirs, arrondis, faillans. Le corcelet est petit, arrondi. Les élytres ont chacune neuf ou dix stries pointillées. Les pattes sont fauves, & les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans toute l'Europe, sur les feuilles de Poirier, de Pommier, d'Aubépine.

395. CHARANSON argenté.

CURCULIO argentatus.

Curculio brevirostris femoribus dentatis, corpore viridi-argenteo. Ent. ou hist. nat. des ins. CHARANSON. Pl. 5. fig. 56. a. b.

Curculio argenteus. LIN. Syst. nat. p. 613. n°. 73. — Faun. suec. n°. 624.

Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo. LIN. Faun. suec. edit. 1. n°. 459.

Curculio argentatus. FAB. Syst. ent. pag. 155. n°. 148. — Sp. inf. t. 1. pag. 198. n°. 218. — Mant. inf. tom. 1. pag. 123. n°. 284.

Curculio squamosus; viridi-auratus. GEOFF. inf. tom. 1. pag. 293. n°. 38.

Le Charanson à écailles vertes. GEOFF. *Ib.*

Curculio Urticæ brevirostris, antennis fractis femoribus dentatis, corpore oblongo viridi nitido, pedibus viridibus. DEG. Mém. inf. tom. 5. p. 219. n°. 12.

Charanson vert-doré de l'Ortie, à courte trompe, à antennes coudées & à cuisses dentelées, à corps oblong d'un vert luisant & à pattes vertes. DEG. *Ib.*

VOET. Coleopt. pars 2. tab. 39. fig. 44.

Curculio argentatus. SULZ. Inf. tab. 4. fig. 9.

Curculio argentatus brevirostris, oblongo ovatus, corpore viridi nitente, antennis tibiis plantisque flavis. BONSD. Hist. curc. suec. p. 27. n°. 12. tab. fig. 12.

Curculio argentatus. SCOP. Ent. carn. n°. 91.

POD. Mus. grec. pag. 30.

Curculio argentatus. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 223.

Curculio argentatus. LAICHART. *Inf. tom. 1.*
p. 209. n^o. 6.

Curculio auratus. FOURC. *Ent. par. 1.* p. 127.
n^o. 41.

Curculio argentatus. VILL. *Ent. t. 1.* pag. 204.
n^o. 127.

Il est plus petit & plus étroit que le précédent. Les antennes sont d'un jaune fauve, avec la masse obscure. Tout le corps est couvert d'écaillés d'un vert clair argenté brillant. Le corcelet est arrondi, beaucoup plus étroit que les élytres. Les élytres ont chacune neuf stries bien marquées, dans lesquelles on aperçoit une suite de points enfoncés. Les pattes sont d'un jaune fauve. Les cuisses sont dentées dans l'un des deux sexes. La trompe est courte & les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, sur différens arbres.

396. CHARANSON du Pommier.

CURCULIO Mali.

Curculio brevisrostris femoribus acute dentatis, subpubescens fuscus antennis pedibusque testaceis. FAB. *Sp. inf. app. p. 499.* — *Mant. inf. tom. 1.* p. 122. n^o. 282.

Il ressemble beaucoup au *Charanson* du Poirier, dont il n'est peut-être qu'une variété. Il en diffère en ce que tout le corps est obscur noirâtre, & que les antennes & les pattes sont testacées.

Il se trouve à Leipfick.

397. CHARANSON des arbrisseaux.

CURCULIO arboreti.

Curculio brevisrostris femoribus anticis dentatis cinereus. elytris punctato-striatis. FAB. *Mant. inf. tom. 1.* pag. 122. n^o. 283.

Il ressemble, pour la forme & la grandeur, au *Charanson* argenté. Les antennes sont cendrées, avec la masse obscure. Tout le corps est cendré, avec un reflet verdâtre. Les élytres ont des stries formées par des points enfoncés, assez gros. Les cuisses antérieures sont dentées; les autres sont simples.

Il se trouve à Cayenne.

398. CHARANSON verdelet.

CURCULIO viridanus.

Curculio brevisrostris femoribus dentatis viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. FAB. *Syst. ent. pag. 155.* n^o. 149. — *Sp. inf. tom. 1.* p. 198. n^o. 219. — *Mant. inf. tom. 1.* pag. 123. n^o. 285.

Il ressemble beaucoup, pour la forme & la grandeur, au *Charanson* argenté. Tout le corps est d'un

vert brillant, qui devient insensiblement plus obscur à l'extrémité de la trompe & les antennes sont noires. Les yeux sont grands, très-noirs.

Il se trouve à Tranquebar.

399. CHARANSON oblong.

CURCULIO oblongus.

CURCULIO brevisrostris oblongus femoribus dentatis, antennis elytris pedibusque ferrugineis. LIN. *Syst. nat. p. 615.* n^o. 71. — *Faun. suec. n^o. 625.*

Curculio oblongus. FAB. *Syst. ent. pag. 156.* n^o. 150. — *Sp. inf. tom. 1.* p. 199. n^o. 220. — *Mant. inf. tom. 1.* p. 123. n^o. 286.

Curculio oblongus, niger, elytris pedibusque testaceis. GEOFF. *inf. tom. 1.* pag. 294. n^o. 39.

Le Charanson à étuis fauves. GEOFF. *Ib.*

Curculio Pruni. SCOP. *Ent. carn. n^o. 95.*

Curculio oblongus. SCHRANK. *Enum. inf. aust. n^o. 224.*

Curculio oblongus brevisrostris, oblongus, lanuginosus, capite & thorace nigris, elytris ferrugineis, linea marginali nigra. BONSD. *Hist. Curc. suec. pag. 25.* n^o. 9.

Curculio oblongus. VILL. *Ent. tom. 1.* pag. 203. n^o. 125.

Curculio querneus. FOURC. *Ent. par. 1.* pag. 128; n^o. 42.

Il est un peu plus petit que le *Charanson* argenté. Les antennes sont fauves, un peu plus longues que le corcelet. La trompe est noire, courte. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est noir, arrondi, beaucoup plus étroit que les élytres. L'écusson est noir, petit, triangulaire. Les élytres sont testacées, avec des stries formées par des points enfoncés. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont fauves. Les cuisses sont dentées. Tout le corps de cet insecte est un peu pubescent.

Il se trouve en Europe sur les arbres. Il est très commun aux environs de Paris.

400. CHARANSON prase.

CURCULIO prasinus.

Curculio brevisrostris femoribus acute dentatis, viridis, antennis fuscis.

Il est un peu plus grand que le *Charanson* argenté. Tout le corps est noir, mais entièrement couvert d'écaillés vertes brillantes. Les antennes sont noirâtres. La trompe est courte: les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est arrondi. Les élytres ont des stries peu marquées, formées par de petits points enfoncés. Les pattes sont noires.

égèrement couvertes d'écaillés vertes. Les cuisses sont fortement dentées.

Il se trouve en Provence, sur différens arbres ; & plus particulièrement sur le Chêne.

401. CHARANSON ovale.

CURCULIO ovatus.

Curculio brevisrostris, femoribus dentatis, abdomine ovato nigro, pedibus antennisque rufis. LIN. *Syst. nat. p. 615. n°. 69. — Faun. suec. n°. 626.*

Curculio ovatus brevisrostris, femoribus dentatis, corpore nigro, pedibus antennisque rufis. FAB. *Syst. ent. pag. 156. n°. 151. — Sp. inf. tom. 1. p. 199. n°. 221. — Mant. inf. tom. 1. pag. 123. n°. 287.*

Curculio Rosæ apterus brevisrostris, pedibus antennisque fractis rufis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro fusco. DEG. *Mem. inf. tom. 5. p. 209. n°. 11.*

Charanson de l'Eglantier non-aîlé, à courte trompe, à pattes & antennes coudées rouffes, à cuisses dentelées, à corps oblong d'un brun noirâtre. DEG. Ib.

Curculio rufipes. SCOP. *Ent. carn. n°. 98.*

Curculio oblongus. SCHRANK. *Enum. inf. aust. n°. 226.*

Curculio ovatus brevisrostris, niger seu piceus, abdomine ovato, pedibus & antennis piceis, femoribus ut plurimum dentatis. BONSD. *Hist. curc. suec. pag. 35. n°. 25. tab. fig. 26.*

Curculio ovatus. VILL. *Ent. tom. 1. pag. 203. n°. 123.*

Il a environ deux lignes de long & une ligne de large. Les antennes sont d'un brun fauve, coudées, un peu plus longues que le corcelet. La trompe est courte. Tout le corps est d'un noir luisant. Le corcelet est un peu raboteux. Les élytres sont ovales, marquées de dix stries pointillées. Les pattes sont d'un brun fauve. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Europe, sur différens arbutus.

402. CHARANSON rouillé.

CURCULIO aruginosus.

Curculio brevisrostris, oblongus, totus viridis femoribus dentatis ferrugineis, antennis longioribus. BONSD. *Hist. curc. suec. pag. 23. n°. 7. tab. fig. 8.*

Il ressemble beaucoup au Charanson du Poirier, mais il a une forme plus oblongue, & les antennes sont plus longues, & d'un brun ferrugineux. La trompe est cylindrique de la longueur du corcelet, un peu raboteuse, verte. Les yeux sont bruns, globuleux, posés au milieu de la trompe. Le corcelet est bossu, couvert de petits points élevés. Les ély-

tres sont oblongues, convexes, obtuses, couvertes de petites écaillés vertes, avec des stries pointillées. Les ailes sont obscures, avec le bord extérieur ferrugineux. Les cuisses sont renflées vers l'extrémité, un peu comprimées, armées d'une forte dent ; elles sont ferrugineuses. Les jambes sont verdâtres.

Il se trouve au nord de l'Europe.

403. CHARANSON du Padus.

CURCULIO Padi.

Curculio brevisrostris, oblongo-ellipticus, griseo virescens, antennis pedibusque ferrugineis. BONSD. *Hist. curc. suec. pag. 26. n°. 11. tab. fig. 11.*

Les antennes sont de la longueur de la moitié du corps, ferrugineuses, avec la masse cendrée. La tête est cylindrique, finement pointillée. La trompe est courte, velue à son extrémité. Le front a une large cannelure. Les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est pointillé cylindrique, guère plus étroit que les élytres. L'écusson est très-petit, arrondi, pâle. Les élytres sont oblongues, convexes avec des stries pointillées. Tout le corps est d'un vert cendré. Les cuisses sont dentées, ferrugineuses à leur base, renflées, glauques & luisantes vers leur extrémité. Les jambes & les tarses sont ferrugineux.

Il se trouve en Suède, sur une espèce de Prunier, *Prunus Padus.*

404. CHARANSON érythrope.

CURCULIO erythropus.

Curculio brevisrostris, oblongo-ovatus, niger, antennis longioribus pedibusque rufis. BONSD. *Hist. curc. suec. pag. 25. n°. 10. tab. fig. 10.*

Curculio erythropus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1776.*

Curculio salicis, femoribus dentatis & dubius femoribus muticis. STROM. *Act. Acad. scient. Hafn. t. 2, p. 57. n°. 28. & 29.*

La trompe est courte, un peu raboteuse. Les yeux sont globuleux, noirs, arrondis. Les antennes sont fauves, coudées, une fois plus longues que la tête. Le corcelet est convexe, un peu raboteux, beaucoup plus étroit que les élytres. Les élytres sont noires, très-légèrement couvertes de petits poils cendrés, courts, qui se détachent au moindre frottement ; elles ont des stries pointillées. Les pattes sont fauves, les jambes sont un peu plus obscures. Les cuisses sont un peu renflées, tantôt simples, tantôt dentées.

Il se trouve au nord de l'Europe.

405. CHARANSON rude.

Curculio asperatus.

Curculio brevisrostris, cinereus, abdomine ovato, élytris

elytris setis erectis brevissimis exasperatis. BONSD. *Hist. curc. succ. pag. 34. n^o. 24. tab. fig. 25.*

Curculio niger, ovatus, striatus, totus villososinereus, thorace inermi. GEOFF. *ins. tom. 1. pag. 288. n^o. 23. ?*

Le Charanson fatin-gris. GEOFF. *Ib.*

Il a environ deux lignes de long. La trompe est presque de la longueur du corcelet ; elle est anguleuse, couverte d'écaillés cendrées, avec l'extrémité noire & la partie supérieure unie. Les yeux sont noirs, peu faillans. Les antennes sont coudées d'un fauve cendré, de la longueur du corcelet. Le corcelet est cylindrique, raboteux, beaucoup plus étroit que les élytres, transversalement bossu, terminé de chaque côté par un tubercule souvent bifide. Les élytres sont couvertes d'une poussière cendrée, & de poils courts, élevés, disposés en rangées longitudinales ; elles ont chacune dix stries pointillées. La poitrine & l'abdomen sont cendrés. Les pattes sont pâles. Les cuisses sont armées d'une petite dentelure.

Il se trouve au commencement du printemps, sous les feuilles sèches des arbrustes.

406. CHARANSON marqueté.

CURCULIO tessellatus.

Curculio brevirostris, ovatus niger seu obscurus fuscus, elytris striatis striarum intervallis albo nigroque alternatim maculatis. BONSD. *Hist. curc. succ. pag. 38. n^o. 31. tab. fig. 32.*

La trompe est presque de la longueur du corcelet assez grosse, un peu raboteuse, couverte de petites écaillés cendrées. Les yeux sont bruns, arrondis, faillans. Les antennes sont d'un brun fauve, coudées, de la longueur du corcelet. Le corcelet est cylindrique, beaucoup plus étroit que les élytres, raboteux, avec les bords relevés. Les élytres ont chacune dix stries finement pointillées, entre lesquelles il y a alternativement des taches carrées noires & pâles. La poitrine & l'abdomen sont noirâtres. Les pattes sont noirâtres, & les cuisses sont dentées.

Il se trouve au nord de l'Europe.

407. CHARANSON attelaboïde.

CURCULIO attelaboïdes.

Curculio brevirostris femoribus dentatis, rostro elytrisque unituberculatis. Ent. ou *hist. nat. des ins.* CHARANSON. *Pl. 14. fig. 174. a. b.*

Curculio attelaboïdes FAB. *Syst. ent. pag. 156. n^o. 152. — Sp. ins. tom. 1. pag. 199. n^o. 222. — Mant. ins. tom. 1. pag. 123 n^o. 288.*

Il ressemble au premier d'œil, à un Attelabe. Il est petit. Tout le corps est d'une couleur cendrée *Hist. Nat. des Insectes. Tom. V.*

roussâtre. Les antennes sont coudées, le premier article est long, ferrugineux. La trompe est courte, & munie à sa partie supérieure, d'un tubercule élevé oblong, carené. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu faillans. La tête a deux tubercules élevés, à sa partie supérieure ; elle est distincte, un peu plus étroite à sa jonction avec le corcelet. Le corcelet est étroit, & il a quelques tubercules élevés. L'écusson est arrondi & relevé à sa partie postérieure. Les élytres ont quelques tubercules élevés, & un plus grand, plus élevé, oblong, de chaque côté de la suture, vers le milieu. Les cuisses sont minces à leur base, renflées vers leur extrémité, & armées d'une dent ou épine assez grande.

Il se trouve dans le Brésil.

ESPECES MOINS CONNUES.

* Longirostre ; cuisses simples.

1. CHARANSON exotique.

CURCULIO exoticus.

Charanson grisâtre ; base du corcelet enfoncée ; élytres bossues postérieurement, avec dix rangées alternes de points blancs & de points noirs enfoncés.

Curculio griseus, thorace basi impresso, elytris gibbis, punctis seratis albis & nigris.

Curculio longirostris griseus, thorace basi impresso, dorso ruga abbreviata, elytris griseis albo punctatis decem ordinibus, interstitiis profunde nigro punctatis, basi ad suturam impressis, postice gibbis. Mus. Lesk. *pars ent. pag. 18. n^o. 368.*

Curculio exoticus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1741.*

Tout le corps est grisâtre. Le corcelet a un enfoncement à sa base, une ride, courte à sa partie supérieure. Les élytres ont une gibbosité vers leur extrémité, & dix rangées de points blancs, entre lesquels il y a des points noirs enfoncés.

Il se trouve aux Indes.

2. CHARANSON brachyptère.

CURCULIO brachypterus.

Charanson noir ; corcelet uni, pointillé ; élytres courtes, striées, pointillées entre les stries.

Curculio ater, thorace plano punctato, elytris abbreviatis striatis, interstitiis punctatis.

Curculio longirostris, ater, thorace plano punctato, linea media parum elevata, elytris abbreviatis, substriatis, interstitiis punctatis. Mus. Lesk. *p. 18. n^o. 374.*

Curculio brachypterus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1741.*

Tout le corps est noir. Le corcelet est pointillé, & il a au milieu une ligne longitudinale peu élevée. Les élytres sont courtes, légèrement striées, avec de petits points enfoncés entre les stries.

Cet insecte n'est peut-être que le *Curculio abbreviatus* de M. Fabricius.

Il se trouve en Europe.

3. CHARANSON ondulé.

CURCULIO undulatus.

Charanson noir; élytres avec des stries pointillées & des bandes ondulées, interrompues, blanches.

Curculio niger, elytris striato-punctatis fasciis undatis interruptis albis.

Curculionigirostris, niger, elytris ordine punctatis, fasciis undulatis, interruptis, albis. Mus. Lesk. pag. 18. n°. 379.

Curculio undatus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1741.

Tout le corps est noir. La trompe est allongée. Les élytres ont des points enfoncés, rangés en stries, & plusieurs bandes ondulées, interrompues, blanches.

Il se trouve en Europe.

4. CHARANSON pilifère.

CURCULIO pilifer.

Charanson obscur; élytres striées, pointillées, couvertes de poils gris; jambes fauves.

Curculio fuscus, elytris striatis, lavissime punctatis, griseo villosis, tibiis rufis.

Curculionigirostris, fuscus, elytris striatis, interstitiis lavissime punctatis; atomis griseis, pilosis adpersis, tibiis rufis. Mus. Lesk. pag. 18. n°. 380.

Curculio atomarius. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1741.

La trompe est allongée. Le corps est obscur. Les élytres sont striées, finement pointillées, & légèrement couvertes de poils gris. Les jambes sont fauves.

Il se trouve en Europe.

5. CHARANSON rouge.

CURCULIO coccineus.

Charanson rouge, élytres avec des stries pointillées.

Curculio coccineus, elytris punctato-striatis.

Curculio longirostris coccineus, elytris punctatis decem ordinibus. Mus. Lesk. pag. 18. no. 381.

Curculio coccineus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1742.

Tout le corps est d'un beau rouge, sans taches. Les élytres ont chacune dix stries pointillées.

Il se trouve en Europe.

6. CHARANSON du Zamia.

CURCULIO Zamia.

Charanson rouge; corcelet avec une ligne noire; trompe testacée, très-longue.

Curculio ruber, thoracis linea nigra, rostro testaceo longissimo. Thunb. nov. act. Ups. 4. pag. 29. tab. 1. fig. 7.

Curculio Zamia. LIN. Syst. nat. edit. 13. p. 1741.

Tout le corps est rouge, avec une ligne longitudinale noire sur le corcelet. La trompe est mince, sétacée, très-longue.

La larve a six pattes, & elle est couverte de quelques poils blancs; elle vit dans les cones d'une espèce de *Cycas* ou de *Zamia*, se nourrissant des noyaux & de la chair rouge qui les recouvre

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

7. CHARANSON cylindroïde.

CURCULIO cylindroides.

Charanson allongé, couvert d'une poussière jaune; élytres obtuses, avec des stries pointillées.

Curculio elongatus flavo irroratus, elytris punctato-striatis, apice obtusiusculis. SPARRM. Nov. act. Stockh. 1785. pag. 38. n°. 1.

Curculio cylindroides. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1753.

Il ressemble un peu au Charanson paraplectique. Le corps de cet insecte est allongé, recouvert d'une poussière jaune. Les élytres sont obtuses à leur extrémité, & elles ont des stries pointillées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

8. CHARANSON porifère.

CURCULIO porifer.

Charanson noirâtre, corcelet presque globuleux, avec trois épines courtes, percées à leur extrémité; élytres noirâtres, avec deux lignes blanches.

Curculio thorace subgloboso: spinulis breviori-

bus trifariis apice pertusus, elytrisque nigricantibus albo-lineatis. SPARRM. Nov. act. stockh. 1785. pag. 39. n°. 3.

Curculio porifer. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1753.

Le dessus du corps est noirâtre, le dessous est couvert d'un duvet cendré. La trompe est allongée. Le corcelet est presque globuleux, & armé de trois petites épines, courtes, percées à leur extrémité. Les élytres sont rayées de blanc.

Il se trouve au Cap de bonne-Espérance.

9. CHARANSON anneau-gris.

CURCULIO armillatus.

Charanson d'un gris obscur, corcelet presque épineux, cuissés avec un anneau gris, jambes dentées.

Curculio thorace utrinque subspinoso, femoribus ad apicem cingulo griseo notatis, tibiis fere omnibus dentatis. SPARRM. Nov. act. stockh. 1785. p. 40. n°. 10.

Curculio armillatus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1753.

Il varie un peu pour les couleurs. Le corps est d'une couleur cendrée obscure, sans taches, & quelquefois les élytres sont nébuleuses, avec quelques taches de chaque côté, oblongues; obliques, cendrées. La trompe est allongée. Le corcelet est presque épineux de chaque côté. Les cuissés ont un anneau grisâtre, vers leur extrémité. Les jambes sont presque toutes dentées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

10. CHARANSON GRUC.

CURCULIO Grus.

Charanson noir, cendré en-dessous, corcelet & élytres raboteux, cuissés renflés.

Curculio niger, subtus cinereus, thorace elytrisque punctato-striatis scabris, femoribus clavatis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1755.

Curculio Gruf. FUESL. Archiv. inf. 5. pag. 73. n°. 28.

Il a à peine une ligne & demie de long. Tout le dessus du corps est noir, le dessous est cendré. Le corcelet est raboteux. Les élytres sont raboteuses & elles ont des stries pointillées. Les cuissés sont renflés.

Il se trouve dans la Poméranie.

11. CHARANSON éthiopique.

CURCULIO ethiopicus.

Charanson noir; corcelet raboteux; antennes avec une cicatrice de chaque côté; élytres avec des stries pointillées.

Curculio ater, thorace scabro, antennis utrinque cicatrice notato, elytris punctato striatis.

Curculio caffer. SPARRM. Nov. act. stockh. 1785. pag. 39. n°. 3.

Curculio caffer. LIN. Syst. nat. edit. 13. p. 1753.

Le dessus du corps est noir; le dessous est couvert d'un léger duvet gris. Les antennes sont noires, avec la masse couverte d'un léger duvet argenté. Le corcelet est raboteux. Les élytres ont des stries pointillées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

12. CHARANSON verficolor

CURCULIO versicolor.

Charanson d'un brun noirâtre, couvert d'un duvet blanchâtre; trompe noire.

Curculio piceus albido-pubescent, rostro nigro.

Curculio versicolor. FUESL. Archiv. inf. 5. p. 75. n°. 34.

Curculio versicolor. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1755.

Il ressemble pour la forme & la grandeur au Charanson du blé. La trompe est noire, allongée. Tout le corps est d'un brun noirâtre, mais légèrement couvert d'un duvet blanchâtre.

Il se trouve en Allemagne.

13. CHARANSON quadrille.

CURCULIO quadrillis.

Charanson grisâtre; corcelet avec deux lignes, élytres avec quatre points blancs.

Curculio griseus, thorace lineis duabus, elytris punctis quatuor albis.

LEPECH. It. 2. pag. 204. tab. II. fig. 23.

Curculio quadripunctatus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1755.

La trompe est allongée. Tout le corps est gris. Le corcelet a deux lignes longitudinales blanches, & les élytres ont chacune deux points blancs.

Il se trouve dans l'Amérique méridionale.

14. CHARANSON variant.

CURCULIO varians.

Charanson mélangé de blanc & de noir, extrémité des élytres aiguë.

Curculio albo nigroque varius: elytris apice acuminatis.

LEPECH. It. 2. pag. 204. tab. 11. fig. 33.

Curculio varius, LIN. *Syst. nat. edit.* 13. p. 1756.

La trompe est allongée. Tout le corps est mélangé de noir & de blanc. Les élytres sont terminées en pointe aiguë.

Il se trouve dans la Russie méridionale.

15. CHARANSON incisé.

CURCULIO incisus.

Charanson oblong noir; corcelet pointillé, élytres sillonnées.

Curculio oblongus totus niger, thorace punctato elytris sulcatis. GEOFF. *Inf. tom 1. pag.* 282. n°. 11.

Curculio incisus. FOURC. *Ent. par. 1. pag.* 119. n°. 11.

La couleur de cette petite espèce est noire partout, à l'exception des pattes, qui sont un peu fauves. Le corcelet est ponctué, & les élytres ont des sillons profonds formés par des points.

Il se trouve aux environs de Paris.

16. CHARANSON poudreux.

CURCULIO pulvereus.

Charanson obscur; corcelet granulé; élytres transversalement ridées.

Curculio fuscus, thorace granulato, elytris transversim rugosis.

Curculio pulverulentus. SCOP. *Ent. carn. n°.* 75.

Curculio pulverulentus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1757.

Curculio pulverulentus. SCHRANK. *Enum. inf. austr. n°.* 196.

Il a environ huit lignes de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est grosse & assez longue. Tout le corps est noirâtre, ordinairement couvert de la poussière des étamines. Les antennes sont fauves. Le corcelet est couvert de petits tubercules arrondis. Les élytres sont réunies & légèrement ridées transversalement.

Il se trouve dans la Carniole.

17. CHARANSON de la Centaurée.

CURCULIO Centaurea.

Charanson ovale, noirâtre, couvert d'un duvet fauve; trompe avec une ligne longitudinale élevée.

Curculio ovatus fuscus rufo-pubescent, rostro marginato, linea ad apicem elevata.

Curculio Centaurea. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1757.

Curculio Centaurea. SCOP. *Ent. carn. n°.* 76.

Le corps est ovale, noirâtre & légèrement couvert d'un duvet fin, roussâtre. La trompe est longue, courbée, anguleuse, marquée d'une ligne longitudinale élevée vers l'extrémité. Les yeux sont noirs. Les élytres ont chacune dix stries.

Il se trouve dans la Carniole, sur les fleurs de la Centaurée scabieuse.

18. CHARANSON orifère.

CURCULIO aurifer.

Charanson d'un vert doré, antennes & extrémité de la trompe, dilatées, noires.

Curculio totus viridi auratus, antennis rostrique apice dilatato nigris. SCOP. *Ent. carn. n°.* 77.

Curculio auratus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1757.

Il n'a guères plus de trois lignes de long. Tout le corps est d'un vert doré. Les antennes sont noires. La trompe est noire, allongée, un peu dilatée à son extrémité. Les yeux sont noirs. La tête, le corcelet & les élytres sont légèrement raboteux.

Il se trouve dans la Carniole, sur différentes plantes.

19. CHARANSON érythrope.

CURCULIO erythropus.

Charanson gris, élytres striées; trompe & pattes noires, jambes rouges, un peu courbées à leur extrémité.

Curculio longirostris griseus, elytris striatis, rostra pedibusque nigris tibiis apice incurvis, rubris, plantisque. MUS. *Lesk. p.* 18. n°. 385.

Curculio erythropus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1759.

Le corps est gris. La trompe est allongée, noire. Les élytres sont striées. Les cuilles sont noires. Les

jambes & les tarses sont rouges : l'extrémité des jambes est un peu arquée.

Il se trouve en Europe.

20. CHARANSON verdoyant.

CURCULIO virens.

Charanson oblong, cylindrique, d'un vert brillant, trompe & pattes cuivreuses.

Curculio longirostris, oblongus, cylindricus, viridis, nitens, rostro pedibusque cupreo-nitentibus. Mus. Lesk. pag. 19. n°. 392.

Curculio virens. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1759.

Il est oblong, cylindrique, d'un vert brillant. La trompe est allongée, cuivreuse. Les pattes sont cuivreuses.

Il se trouve en Europe.

21. CHARANSON de Rhédi.

CURCULIO Rhedi.

Charanson noir, corcelet avec des points élevés; élytres striées, verdâtres.

Curculio longirostris femoribus simplicibus niger; thorace punctis elevatis scabro, elytris striatis, viridescens. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 203.

Rhedi. opusc. tom. 1. tab. 25. ?

Les antennes sont courtes. La trompe est allongée, mince. Le corps est noir. Le corcelet est couvert de petits points élevés. Les élytres sont verdâtres & ont chacune sept stries lisses.

Il se trouve en Allemagne, sur les fleurs d'une espèce d'Ornithogale.

22. CHARANSON crassicorne.

CURCULIO crassicornis.

Charanson noir, trompe comprimée, antennes renflées à l'extrémité; corcelet & élytres légèrement pointillés.

Curculio longirostris, niger, rostro compresso, antennis non fractis, apice crassioribus, thorace elytrisque levissime punctatis. Mus. Lesk. pag. 19. n°. 393.

Curculio crassicornis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1759.

Il est noir. La trompe est allongée & comprimée. Les antennes sont très-renflées à leur extrémité. Le corcelet & les élytres sont légèrement pointillés.

Il se trouve en Europe.

23. CHARANSON lisse.

CURCULIO glabratus.

Charanson noir glabre; élytres striées, d'un noir bronzé.

Curculio longirostris, niger, glaber elytris striatis, nigro-aneis. Mus. Lesk. pag. 19. n°. 398.

Curculio glabratus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1759.

La trompe est longue, noire. Tout le corps est noir, lisse. Les élytres sont striées & d'un noir bronzé.

Il se trouve en Europe.

24. CHARANSON à-poil.

CURCULIO crinitus.

Charanson noir, globuleux, couverts de poils grisâtres; trompe lisse, courbée; élytres striées.

Curculio niger, globosus, pilis griseis adpersus, rostro glabro incurvo, elytris striatis. Mus. Lesk. pars ent. pag. 19. n°. 407.

Curculio crinitus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1760.

La trompe est allongée, lisse, courbée. Le corps est globuleux, noir & couvert de poils gris. Les élytres sont striées.

Il se trouve en Europe.

** *Longirostres, Cuissés dentées.*

25. CHARANSON byrrhoïde.

CURCULIO byrrhinus.

Charanson noir, ovale; corcelet & élytres noirs, bordés de ferrugineux; poitrine blanchie de chaque côté.

Curculio thorace elytrisque nigris margine ferrugineis pectore utrinque niveo. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1770.

SPARRM. Nov. act. stockh. 1785. 1. n°. 4. p. 39. n°. 4.

Le corps est noir, ovale. La trompe est allongée. Le corcelet & les élytres sont bordés de ferrugineux. La poitrine est d'un blanc de neige de chaque côté.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

26. CHARANSON strigirostre.

CURCULIO strigirostris.

Charanson noirâtre; corcelet grenu, élytres avec des stries pointillées, trompe sillonnée.

Curculio thorace granulato, elytris punctato-friatis, rostro longitudinaliter utrinque sulcato. LIN. *Syst. nat. pag. 1770.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n^o. 4. pag. 39. n^o. 5.*

Cet insecte est tantôt noirâtre, tantôt d'une couleur baie, excepté la tête & le corcelet. La trompe est allongée, sillonnée de chaque côté. Le corcelet est couvert de points élevés, grenus. Les élytres ont des stries pointillées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

27. CHARANSON lanigère.

CURCULIO laniger.

Charanson noir en-dessus, couvert d'un duvet rougeâtre en-dessous, élytres avec deux taches postérieures blanches, lunulées.

Curculio niger, subtus rufo tomentosus, elytris maculis duabus posticis lunatis albidis.

Curculio elytris cicatrifato-reticulatis: posterius maculatis duabus albidis lunatis, tibiis anterioribus dentatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1770.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n^o. 4. p. 40. n^o. 6.*

Il est noir en-dessus, couvert en-dessous d'un duvet cotonneux, rougeâtre. La trompe est allongée. Le corcelet est couvert de petits points grenus. Les élytres ont des cicatrices presque réticulées & deux taches postérieures blanches, en croissant. Les jambes antérieures sont dentelées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

28. CHARANSON tibial.

CURCULIO tibialis.

Charanson oblong, nébuleux; corcelet presque globuleux; élytres striées; jambes antérieures velues intérieurement.

Curculio oblongus, cinereo nebulosus, thorace subgloboso elytris striatis, tibiis anticis intus barbatis.

Curculio niger cinereo nebulosus oblongus, thorace subgloboso, elytris striatis, rostro inflexo canali pectoris immerso, tibiis anterioribus intus barbatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1770.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n^o. 4. p. 40. n^o. 7.*

Le corps est oblong, noir, mêlé de cendré. Le corcelet est presque globuleux. La trompe est courbée, enfoncée dans une cannelure qui se trouve le long de la poitrine. Les élytres sont striées, Les

jambes antérieures sont velues à leur partie interne.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

29. CHARANSON glyphique.

CURCULIO glypticus.

Charanson ovale, noir, élytres, avec des lignes blanches, réticulées.

Curculio corpore ovato nigro, elytris lineis albis reticulatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1770.*

SCHALL. *Abh. der hall. Ges. Naturf. Fr. 1. pag. 282.*

Il est ovale, noir, presque de la grandeur du Charanson des Noisettes. Les élytres ont des lignes blanches réticulées.

Il se trouve en Saxe.

30. CHARANSON capucin.

CURCULIO capucinus.

Charanson ovale, élytres d'un gris nébuleux, avec des taches vers la future, & deux points blancs.

Curculio elytris griseo-nebulosis maculis posterius ad suturam oblongis punctisque binis albidis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1770.*

SCHALL. *Abh. der hall. Ges. Naturf. I. pag. 283.*

Il est presque de la grandeur du Charanson nébuleux, mais il est plus ovale. Les élytres ont d'un gris nébuleux, avec des taches postérieures oblongues vers la future, & deux points blancs.

Il se trouve en Saxe.

31. CHARANSON étoilé.

CURCULIO stellifer.

Charanson obscur, élytres striées, avec trois rangées transversales de taches blanches.

Curculio fuscus elytris striatis, macularum albarum fascia triplici transversa. GEOFF. *Ins. tom. 1. pag. 295. n^o. 41.*

Le Charanson brun à bandes transverses de taches blanches. GEOFF. *Ib.*

Curculio stellifer. FOURC. *Ent. par. 1. pag. 128. n^o. 44.*

Il est brun. La trompe est grosse & de la longueur du corcelet. Le corcelet est un peu chagriné. Les élytres ont chacune dix stries formées par des points enfoncés. L'écusson est couvert de poils jaunes. Les élytres ont trois bandes transverses de taches blanchâtres, formées par de petits poils d'un

blanc jaunâtre. On voit aussi une tache à l'angle extérieur de la base.

Il se trouve aux environs de Paris.

32. CHARANSON dénigré.

CURCULIO denigratus.

Charanson noir ; corcelet pointillé ; élytres avec des stries pointillées , & l'extrémité inférieure rougeâtre.

Curculio ater, thorace punctato, elytris punctato striatis, apice subtus rubicundis. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. 1771.

FUESL. *Archiv. inf.* 5. pag. 78. n°. 52.

Il ressemble au Charanson très-noir. Il a environ une ligne de long, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du corps. La trompe est allongée. Le corps est noir. Le corcelet est pointillé. Les élytres ont des stries pointillées , & leur extrémité inférieure un peu rougeâtre.

Il se trouve en Allemagne.

33. CHARANSON danubial.

CURCULIO danubialis.

Charanson noirâtre , élytres fauves , parsemées de points noirs.

Curculio longirostris; femoribus omnibus dentatis; elytris cervinis, punctis nigris sparsis. SCHRANK. *Enum. inf. aust. p.* 113. n°. 214.

Il est noirâtre. Les antennes sont courtes. La trompe est noire , allongée. Les élytres sont un peu fauves & parsemées de points noirs. On aperçoit au moyen de la loupe , des stries pointillées. Toutes les cuisses sont dentées. Les jambes & les tarses sont testacés.

Il se trouve près de Vienne , dans les îles que forme le Danube , sous l'écorce des arbres.

34. CHARANSON carié.

CURCULIO cariosus.

Charanson oblong ; trompe mince , avancée , élytres striées ; cuisses antérieures , renflées & fortement dentées.

Curculio oblongus; rostro porrecto, tereti, nitidulo; elytris striatis; femoribus anticis crassioribus & majore dente notatis. SCOP. *Ent. can. n°.* 81.

Curculio cariosus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. p. 1772.

Il est oblong , d'une couleur roussâtre obscure. La trompe est allongée , mince , luisante. Les élytres ont chacune dix stries pointillées. Les cuisses

antérieures sont renflées , & munies d'une forte dent. Les pattes sont ferrugineuses.

Il se trouve dans la Carniole , sur le tronç carié du Poirier.

35. CHARANSON des Syngénéfes.

CURCULIO Syngenesia.

Charanson fauve , couvert de poils courts ; trompe noire , luisante à l'extrémité.

Curculio cervinus brevissimis villis adspersus, rostro nigro, apice nitido. SCOP. *Ent. carn. n°.* 82.

Curculio Syngenesia. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1772.

Il est d'une couleur fauve en-dessus , un peu plus pâle en-dessous , & entièrement couvert de poils courts. La trompe est noire , luisante à son extrémité. Les élytres sont striées. Les cuisses sont munies d'une petite dent obtuse.

Il se trouve dans la Carniole , sur les fleurs des plantes Syngénéfes.

36. CHARANSON réticulé.

CURCULIO reticulatus.

Charanson oblong , noir ; élytres fortement ponctuées & réticulées , avec de légères rides transversales.

Curculio longirostris oblongus, niger elytris profunde punctatis reticulatisque, rugis transverse latissime striatis. MUS. *Lesk. pars ent. pag.* 20. n°. 423.

Curculio reticulatus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1772.

Il est oblong , noir. La trompe est allongée. Les élytres sont profondément pointillées & réticulées , elles ont des rides transversales un peu marquées.

Il se trouve en Europe.

37. CHARANSON tricolor.

CURCULIO tricolor.

Charanson testacé , tête , corcelet & pattes fauves ; élytres , avec deux bandes dentées , ferrugineuses.

Curculio testaceus, capite, thorace pedibusque rufis, elytris fasciis duabus dentatis ferrugineis. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1773.

Mus. Lesk. pars ent. pag. 20. n°. 427.

La trompe est allongée. Le corps est testacé. La tête , le corcelet & les pattes sont fauves. Les élytres ont deux bandes ferrugineuses , dentées. Les cuisses sont munies d'une forte dent.

Il se trouve en Europe.

*** *Brevirostre* ; *cuisse*s *simples*.

38. CHARANSON nychthémère.

CURCULIO nychthemerus.

Charanson blanc ; corcelet & élytres noirs , latéralement rayés de blanc ; abdomen noir , avec des taches latérales blanches.

Curculio albus , *thorace elytrisque nigris* , *vittis lateralibus albis* , *abdomine atro* , *utrinque niveo maculato*.

Curculio albus , *thorace elytrisque in parte summa atris* , *fasciis longitudinalibus albis nigrisque utrinque alternantibus* , *abdomine atro* , *ad latera niveo maculato*. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1793.

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. 1. n^o. 41. pag. 42. n^o. 12.

La trompe est courte. Le corps est blanc. La partie supérieure du corcelet & des élytres est très-noire. Les côtés ont des raies longitudinales alternes , blanches & noires. L'abdomen est très-noir , avec les côtés tachés de blanc.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

39. CHARANSON rayé de blanc.

CURCULIO nivofus.

Charanson noir en-dessus , blanchâtre en-dessous ; corcelet & élytres , avec des rangées de tubercules & des raies blanches.

Curculio thorace elytrisque seriatim tuberculatis niveo lineatis. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1792.

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. 1. n^o. 4. p. 41. n^o. 11.

La trompe est courte. Le dessous du corps est couvert de petites écailles d'un blanc jaunâtre. Le corcelet & les élytres sont rayés d'un blanc de neige , & ont des tubercules rangés en stries.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

40. CHARANSON Argus.

CURCULIO Argus.

Charanson cotonneux , tête , bord antérieur du corcelet pointillés de blanc & de gris ; élytres , avec des stries élevées , tachées de blanc & de cendré.

Curculio tomentosus , *capite thoracisque margine anteriore griseo alboque punctatis* , *elytris striis elevatis albo cinereoque maculatis punctatisque*. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1793.

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. 1. n^o. 4. pag. 43. n^o. 15.

La trompe est courte. Le corps est couvert d'un duvet cotonneux. La tête & le bord antérieur du corcelet sont pointillés de blanc & de gris. Les élytres ont des stries élevées , tachées & pointillées de blanc & de cendré.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

41. CHARANSON Pourceau.

CURCULIO Porculus.

Charanson cendré obscur , velu , corcelet , avec cinq lignes ; élytres , avec deux taches postérieures blanches.

Curculio cinereo-fuscus pilosus , *thorace lineis quinque* ; *elytris posterioribus maculis duabus albis*. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1793.

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1685. n^o. 4. pag. 45. n^o. 20.

La trompe est courte. Le corps est velu & d'une couleur cendrée obscure. Le corcelet a cinq lignes longitudinales blanches. Les élytres ont deux taches blanches à leur partie postérieure.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

42. CHARANSON noir-brillant.

CURCULIO atratus.

Charanson glabre , d'un noir luisant ; élytres striées , pointillées entre les stries.

Curculio glabriusculus nigro-nitens , *elytris striatis* : *interstitiorum punctis impressis*. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1793.

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. 1. n^o. 4. p. 46. n^o. 22.

Le corps est glabre , d'un noir luisant. Les élytres sont striées , & elles ont des points enfoncés entre les stries.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

43. CHARANSON porte-cœur.

CURCULIO cordiger.

Charanson brévirostre ; corcelet en cœur pointu de chaque côté , élytres avec des stries pointillées.

Curculio thorace subdidymo cordato , *utrinque aculeato* , *elytris striatis punctatis*. LIN. *Syst. nat. edit.* 13. pag. 1793.

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. 1. n^o. 4. p. 46. n^o. 23.

La trompe est courte. Le corcelet est presque didyme , en cœur , épineux de chaque côté. Les élytres ont des stries pointillées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

44. CHARANSON petit-Taureau.

CURCULIO Tauriculus.

Charanson noir, front arrondi, pointillé; corcelet bicaréné; élytres avec quatre rangs de tubercules dont les derniers plus courts.

Curculio niger, fronte rotundata punctata, thorace bicarinato punctato subcrispato scabro, elytris lineis quatuor tuberculosis, infimis abbreviatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1793.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n°. 4. pag. 47. no. 25.*

Le corps est noir. La trompe est courte. La tête arrondie pointillée. Le corcelet est raboteux, pointillé, bicaréné. Les élytres ont quatre rangées longitudinales de tubercules dont les derniers sont plus courts que les autres.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

45. CHARANSON Bouvillon.

CURCULIO Juvençus.

Charanson brévirostre; front rétus; corcelet raboteux, unidenté; élytres avec trois rangées courtes de tubercules.

Curculio fronte excavato-retusa, thorace scabro utrinque unidentato, elytris utrinque tuberculorum serie abbreviata triplici. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1793.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n°. 4. p. 47. no. 26.*

Il ressemble au précédent, mais il est trois fois plus petit. La trompe est courte. Le front est rétus, un peu enfoncé. Le corcelet est raboteux, muni d'une dent de chaque côté. Les élytres ont chacune trois rangées courtes de tubercules.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

46. CHARANSON harnaché.

CURCULIO ephippiatus.

Charanson brévirostre; corcelet ridé & raboteux; élytres, avec des rangées de tubercules épineux, future avec des épines conniventes.

Curculio thorace tuberculis rugisque scabro, elytris utrinque serie sesquitertia spinularum: sutura spinulis conniventibus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1793.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n°. 4. p. 47. n°. 27.*

La trompe est courte. Le corcelet a des tubercules & des rides qui le font paroître raboteux; les élytres ont chacune trois ou quatre rangées de

Hist. Nat. Insect. Tom. V.

petites épines, & la future a des épines qui se joignent.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

47. CHARANSON cucullé.

CURCULIO cucullatus.

Charanson brévirostre, gris; front déprimé, raboteux; corcelet avancé; élytres bituberculées postérieurement.

Curculio fronte depressa scabra, thorace anterieus porrecto rostroque bisulcato canaliculatis, elytris pone bituberculatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n°. 4. p. 48. n°. 28.*

Le corps est gris. Les antennes & les yeux sont noirs. La trompe est courte, cannelée. Le front est déprimé, raboteux. Le corcelet est avancé antérieurement & cannelé. Les élytres ont deux tubercules à leur partie postérieure.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

48. CHARANSON uvifère.

CURCULIO Uva.

Charanson noir, corcelet avec une tache de chaque côté de la base; élytres avec des tubercules noduleux, presque globuleux, glabres.

Curculio ater thorace utrinque macula baseos ferruginea, elytris nodulis subglobosis confertis glabris.

Curculio ater, capite emarginato, thoraca anterieus foveo lato, elytris nodulis subglobosis confertis glabris: macula baseos thoracis utrinque supra & subtus femorumque ferruginea. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh. 1785. I. n°. 4. p. 49. n°. 29.*

Il est noir. La tête est échancrée. Le corcelet a une fossette à sa partie antérieure, & une tache ferrugineuse de chaque côté, à la base. Les élytres ont des tubercules noduleux, presque globuleux, glabres.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

49. CHARANSON biglobuleux.

CURCULIO biglobatus.

Charanson noir, trompe cannelée; corcelet globuleux, raboteux; élytres avec deux rangs de tubercules.

Curculio niger rostro canaliculato, thorace globoso punctato scaberrimo, elytris punctato-scabris: tuberculorum utrinque ordinibus duobus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. I. n°. 4. p. 49. n°. 30.

Il est noir. La trompe est courte cannelée. Le corcelet est globuleux, pointillé, très-raboteux. Les élytres sont pointillées & raboteuses, & ont chacune deux rangées de tubercules.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

50. CHARANSON chauve.

CURCULIO calvus.

Charanson noir; corcelet avec des points élevés sur les côtés; élytres avec des stries élevées, lisses & des sillons pointillés.

Curculio ater, thorace utrinque punctis elevatis scabro: disco leviusculo, elytris striis elevatis glabriusculis: sulcis interjectis impresso punctatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. I. n°. 4. p. 50. n°. 34.

Il est noir. La trompe est courte. Le corcelet est lisse au milieu & raboteux sur les côtés. Les élytres ont des stries élevées, lisses, & des sillons pointillés placés entre les stries.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

51. CHARANSON vieux.

CURCULIO senilis.

Charanson obscur, parsemé de gris, corcelet mince, élytres avec des stries élevées, lisses, distantes, & des points enfoncés.

Curculio fuscus griseo-irroratus, thorace teretiusculo, elytris striis elevatis levibus distantibus ternis aut quinis: interstitiis planis impresso-punctatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. I. n°. 4. p. 50. n°. 35.

Il est noirâtre, & parsemé de points grisâtres. La trompe est courte. Le corcelet est aminci. Les élytres ont des stries élevées, lisses, distantes; elles sont unies & pointillées entre ces stries.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

52. CHARANSON platine.

CURCULIO platina.

Charanson grisâtre en-dessus, dessous & côté du corps mélangés de blanc argenté & de vert doré brillant; élytres avec des raies noires.

Curculio griseus, subtus lateribusque viridi-aureo argenteoque splendidus, elytris vittis atris.

Curculio platina subtus lateribusque albo argenteo, viridique aureo splendidus, supra pedibusque griseus, elytrorum fasciis longitudinalibus atris. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. I. n°. 4. p. 50. n°. 36.

Le dessus du corps est gris, le dessous & les côtés brillent d'un blanc argenté & d'un vert doré. Les élytres ont des raies longitudinales noires. Les pattes sont grises.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

53. CHARANSON Poule.

CURCULIO Gallina.

Charanson gris en-dessus, blanc en-dessous; corcelet, avec cinq sillons de chaque côté, un peu arqués, obliques; élytres légèrement striées.

Curculio griseus, subtus canus, thorace utrinque sulcis quinque subarcuatis obliquis, elytris leviter striatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. I. n°. 4. p. 51. n°. 37.

Le dessus du corps est gris, & le dessous est blanc. La trompe est courte. Le corcelet a cinq sillons de chaque côté, obliques, un peu arqués. Les élytres sont légèrement striées.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

54. CHARANSON argynelle.

CURCULIO argynellus.

Charanson d'un vert argenté; yeux noirs; trompe plate en-dessus, avec une ligne longitudinale noire, enfoncée.

Curculio viridi-argenteus, oculis atris, rostro supra plano: linea longitudinali nigra impressa. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1794.*

SPARRM. *Nov. act. stockh.* 1785. I. n°. 4. pag. 51. n°. 39.

Il est d'un vert argenté. La trompe est courte, plate en-dessus, marquée d'une ligne longitudinale noire enfoncée, à la partie supérieure. Les yeux sont noirs.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

55. CHARANSON nigelle.

CURCULIO nigellus.

Charanson noirâtre en-dessus, d'un gris roussâtre en-dessous; corcelet & élytres épineux.

Curculio nigricans, subtus ex griseo rufescens,

antennis rectis, thorace elytrisque spinulosis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1795.*

SPARRM. *Nov. act. Stockh. 1785. t. n^o. 4. p. 52. n^o. 40.*

Il ressemble au *Macrocephale albinus*, mais il est plus petit. Les antennes ne sont point coudées. Le corps est noirâtre en dessus, d'un gris roussâtre en-dessous. La trompe est courte. Le corcelet & les élytres sont légèrement épineux.

Les antennes droites de cet insecte annoncent qu'il n'appartient point à ce genre.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

56. CHARANSON autrichien.

CURCULIO austriacus.

Charanson brévirostre, aptère, noirâtre ; bord du corcelet & des élytres, fauve.

Curculio brevirostris femoribus muticis, apterus fuscus, thoracis elytrorumque lateribus rufis. SCHRANK. *Enum. inf. aust. n^o. 234.*

Curculio Linzensis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1799.*

Tout le corps est légèrement cotonneux noirâtre, avec les bords du corcelet & des élytres, fauves. La trompe est grosse, courte. Les élytres ont des stries pointillées, & au-dessous on ne trouve point d'ailes.

Il se trouve en Allemagne.

57. CHARANSON chrysoptère.

CURCULIO chrysopterus.

Charanson brévirostre noir ; élytres mélangées de blanc, avec le bord interne doré.

Curculio brevirostris femoribus muticis, niger, elytris cano variegatis, margine interiore aureo. SCHRANK. *Enum. inf. aust. n^o. 237.*

Il est allongé, noir, un peu mélangé de cendré. La trompe est courte. Le corcelet a des enfoncemens en forme de cicatrice. Les élytres ont des stries pointillées, & une poussière ferrugineuse, principalement vers la suture, qui étoit dans l'insecte vivant, d'une belle couleur dorée ; l'extrémité de l'abdomen est couverte de poils fauves.

Il se trouve à Vienne en Autriche.

58. CHARANSON aranéiforme.

CURCULIO araneiformis.

Charanson brévirostre, ovale, d'un rouge ferrugineux ; élytres striées.

Curculio brevirostris muticus, ovatus ex rubello ferrugineus, elytris striatis. SCHRANK. *Enum. inf. aust. n^o. 238.*

Il est de grandeur moyenne, & ressemble un peu à une Araignée. Tout le corps est d'un rouge ferrugineux. La trompe est très-courte. Le corcelet est court, parsemé de points enfoncés. L'abdomen est ovale, presque globuleux.

Il se trouve en Allemagne.

59. CHARANSON trivial.

CURCULIO trivialis.

Charanson cendré ; corcelet avec trois lignes peu marquées, blanches ; élytres avec des taches fauves.

Curculio cinereus thorace lineis tribus obsoletis albis, elytris maculis fuscis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1799.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 82. n^o. 73.*

Il ressemble au *Charanson* du *Polygonum*, & il a environ trois lignes de long. Le corps est cendré. La trompe est courte. Le corcelet a trois lignes longitudinales peu marquées, blanches. Les élytres ont des taches noirâtres.

Il se trouve à Berlin.

60. CHARANSON *Viverra*.

CURCULIO Viverra.

Charanson d'un gris sale ; trompe large ; corcelet raboteux, sillonné ; élytres raboteuses striées.

Curculio sordide cinereus rostro lato, thorace scabro, antennis turgido, per mediam longitudinem sulcato elytris striatis : interstitiis scabris. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1799.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 83. n^o. 77.*

Il a environ une ligne & demie de long. Il est d'une couleur cendrée obscure. La trompe est courte, large. Le corcelet est raboteux, marqué d'une ligne longitudinale enfoncée, à sa partie supérieure, un peu renflée antérieurement. Les élytres sont striées & raboteuses entre les stries. Les antennes sont noirâtres.

Il se trouve dans la Poméranie.

61. CHARANSON de Herbst.

CURCULIO Herbstii.

Charanson cendré, corcelet granulé, presque globuleux, élytres arrondies, striées, avec des taches oculées, d'un rouge doré.

Curculio cinereus, thorace subgloboso granulato,

elytris rotundatis striatis : oculis rubro-aureis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1800.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 84. n^o. 78.*

Le corps est cendré. La trompe est courte. Le corcelet est presque globuleux, granulé. Les élytres sont striées, arrondies, ornées de taches oculées, d'un rouge doré.

Il se trouve à Berlin.

62. CHARANSON pyricole.

CURCULIO pyricola.

Charanson aminci, noir; antennes & dessous du corps de couleur baie, corcelet granulé, élytres filonnées.

Curculio angustus ater, subtus antennisque spadicis, thorace granulato, elytris sulcatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1800.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 84. n^o. 79.*

Il a à peine deux lignes de long. La trompe n'est pas aussi courte que dans les autres espèces. Le corps est étroit, noir en dessus, d'une couleur baie en-dessous. Le corcelet est granulé. Les élytres sont filonnées.

Il se trouve en Poméranie.

63. CHARANSON granulé.

CURCULIO granulatus.

Charanson ovale gris, granulé en-dessus, avec quelques granclures rouges, luisantes; élytres réunies.

Curculio ovatus griseus, supra granulatus : granulis hinc inde rubris pellucidis, elytris connatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1800.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 84. n^o. 80. tab. 24. fig. 33.*

Il a environ trois lignes de long. La trompe est courte. Le corps est ovale gris, granulé à sa partie supérieure: on voit par-ci, par-là, quelques granclures rouges, luisantes. Les élytres sont réunies.

Il se trouve en Allemagne.

64. CHARANSON piniperde.

CURCULIO piniperda.

Charanson bai; corcelet allongé pointillé; élytres avec des stries pointillées.

Curculio spadicus, thorace elongato punctato, elytris punctato-striatis, femoribus subaenatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1800.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 84. n^o. 81.*

Il a la forme du Scolite piniperde, & il a une ligne & demie de long. Le corps est d'une couleur baie. Le corcelet est allongé, pointillé. La trompe est courte, les élytres ont des stries pointillées. Les cuisses sont presque dentées.

Il se trouve en Allemagne.

65. CHARANSON future-blanche.

CURCULIO futura alba.

Charanson allongé cendré, mélangé de noirâtre; dessous du corps, côtés & future blancs, antennes & yeux noirs.

Curculio elongatus cinereus fusco subvariis, subtus, lateribus futuraque albus, antennis oculisque nigris. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1800.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 84. n^o. 82. tab. 24. fig. 34.*

Il a environ trois lignes de long. Le corps est étroit, allongé, cendré un peu mélangé de noirâtre, avec le dessous, les côtés & la future, blancs. Les antennes & les yeux sont noirs.

Il se trouve en Allemagne.

66. CHARANSON Hermite.

CURCULIO Eremita.

Charanson couvert de poils jaunâtres en-dessus, trompe & corcelet noirs, élytres noirâtres, avec des stries pointillées.

Curculio supra flavescens pilosus, rostro tenui thorace subpunctato nigris, antennis elytrisque punctato-striatis fuscis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1800.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 85. n^o. 83.*

Il a environ deux lignes de long. Le dessus du corps est couvert de poils jaunâtres. La trompe est mince, courte, noire. Le corcelet est noir, légèrement pointillé. Les élytres sont noirâtres, & ont des stries pointillées. Les antennes sont noirâtres.

Il se trouve en Allemagne.

67. CHARANSON bruchoïde.

CURCULIO bruchoides.

Charanson presque cylindrique, élytres courtes, noires, granulées & striées.

Curculio thorace elytrisque abbreviatis nigris granulatis & striatis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1800.*

FUESL. *Archiv. inf. 5. pag. 85. n^o. 84.*

Il ressemble à une Bruche. Il est gros, presque cylindrique, & a à peine une ligne de long. La trompe est penchée, courte. Le corcelet est noir. Les élytres sont noires, grenues & striées.

Il se trouve en Allemagne.

68. CHARANSON triangulaire.

CURCULIO triangularis.

Charanson brévirostre, d'un jaune obscur, base du corcelet triangulaire, élytres avec des stries pointillées.

Curculio brevirostris obscurus flavicans, thoracis basi triangulari, elytris striato-punctatis. PETAG. *Sp. inf. cal. pag. 14. n° 71.*

Curculio triangularis. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1806.*

Il est ovale, assez grand. Tout le corps est d'une couleur ferrugineuse cendrée, couvert d'une poussière jaune. Le dessous du corps est couvert d'un léger duvet d'un blanc jaunâtre. La trompe est courte, noire, avec une ligne longitudinale élevée au milieu. Le corcelet a quelques points variolés; il est terminé postérieurement par trois angles dont l'intermédiaire occupe la place de l'écusson. Les élytres ont des stries pointillées, & des taches velues jaunes.

Il se trouve dans la Calabre, sur les fucus du Chardon commun.

69. CHARANSON C blanc.

CURCULIO C album.

Charanson mélangé de noir & de cuivreux, angle extérieur de la base des élytres avec une ligne arquée, blanche.

Curculio cupreo nigroque varius, angulo externo baseos elytri linea arcuata alba.

Curculio C album. SCOP. *Ent. carn. n° 99.*

Curculio C album. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1802.*

Le corps est mélangé de noir & de cuivreux, un peu raboteux & couvert de quelques poils. Les élytres sont réunies, avec sept stries pointillées, sur chaque, & une tache blanche représentant un C à l'angle extérieur de la base. Les cuisses sont armées d'une petite dent.

Il se trouve dans la Carniole, la Grece.

70. CHARANSON sensitif.

CURCULIO sensitivus.

Charanson noir, cuisses fauves, avec l'extrémité noire.

Curculio niger, femoribus fulvis apice nigris. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1802.*

Curculio sensitivus. SCOP. *Ent. carn. n° 100.*

La trompe est courte. Le corps est noir. Les élytres sont striées, réunies. Les cuisses sont fauves, avec l'extrémité noire.

Il se trouve dans les forêts de la Carniole.

71. CHARANSON némorale

CURCULIO nemoreus.

Charanson aptère, noir, opaque, trompe bifide.

Curculio apterus niger, opacus, rostro bifido, thorace elytrisque scabris acuminatis.

Curculio nemoreus. SCOP. *Ent. carn. n° 101.*

Curculio nemoreus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. pag. 1802.*

Les antennes sont longues. Le corps est noir opaque. La trompe est bifide. La tête est glabre. Le corcelet est raboteux. Les élytres sont raboteuses, striées, terminées en pointe. Les cuisses sont renflées.

Il se trouve dans la Carniole, sur le Sapin.

72. CHARANSON Momus.

CURCULIO Momus.

Charanson obscur, trompe avec deux sillons; abdomen couvert de poils fauves, cuisses antérieures renflées.

Curculio rostro supra bifurcato, abdomine posterioribus fulvo villosis, femoribus anterioribus crassioribus. LIN. *Syst. nat. edit. 13. p. 1802.*

Curculio Momus. SCOP. *Ent. carn. n° 102.*

Tout le corps est noirâtre, mais entièrement couvert de poils cendrés, un peu roussâtres. La trompe est courte, marquée de deux sillons à sa partie antérieure. Les antennes sont de la longueur du corcelet. Le corcelet a antérieurement une petite ligne en croissant de chaque côté & deux points pâles postérieurement. Les élytres ont une tache arrondie au milieu, & un point, pâles, vers l'extrémité. On ne trouve point d'ailes au-dessous. L'abdomen est couvert de poils fauves, entre les pattes postérieures. Les cuisses antérieures sont renflées.

Il se trouve dans la Carniole méridionale.

73. CHARANSON Zoïle.

CURCULIO Zoilus.

Charançon velu , trompe courbée , élytres striées , mélangées de points noirs , avec une tache commune , noire , vers l'extrémité.

Curculio villosus rostro deflexo , elytris striatis nigro variegatis , puncto majori communi ad apicem.

Curculio Zoilus. SCOP. *Ent. carn.* n°. 103.

Curculio Zoilus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13, p. 1802.

Tout le corps est velu , d'une couleur terreuse en-dessus , avec les côtés & quelques lignes plus pâles sur les élytres. La trompe est courbée , courte. Les élytres sont réunies , striées & mélangées de points noirs : on voit un point plus grand , commun vers l'extrémité.

Il se trouve dans la Carniole.

74. CHARANÇON précocé.

CURCULIO precox.

Charançon ferrugineux , élytres striées , un peu velues.

Curculio ferrugineus , elytris striatis subvillosis. LIN. *Syst. nat. edit.* 13, pag. 1802.

Curculio precox. SCOP. *Ent. carn.* n°. 109.

Tout le corps est ferrugineux , mais la trompe & la tête sont d'une couleur plus obscure. Le corcelet est pointillé. Les élytres sont striées , un peu velues.

Il se trouve dans la Carniole , sur le Saule.

*** *B'évirostre ; cuisses dentées.*

75. CHARANÇON floricole.

CURCULIO floricola.

Charançon noir ; élytres blanches , antennes fauves au milieu.

Curculio niger , elytris incanis , antennarum articulis mediis spadiceis. LIN. *Syst. nat. edit.* 13, pag. 1777.

FUESL. *Archiv. inf.* 5, pag. 86, n°. 93.

Il a environ trois lignes de long , & il ressemble un peu au Charançon du Poirier. Le corps est noir. La trompe est courte. Les antennes sont noires , avec les articles du milieu fauves. Les élytres sont blanchâtres. Les cuisses sont dentées.

Il se trouve . . .

76. CHARANÇON anthracine.

CURCULIO anthracinus.

Charançon noir , un peu raboteux , élytres avec des stries pointillées , cuisses unidentées.

Curculio niger , elytris punctatim striatis , femoribus unidentatis. LIN. *Syst. nat. edit.* 13, p. 1777.

Curculio anthracinus. SCOP. *Ent. carn.* n°. 92.

Tout le corps est noir. La trompe est courte munie de quelques poils à son extrémité. Le corcelet est un peu raboteux ; les élytres sont lisses & ont chacune neuf stries. Les antennes sont légèrement velues.

Il se trouve dans la Carniole.

77. CHARANÇON triste.

CURCULIO tristis.

Charançon noirâtre , élytres raboteuses , légèrement striées , un peu velues.

Curculio fuscus , elytris punctis scabris substriatis villosulis coadunatis.

Curculio tristis. SCOP. *Ent. carn.* n°. 93.

Curculio lugubris. LIN. *Syst. nat. edit.* 13, pag. 1777.

Il ressemble au précédent. Il est aptère , noirâtre. La trompe est courte. Le corcelet est raboteux. Les élytres sont raboteuses , légèrement striées. Toutes les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans la Carniole.

78. CHARANÇON infidelle.

CURCULIO infidus.

Charançon un peu cuivreux , légèrement couvert de poils bleuâtres.

Curculio obsolete cupreus , carulescente villosus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13, p. 1777.

Curculio infidus. SCOP. *Ent. carn.* n°. 94.

Le corps paroît un peu cuivreux , légèrement couvert de poils courts , bleuâtres , luisans. Les yeux sont noirs. La trompe est courte. Les antennes sont fauves , avec la masse noirâtre. Les pattes sont fauves ; toutes les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans la Carniole.

79. CHARANÇON célestin.

CURCULIO caelestinus.

Charançon bleu ; antennes & pattes ferrugineuses.

Curculio totus carulescens , antennis pedibusque ferrugineis. SCOP. *Ent. carn.* n°. 96.

Curculio caelestinus. LIN. *Syst. nat. edit.* 13, p. 1777.

Tout le corps est bleu, avec les antennes & les pattes ferrugineuses. La trompe est courte, & les cuisses sont à peine dentées.

Il se trouve dans la Carniole.

80. CHARANSON carniolique.

CURCULIO carniolicus.

Charanson noirâtre, légèrement couvert de poils glauques, élytres avec des stries pointillées.

Curculio fuscus, glaucescenti villosus, elytris punctato-striatis.

Curculio glaucus. SCOP. Ent. carn. n°. 97.

Curculio carniolicus. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1774.

Il ressemble au Charanson argenté. Tout le corps est noirâtre, légèrement couvert de poils courts, glauques. Les élytres ont des stries pointillées, & sont un peu anguleuses à leur base latérale. Le dessous du corps est noir. Les cuisses sont grossières, luisantes, armées d'une forte dent.

Il se trouve dans la Carniole, sur les feuilles des arbres.

81. CHARANSON de Scopoli.

CURCULIO Scopoli.

Charanson noirâtre, un peu plus velu, antennes & pattes fauves.

Curculio fuscus, villosulus, antennis pedibusque rufis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1777.

Curculio rufipes. SCOP. Ent. carn. n°. 98.

Tout le corps est noirâtre, légèrement velu, un peu luisant. Les antennes & les pattes sont fauves. La tête & le corcelet sont un peu raboteux. Les élytres ont des stries pointillées. Toutes les cuisses sont dentées.

Il se trouve dans la Carniole.

82. CHARANSON de Rœsel.

CURCULIO Roeselii.

Charanson brévirostre; corcelet d'un vert obscur, avec une ligne longitudinale blanche, élytres obscures, avec des lignes élevées.

Curculio thorace obscure viridi: linea longitudinali alba, elytris fusco-fulvis: lineis elevatis sulcatis. LIN. Syst. nat. edit. 13. pag. 1777.

Rœs. Inf. 3. pag. 391. tab. 67. fig. A. B. C. D.

La trompe est grosse, courte, noirâtre. Le corcelet est d'un vert obscur, avec une ligne longitudinale blanche au milieu de sa partie supérieure. Les

élytres sont obscures, avec des lignes élevées, un peu raboteuses.

Il se trouve en Allemagne.

83. CHARANSON religieux.

CURCULIO religiosus.

Charanson noir, luisant, élytres avec de petites taches blanches.

Curculio brevirostris, femoribus omnibus dentatis: ater nitens; elytris albo maculatis. SCHRANK. Enum. inf. aust. n°. 225.

Il ressemble au Charanson germain, pour la forme & la grandeur, mais il est plus noir & plus luisant. La trompe est grosse, le corcelet est légèrement couvert de petits points élevés. Les élytres ont de petits points élevés, & des points blancs, formés par de petits poils courts. Toutes les cuisses sont dentées.

Il se trouve en Allemagne.

CHENILLE, *ERUCA*, mot qui désigne la larve sortie de l'œuf d'un papillon, & qui par des mues & des transformations successives, doit parvenir au même état que l'insecte qui lui a donné le jour. Ce mot désigne en même-temps l'animal peut-être le plus destructeur & le plus industrieux, le plus digne à la fois de la haine de l'économiste agriculteur & de l'observation du naturaliste philosophe. Si notre devoir est de consigner dans ce répertoire universel des sciences, toutes les connoissances acquises, relativement à l'objet que nous avons à traiter; nous ne pouvons que nous louer sans doute, de ce que pour remplir un devoir aussi doux & pour traiter un objet aussi intéressant que celui qui va nous occuper, nous avons à puiser dans les sources les plus pures, à fouiller dans les mines les plus riches; nous devons enfin trouver les interprètes les plus profonds & les plus exacts que la nature ait formé jusqu'à présent pour la contemplation de ses ouvrages. Citer Réaumur & Lyonet, c'est attacher la reconnaissance & la vénération à des travaux dont on ne peut trop apprécier le mérite. L'un, en cherchant à distribuer dans un tableau systématique, les espèces si prodigieusement variées des chenilles, & en nous traçant l'histoire de leurs mœurs, a travaillé autant pour avancer les progrès de la science, que pour reculer les bornes de l'admiration. L'autre plus étonnant peut-être, en nous donnant l'anatomie de l'individu, a confondu, pour ainsi dire, l'admiration elle-même & ne lui a laissé aucunes bornes. Avec le premier on se dit, comment la nature peut-elle présenter une forme aussi simple sous tant d'apparences différentes, & suffire à tant de soins pour manifester une industrie aussi combinée & des mœurs aussi diverses? Avec le second,