

- \* LE CONTE. Catalogue of the Coleoptera of Washington.
  - \* ID. Synonymical notes on North American Coleoptera.
  - \* ID. On Platypsyllidæ a new family of Coleoptera.
  - \* ID. The Classification of the Rhynchophorous Coleoptera.
  - \* LICHTENSTEIN. Le Phylloxera, les cépages américains, les migrations, les pluies. (Messager du Midi.)
  - \* MARTINEZ Y SAEZ. Descriptiones de Coleopteros de España.
  - \* MARTORELL Y PENA. Cuadro sinòptico de las principales variedades de la vid de la zona marítima de la provincia de Barcelona. ☉
- 

### Séance du 27 Octobre 1875.

Présidence de M. EUGÈNE SIMON.

21 membres présents.

*Communications.* M. L. Buquet fait savoir la mort de l'un de nos collègues, M. Jean-Antoine Bianconi, de Bologne, décédé le 21 juillet dernier, qui avait été reçu membre de la Société en 1865.

— M. Desbrochers des Loges envoie les diagnoses de quatre espèces nouvelles de Coléoptères, dont les descriptions *in extenso* paraîtront dans un Supplément à ses Monographies :

1. RHYNCHITES CRIBRUM. — Long. 3-3,5 mill. (rostrum excl.). — Cœruleus ant viridescens, pilis erectis brunneis; rostrum nigro, nitido, capite triplo longiore, subrecto; prothorace subtransverso posterius paulo ampliato obsolete canaliculato, punctis profundis subconfluentibus; elytris

striis profundis, crenato-punctatis, striola juxta scutellari brevi; interstitiis striis angustioribus dense punctatis.

Syrie.

2. AULETOBIUS BECKERI. — Long. 3 mill. — Ater, opacus, griseo-pubescent; rostro capite cum thorace breviori, paulatim ad apicem ampliato; fronte convexissima; antennis submediis articulis 3 primis sat elongatis, minus inflatis; prothorace oblongo, latitudine fere longiori; elytris minus crebre subseriatim punctatis.

Derbent.

3. BALANINUS SYRIACUS. — Long. 3,5 mill. — Subrhomboidalis, angustior, niger, opacus, pube brevi grisea variegatus; rostro brunneo, thorace fere duplo longiori, tenue, nitidissimo, in mare basi distinctius punctato, postice arcuato; antennis basi ferrugineis, brevioribus, articulis funiculi ultimis subtransversis; prothorace breviter subconico; elytris tenuiter striatis, interstitiis coriaceis; femoribus acute dentatis.

Syrie.

4. ANTHONOMUS BAUDUERI. — Long. 3,5 mill. — *A. spiloti* forma et colore fere similis. Rostro regulariter arcuato; antennis articulis 4-ultimis transversis, clava breviter ovata; elytris infra scutellum impressis, tenuiter minime profunde striatis, interstitiis non convexis; femoribus anticis dente mediocri antice emarginato, cæteris dente parvo, instructis; tibiis intus vix sinuatis.

Syrie.

— M. Jules Grouvelle donne lecture d'une lettre de M. L. Bedel contenant quelques détails sur le résultat de ses recherches entomologiques en Algérie. Notre collègue est actuellement à Daya, province d'Oran, avec M. le docteur Munier.

— M. E. Simon montre quelques Coléoptères qu'il a trouvés au Lioran (Cantal). Il signale spécialement : un *Adelops* d'espèce nouvelle et un *Gatops* trouvés ensemble; une *Feronia*, probablement la *cantatica*, et trois *Hydroporus* : le *Davisi*, le *Saunmarki* et l'*Aubei*?

— M. Aug. Chevrolat présente la remarque qui suit :

M. Aug. Sallé m'a fait don dernièrement d'un petit Coléoptère très-