

CAROLI LINNÆI
S Y S T E M A
NATURÆ.

REGNUM ANIMALE

EDITIO DECIMA, 1758,
CURA SOCIETATIS ZOOLOGICÆ GERMANICÆ
ITERUM EDITA.

LIPSIAE
SUMPTIBUS GUILIELMI ENGELMANN
A. MDCCCXCIV.

CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.;

ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.

LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA
NATURÆ

PER

REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,

CUM

*CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.*

TOMUS I.

EDITIO DECIMA, REFORMATA.

~~~~~  
*Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciæ.*

~~~~~  
HOLMIÆ,

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,

1758.

O JEHOVA

Quam ampla sunt Tua Opera!

Quam sapienter Ea fecisti!

Quam plena est Terra possessione Tua!

S:Æ R:Æ M:TIS SUMMÆ FIDEI VIRO
CELSISSIMO ILLUSTRISSIMO *que*
COMITI

D:No CAR. G. TESSIN,

REGIS REGNIQUE SVIOGOTHICI SENATORI,
REGIÆ CANCELLARIÆ PRÆSIDI,
AD AULAM REGIARUM CELSITUDINUM SUMMO
MARESCHALLO,

EDUCATIONI SERENISS. PRINCIPIS GUSTAVI PRÆFECTO,
CANCELLARIO ACADEMIÆ ABOENSIS,
ORDINIS S:Æ R:Æ MAJEST. SERAPHINORUM EQUITI AURATO
ET COMMENDATORI, EQUITI AURATO DE AQUILA NIGRA,
NEC NON OMNIUM S:Æ R:Æ MAJEST. SVECICÆ
ORDINUM CANCELLARIO

SACRUM.

Cum quivis auctor speret se apud posteros gratiam
habere & posse secum duratura nomina educere,
AUCTORI meæ fortunæ Libellum decimo nunc offero;
ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit;
ILLE mihi Stipendium ab Ordinibus regni expetiit;
ILLE mihi spartam Medici classici procuravit;
ILLE mihi Munus, quo fungor, conciliavit;
ILLE mihi Titulum, quo distinguor, paravit;
ILLE me ad Sereniss. Reges introduxit;

*ILLE meas errare boves ut cernis & ipsum
ludere quæ vellem calamo permisit agresti;*

quare

*cana prius gelido defint absinthia ponto
quam immemor vivam*

TANTI MÆCENATIS

Upsaliæ 1757,
d. 24 Maji.

Cultor devotissimus
C. LINNÆUS.

- ceram- 74. *C. oblonga nigra*, elytris testaceis, antennis ferratis.
boides. *Habitat in Europa.*
- murina. 75. *C. oblonga nigra*, elytris pedibusque testaceis.
Habitat in Europa.
- hirta. 76. *C. oblonga villosa nigra*, elytris testaceis.
Habitat in Europa.
- inda. 77. *C. oblonga cyanea*, pedibus longitudine corporis.
M. L. U.
Habitat in India.
Magnitudo Scar. stercorarii. Elytra laevia. Pedes lon-
giores quam in reliquis.
- elongata. 78. *C. elongata atra*, thorace rubro subvillosa.
Habitat in Germania. P. Forstkåhl.
Hæc reliquis longior & admodum angusta ratione con-
generum.

177. CURCULIO. *Antennæ subclavatæ, rostro in-*
fidentes.
Rostrum corneum prominens.

* *Longirostres femoribus simplicibus.*

- Palma- 1. *C. longirostris ater*, thorace ovato planiusculo, elytris
rum. abbreviatis striatis. *M. L. U.*
Rumph. herb. 1. p. 79, 83. t. 17. f. G. Coffus Sa-
guarius.
Pet. gaz. t. 35. f. 5. Merian. furin. t. 48. f. 3.
Habitat in Indiæ Palmis.
Antennæ apice quasi bifariam truncatæ.
- indus. 2. *C. longirostris ater*, thorace subovato excavato-puncta-
to, elytris rugoso-fulcatis, tibiis spinosis. *M. L. U.*
Habitat in India.
Magnitudo præcedentis. Rostrum apice bilobum.
- hemipte- 3. *C. longirostris obscure purpurascens*, elytris abbreviatis
rus. maculatis. *M. L. U.*
Habitat in India.
Thorax lineis tribus nigris longitudinalibus.

- violaceus. 4. *C. longirostris violaceus*, proboscide thoracis longitudine. *Fn. fvec.* 451.
Habitat in Europa.
- Alliariæ. 5. *C. longirostris violaceus totus.*
Fn. fvec. 468. *Curculio nigro-cærulefscens.*
Habitat in Eryfimo Alliaria & affinibus.
- cyaneus. 6. *C. longirostris ater*, elytris violaceis, scutello albo. *Fn. fvec.* 467.
Habitat in Europa, imprimis in Salicibus.
- aterimus. 7. *C. longirostris ater*, elytris nitidis. *Fn. fvec.* 466.
Habitat in Europa.
- Cerafi. 8. *C. longirostris ater*, elytris opacis oblongis. *Fn. fvec.* 465. *It. scan.* 355.
Habitat in foliis Cerafi & Pyri, epidermidem exedens, commaculans.
- acridulus. 9. *C. longirostris piceus*, abdomine ovato. *Fn. fvec.* 463.
Habitat in Europæ plantis tetradynamiæ.
- purpureus. 10. *C. longirostris purpureus nitens.* *Fn. fvec.* 457.
Pet. gaz. t. 22. f. 5. *Scarabæus miniatus minimus.*
List. loqu. 394.
Habitat in Europa.
- frumentarius. 11. *C. longirostris sanguineus.* *Fn. fvec.* 475. (*)
Act. Stockh. 1750. *p.* 186. *n.* 1.
Leuwenh. arc. 168. *aug.* 6. *p.* 83. *f.* 1.
Habitat in Europæ frumento.
- granarius. 12. *C. longirostris piceus oblongus*, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn. fvec.* 462.
Raj. inf. 88. *Scarabæus parvus fordide f. obscure fulvus*, proboscide longa deorsum arcuata.
Habitat frequens in granulis avenaceis, in mercatorum tabernis frequens.
- dorsalis. 13. *C. longirostris*, elytris rubris: futura nigra.
Fn. fvec. 475. *Curculio niger*, elytris in medio rufescentibus.
Habitat in Floribus.

14. *C.*

Curculionum longirostrium larvæ pleraque fructus & semina, brevirostrium vero folia consumunt; variæ etiam caules perforant.

(*) lege: 474. *Vide Emendanda pag.* 824.

- melano-cardius.** 14. *C. longirostris cinereus, coleoptris fascia cordata fusca. M. L. U.*
Habitat in Indiis.
Macula utraque elytra combinans literam V refert.
- Pini.** 15. *C. longirostris, elytris testaceis: fasciis nebulosis. Fn. fvec. 446.*
It. æl. 26. Curculio subfuscus, elytris fasciis duabus testaceis.
Pet. gaz. 14. t. 8. f. 6. Curculio norvegicus.
 β. *Curculio longirostris, elytris macula ferruginea. Fn. fvec. 447.*
Habitat in Pini sylvestris cortice & resina.
Vidi α & β copula junctos. ()*
- Rumicis.** 16. *C. longirostris griseus nigro-nebulosus oblongus, pedibus antennisque subfuscis. Fn. fvec. 454.*
Habitat in Rumicibus Lapathis, folia subtus exedendo maculans.
- Lapathi.** 17. *C. longirostris albo nigroque varius muricatus.*
Habitat in Rumicibus Lapathis.
- cupreus.** 18. *C. longirostris obscure æneus, subtus obscurior.*
Habitat in Europa.
- scaber.** 19. *C. longirostris cinereus, pedibus rufis, elytris scabris.*
Habitat in Europa.
- T.album.** 20. *C. longirostris ater, abdominis lateribus posticisque lacteis.*
Habitat in Westerbothnia. D. Solander.
Major pediculo; ad abdominis latera juxta pectus linea utrinque alba T literam referens.
- Quercus.** 21. *C. longirostris pallide flavus, oculis nigris. Uddm. diff. 25.*
Habitat in Quercus Roboris foliis, inter venas majores subcutaneus, folia maculans. Magnitudo Pediculi.
- arator.** 22. *C. longirostris testaceus, coleoptrorum futura nigra repanda.*
Habitat in Svecia. T. Bergman.
Thorax obscurior lineis 3 flavis. Elytra valde striata & lineis 3 nigris plerumque interruptis.

23. *C.*

(*) Adde: 15 & 49 adeo similes, ut synonyma utrisque communia; esse tamen distinctos, nec sexu tantum differentes, scutellum pluresque notæ suadent. Vide Addenda pag. 824.

- 2-puncta-23. *C. longirostris cinereus*, elytris macula nigra, tibiis flavescens. *Fn. fvec.* 470.
Habitat in Europa.
- 4-maculatus. 24. *C. longirostris nigricans*, coleoptris maculis quatuor albidis.
Habitat in Europa.
- 5-maculatus. 25. *C. longirostris griseus*, coleoptris maculis quinque albidis.
Habitat in Europa.
- pericarpus. 26. *C. longirostris subglobosus nebulosus*, coleoptris macula cordata alba. *Fn. fvec.* 461.
Habitat in Scrophulariis cum sequente.
- Scrophulariæ. 27. *C. longirostris subglobosus*, coleoptris maculis duabus atris dorsalibus.
Fn. fvec. 460. *Curculio subglobosus punctis duobus nigris futuræ longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido.*
List. loqu. 395. *Scarabæus exiguus cinereus*, duabus maculis nigris.
Reaum. inf. 3. t. 2. f. 12.
Habitat in Scrophularia, Verbasco.
Larva viscosa exedit fructus, suosque folliculos substituit.
- vittatus. 28. *C. longirostris*, elytris lineis albis luteisque.
Sloan. jam. 2. p. 210. *Scarabæus curculio proboscide longa deorsum arcuata*, elytris fasciis albis & luteis variegatis.
Habitat in Europa.
- paraplecticus. 29. *C. longirostris cylindricus subcinereus*, elytris mucronatis.
Fn. fvec. 445. *It. scan.* 184. *Curculio fuscus oblongus*, elytris rectis acuminatis.
Habitat in Phellandrio, Sio.
Larva intra caulem sæpe sub aqua hæret. Equis Paraplegiam cauffari creditur.
- algius. 30. *C. longirostris subcylindricus lævis fuscus punctis prominulis adspersus.*
Habitat Algiriæ. E. Brander.

Statura antecedentis; sed postice minus acutus & subcinerascens.

Bacchus. 31. *C. longirostris aureus, rostro plantisque nigris.*
Habitat in Vite.

Betulæ. 32. *C. longirostris, thorace antrorsum sæpe spinoso, corpore viridi aurato, subtus concolore.*
Fn. fvec. 486 (). Curculio cæruleo-viridis nitens, antennis atris.*
Habitat in Betula, Alno.
Alter sexus thoracis spinas habet; alter non.

Populi. 33. *C. longirostris, thorace antrorsum spinoso, corpore viridi ignito subtus subatro.*
Habitat in Populo, Corylo.
Mas thorace utrinque spinoso, Femina vero non.
* * *Longirostres, saltatorii femoribus posticis crassiss.*

Alni. 34. *C. longirostris, pedibus saltatoriis, elytris lividis: maculis duabus obscuris.*
Fn. fvec. 473. Curculio lividus, coleoptris maculis quatuor obscuris.
Habitat in Alno Betulæ.

Salicis. 35. *C. longirostris, pedibus saltatoriis, elytris atris: fasciis duabus albis.*
Habitat in Salicis floribus.

Fagi. 36. *C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore atro, femoribus pallidis. Fn. fvec. 469. It. scan. 111.*
Habitat in Fagi foliis.

Segetis. 37. *C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore piceo, elytris oblongis. Fn. fvec. 464.*
Habitat in agris super spicas.
* * * *Longirostres femoribus dentatis.*

Pomorum. 38. *C. longirostris, femoribus anticis dentatis, corpore griseo nebuloso. Fn. fvec. 458.*
Frisch. inf. 1. p. 32. t. 8. Curculio in floribus arborum.
Habitat in Floribus Pomonæ.

- ovatus. 39. *C. longirostris*, femoribus omnibus dentatis, corpore ovato nigro albo-maculato.
Habitat in Europa.
- carbona-40. *C. longirostris*, femoribus omnibus dentatis, corpore
rius. nigro oblongo, elytris striatis.
Habitat in Europa. D. C. Solander.
- muco-41. *C. longirostris*, femoribus quatuor anterioribus dentatis,
reus. elytris polline flavescentibus supra apicem gibbosis.
M. L. U.
Habitat in India.
- pufio. 42. *C. longirostris*, femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris nigris striatis linea repanda grisea. *M. L. U.*
Habitat in Indiis.
Linea grisea repanda in fngulo elytro longitudinaliter excurrit.
- vaginalis. 43. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris striatis: tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis. *M. L. U.*
Habitat in America, Surinami.
Thoracis fossula pro rostro. Elytrorum striæ ex punctis cavis villosis.
- stigma. 44. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris macula ferruginea. *M. L. U.*
Habitat in Indiis.
Fossula inter pedes pro rostri receptione, ut in antecedente.
- depressus. 45. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace depresso lateribus obtuse angulato. *M. L. U.*
Habitat in America.
Corpus griseum punctis nigris glabris prominulis.
- annula-46. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace elytrisque
tus. fasciis linearibus nigris. *M. L. U.*
Habitat in Indiis.
Thorax linea unica, elytra duabus cinguntur; oculi annulo albo.
- dispar. 47. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris emarginatis rubro-striatis. *M. L. U.*
Habitat in Indiis.

Antennæ filiformes. Corpus nigrum. Femina rostro brevi valide forcipato.

- anchora-48. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris flavo strigatis, thorace elongato. *M. L. U.*

Habitat in Indiis.

Thorax longitudine sæpe abdominis, unde structura singularis, & rostrum longitudine thoracis.

- Abietis. 49. *C. longirostris*, elytris fuscis: fasciis duabus linearibus interruptis griseis; femoribus dentatis.

Fn. fvec. 447. It. æl. 26. C. subfuscus.

Pet. gaz. 14. t. 8. f. 6. C. norvegicus.

Habitat in Pini sylvestris Cortice & resina.

- germanus. 50. *C. longirostris*, femoribus subdentatis, corpore ovato nigro punctis testaceis adsperso.

Habitat in Germania. P. Forstkåhl.

Inter maximos Europæos. Rostrum crassiusculum. Thorax subrotundus utrinque punctis 3 ferrugineis. Coleoptra abdomen tegentia, ovata, nigra punctis ferrugineis adspersa. Femora postica obsolete dentata; anteriora 4 mutica cum rudimento dentis. Similis C. pini.

- Nucum. 51. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore griseo longitudine rostri.

Uddm. diff. 24. Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis.

Ræf. inf. suppl. 385. t. 67. f. 5. 6.

Habitat in Nucibus Coryli Avellanæ.

- 5-puncta-52. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris futura alba, tus. maculisque duabus.

Habitat in Europa.

- hispidus. 53. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore fulcato adsperso squamis erectis.

Habitat in Europa.

- rectiro-54. *C. longirostris*, femoribus dentatis, rostro rubro, elytris obsolete fasciatis.

Habitat in Europa.

- pedicula-55. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore rubro, rius. elytris albido-subfasciatis.

Habitat in Europa.

* * * * *Brevirostres femoribus dentatis.*

Ligustici. 56. *C. brevirostris*, femoribus subdentatis, abdomine subovato murino.

Habitat in Ligustico Levistico.

Pyri. 57. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, æneo-fuscus. *Fn. fvec.* 449.

Fn. fvec. 455. *It. scan.* 355. *Curculio viridis opacus*, pedibus antennisque magis fuscis.

Habitat in Pyri foliis.

oblongus. 58. *C. brevirostris oblongus*, femoribus dentatis, antennis elytris pedibusque ferrugineis.

Habitat in Svecia. D. C. Solander.

Magnitudo Dermestidis.

argenta- 59. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, corpore viridi arg-
tus. gentato. *Fn. fvec.* 449.

Fn. fvec. 459. *Curculio femoribus omnibus denticulo notatis*, corpore viridi oblongo.

Habitat in Europæ Urtica.

ovatus. 60. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, abdomine ovato nigro, pedibus antennisque rufis.

Habitat in Europa.

cervinus. 61. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, antennis basi rufescentibus.

Habitat in Europa.

* * * * * *Brevirostres femoribus muticis.*

argyreus. 62. *C. brevirostris*, femoribus submuticis, corpore toto viridi-argenteo-aureoque maculato. *M. L. U.*

Habitat in Indiis.

Facies C. argentati. Sub femoribus primoribus spina obsoleta.

viridis. 63. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore viridi supra obscuro, subtus flavidiore.

Habitat in Europa.

Magnitudo & statura C. Pyri, supra totus e viridi fuscus, subtus e flavo viridis, quo colore etiam latera elytrorum lucent. Antennæ & Pedes nigri.

- specio- 64. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore luteo viri-
fus. di-nitente, elytris spinis sparsis. *M. L. U.*
Habitat in Indiis.
Elytra singula in dorso protuberant spinis quinque.
- ruficor- 65. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore atro, tho-
nis. race bituberculato, antennis rubris.
Habitat in Europa.
- albinus. 66. *C. brevirostris niger*, fronte anoque albis, thorace tu-
berculato.
Uddm. diff. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tri-
bus, elytrorum sex.
Habitat in Europa.
Color fere Curculionis Lapathi.
- lineatus. 67. *C. brevirostris griseus*, thorace striis tribus pallidioribus.
Fn. fvec. 450.
Habitat in Europa.
- incanus. 68. *C. brevirostris cinereus oblongus*, elytris obtusiusculis.
Fn. fvec. 452.
Habitat in Europa.
- cloropus. 69. *C. brevirostris niger*, antennis tibiisque ferrugineis.
Habitat in Europa.
Magnitudo Pulicis.
- rufipes. 70. *C. brevirostris cinereus oblongus*, pedibus rufis. *Fn.*
fvec. 483. ()*
Habitat in Europa.
- nebulo- 71. *C. brevirostris oblongus canus*, elytris fasciis obliquis
fus. nigris.
Fn. fvec. 448. Curculio albo nigroque varius, prob-
ficide planiuscula carinata thoracis longitudine.
Frisch. inf. 11. p. 32. t. 23. f. 3.
Habitat in Europa.
- ater. 72. *C. brevirostris oblongus ater*, antennis rufis.
Habitat in Europa.
- emeritus. 73. *C. brevirostris niger*, thorace elytrisque spinosis, fron-
te excavata. *M. L. U.*
Habitat in Indiis.

Facies tristis aranei. Elytra adspersa verrucis pilosis. Abdomen multum elytris tectum.

barbarus. 74. *C. brevirostris ater, thorace subspinoso, elytris angulo duplici crispato.*

Habitat Algeriæ. Brander.

Magnitudo fere Scarabæi stercorarii. Corpus totum aterimum. Caput, Thorax, Pectus, Pedes punctis excavatis adspersa. Elytra coalitavix dehiscunt, ad latera inferiora punctis gibbis adspersa; supra in singulo lineæ duæ elevatae punctis muricatae. Thorax varie excavatus, ad latera quasi spina rotundata utrinque notabilis.

cornutus. 75. *C. brevirostris cinereus, thorace elytrisque subspinosis, capite cornuto. M. L. U.*

Habitat in Indiis.

Caput angulo utrinque supra antennis & alio utrinque supra basin; elytra quasi echinata punctis cum fasciculo pilorum adjecto.

16-punctatus. 76. *C. brevirostris cærulefcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris duodecim. M. L. U.*

Habitat in Indiis.

Magnitudo Crabronis. Caput fulco notatum. Abdomen etiam subtus una alterave macula nigra.

granulatus. 77. *C. brevirostris viridis striatus punctis nigris elevatis. M. L. U.*

Habitat in Indiis.

Magnitudo Scar. stercorarii.

abbreviatus. 78. *C. brevirostris subfuscus, elytris griseis: striis atris glabris elevatis abbreviatis. M. L. U.*

Habitat in Indiis.

Elytra griseo vellere quasi obducta præter strias & margines.

chinesis. 79. *C. brevirostris griseus, elytris abbreviatis, antennis perctinatis, podice albo.*

Habitat in Pisis omnis generis, e China allatis.

apterus. 80. *C. brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato.*

Habitat in India. De Geer.

Maxi-

Maximus. Thorax punctatus cruce quasi inustus. Abdomen fubtus trifariam rubro punctatum. Corpus nigrum.

178. ATTELABUS. Caput postice attenuatum, inclinatum.

Antennæ apicem versus crassiores.

- Coryli. 1. *A. niger*, elytris rubris.
Fn. fvec. 476. *It. æl.* 153. Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato.
Habitat in foliis Coryli, quæ in cylindrum convolvit & utrinque claudit.
- furina- 2. *A. elytris apice bidentatis.*
 mensis. *Habitat Surinami. Rolander.*
Similis A. pensylvanico, minor A. coryli. Caput & Thorax nigra. Antennæ albo fuscoque annulatæ. Pedes ferruginei: Femora annulo baseos albo. Elytra fusca, striata, apice bidentata.
- pensyl- 3. *A. niger*, elytris rubris: fascia media apicisque nigro.
 vanicus. *Habitat in Philadelphia. Kalm.*
Statura præcedentis omnino, sed alius & minor. Caput depresso, nigrum, postice elongatum, maxillis rufis. Antennæ filiformes, obtusæ, basi flavescentes. Thorax oblongus, niger, glaber. Elytra rufa, fascia in medio nigra & alia ad apicem. Pedes rufi.
- Betulæ. 4. *A. pedibus saltatoriis, corpore toto atro.*
Habitat in Betulæ foliis, quæ pulchre crispa rodendo red- dit. Rolander.
- formica- 5. *A. niger*, elytris fascia duplici alba basi rubris. *Faun.*
 rius. *fvec.* 477.
Jonst. inf. ... t. 15. *Lift. mut. t.* 31. f. 1.
Raj. inf. 103. n. 29.
Habitat in Europa.
- sipylus. 6. *A. viridis*, elytris fascia duplici flava interrupta, thorace hirsuto. *M. L. U.*

Habitat in Sipylo. Hasselqvist.

Statura & magnitudo A. formicarii.

apiarius. 7. *A. cærulefcens*, elytris rubris, fasciis tribus nigris.

Svamm. bibl. . . t. 26. f. 3. Reaum. inf. 6. t. 8. f. 10.

Habitat in Germania. P. Forskåhl.

Facies A. formicarii, sed duplo major. Corpus totum atro-cærulefcens, sed Caput & Thorax pilis nigris pubescentia. Pectus & Abdomen nitidius cærulefcencia, ut & Femora postica, quæ longiora. Elytra rubra, fasciis tribus margine repandis atris; quarum prima vix marginem lateralem attingit; postrema in ipso apice elytri, cærulefcens. Antennæ nigræ, clavatæ.

mollis. 8. *A. griseus pubescens*, elytris fasciis tribus pallidis.

Uddm. diff. 28. t. 1. f. 9. Curculio oblongus ruber, elytris nigris: fascia triplici albicante.

Habitat in Europa.

Ceram- 9. *A. ater*, elytris rugosis.

boides. *Uddm. diff. 26. t. 1. f. 1. Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.*

Habitat in Boleto fomentario.

Bupre- 10. *A. ater*, elytris nervosis, thorace subglobofo.

stoides. *Fn. spec. 554. Buprestis ater.*

Habitat in Europa.

179. CERAMBYX. *Antennæ attenuatæ.*

Thorax spinosus aut gibbus.

Elytra linearia.

* *Thorace spinis lateralibus mobilibus.*

longima- I. *C. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longioribus.*

Sloan. jam. 2. p. 209. Scarabæus Capricornus maximus nigricans, fasciis elytrorum coccineis & flavis.

Grew. mus. 163. t. 13.

Merian. furin. t. 28.

Vincent. mus. t. 1. fig. infim. media.

Ræf. inf. 2. scarab. 2. p. 11. t. 1. f. a.

Habitat in America.

In altero sexu tibiæ anticæ longissimæ, ut in Scar. longimano.

EMENDANDA.

pag.	lin.		lege	operæ.	pag.	§.	1.	f.1,8 leg. f. 1,2.
3	—	22 opere	—	in interiori.	233	—	1.	296 — 269.
4	—	2 interiore	—	humeros.	347	—	13.	t. 13 — t. B.
41	§.	3 humores	—	garruli.	399	—	30.	3 9 — 349.
101	—	ult. garrulæ	—	iride.	353	—	59.	377 — 357.
109	—	6 viridi	—	lobata.	369	—	3.	419 — 414.
148	—	5 tobata	—	CÆCILIA.	373	—	40.	533 — 535.
196	—	112 COECILIA	—	breviore.	378	—	11.	47 — 474.
204	—	*** longiore	—	colubrinus.	381	—	32.	486 — 456.
228	—	198 colubrina	—	ovipari.	385	—	70.	483 — 453.
238	—	4 vivipari	—	Palpi semicordati.	419	—	5.	78 — 901. f. 1.
242	—	175 Palpi	—	Libellula.	427	—	11.	1,4 — t. 4.
343	—	206 Libella	—	Mutilla.	489	—	1.	5.B.5. — 1.B.5.
		219 Mutella	—	auratus.	490	—	6.	pap.9. — pap. 10.
253	—	54 opacus	—	deleatur.	504	—	40.	2.a.2. — 2.a.1.
359	—	39 Fn. fv. 539	—	deleatur.	520	—	133.	1.6.8. — 1.B.8.
374	—	54 cæruleo	—	ignita.	522	—	145.	24 — 42.
408	—	3 gnita	—	apterus.	775	—	621.	t.8.f.D. — t.7.f.C.
431	—	38 aptera	—	feticornis				
508	—	63 DeGeercitatio	—	spirlinguis.				
510	&	511 feticornis	—	MYA.				
645	—	269 MYES	—	spithamea.				
648	—	247 spithama	—	aculeatum.				
679	—	62 muricatum	—	farcta.				
703	—	199 fareta	—	testaceo.				
720	—	297 testacea	—					

ADDENDA.

- 209 §. 40 Pet. gaz. 1. t. 1. f. 1.
 346 — 9 Fn. fvec. 342.
 371 — 27 Fn. fvec. *refer ad* 28.
 390 — 11 Frisch inf. 13. t. 8.
 46 — 9 Fn. fvec. 9.
 367 — 20 hæc a n. 31. *figuris distingui nequit, ideoquo synonyma utrisque communia, forte ambæ tantum sexu differunt.*
 379 — 15 & 49. *adeo similes, ut synonyma utrisque communia; esse tamen distinctos, nec sexu tantum differentes, scutellum pluresque notæ suadent.*



APPENDIX

editionis decimæ,
 iteratæ a. MDCCCXCIV.
Errata Linnæi.

Pag.	10	lin.	24	fuffocans	lege	fuffocans.
»	28	»	6	capilliceo	»	capillitio.
»	»	»	29	Cynamolgos	»	Cynomolgos.
»	40	»	3	fuspiciociffimus	»	fuspiciofiffimus.
»	»	»	26	recti	»	rectæ.
»	41	»	13	helvulo	»	helvolo.
»	»	»	19	Fons	»	Frons.
»	»	»	34	peffimus	»	peffimum.
»	49	»	35	Athletis	»	Athletis.
»	50	»	17	humores	»	humeros.
»	»	»	20	Rotuberantia	»	Protuberantia.
»	51	»	21	Ungulis	»	cingulis.
»	62	»	32	duriffimas	»	duriffimos.
»	63	»	6	bractiis	»	brachiis.
»	67	»	26	Oeftra	»	Oeftri.
»	68	»	20	ex		<i>deleatur.</i>
»	73	»	1	& 2 Bellua	lege	Belluæ.
»	74	»	1	»	»	»
»	»	»	27	amphibus	»	amphibius.
»	77	»	1	Balæna	»	Phyfeter.
»	79	»	40	Struthione	»	Struthioni.
»	»	»	penult.	fpinofi	»	fpinof.
»	80	»	22	arbuftarum	»	arbuftorum.
»	83	»	12	Ramphastos	»	Rhamphastos.
»	84	»	15	Columbus	»	Colymbus.
»	»	»	19	Rhyncops	»	Rhynchops.
»	86	»	12	videfis	»	vide fis.
»	87	»	19	Perenopterus	»	Percnopterus.
»	88	»	22	4. cera	»	4. F. cera.
»	89	»	21	munita	»	munitus.
»	92	»	15	ruffo	»	rufo.
»	101	»	35	39	»	29.
»	»	»	40	longævæ	»	longævi.
»	102	»	28	brachiurus	»	brachyurus.
»	103	»	21	Ramphastos	»	Rhamphastos.
»	104	»	1	»	»	»
»	106	»	8	fufca	»	fufcus.
»	110	»	1 & 2	Paradifæa	»	Paradifea.
»	113	»	32	8. viridis	»	8. P. viridis.
»	117	»	30	delineatos	»	delineatas.
»	138	»	1 & 2	Rynchops	»	Rhynchops.

Pag. 139	lin. 18	linqua	lege lingua.
» 143	» 20	ruffis	» rufis.
» 144	» 36	pelufcum	» Pelufium.
» 149	» 9	Ocrophus	» Ochropus.
» 153	» 36	grifea	» grifeus.
» 172	» 36	eryocephala	» erythrocephala.
» 193	» 19	europæe	» europææ.
» 195	»	penult. arcato	» arcuato.
» 196	» 7	e caudatum	» ecaudatum.
» 205	» 29	Stincus	» Scincus.
» 209	» 20	eundem	» idem.
» 211	»	penult. Teftidine	» Teftudine.
» 224	» 31	cærulefente	» cærulefcente.
» 227	» 5	Arges	» Argus.
» 231	» 23	Oxyrinchus	» Oxyrhynchus.
» 233	» 21	fub triangulari	» fubtriangulari.
» 236	» 15	Callorynchus	» Callorhynchus.
» 241	» 7	vaguntur	» vagantur.
» 261	» 8	Neucrates	» Naucrates.
» 266	» 7	cirri	» cirris.
» 279	» 21	faciis	» fafcis.
» 282	» 22	Siciliam	» Sicilia.
» 311	» 17	Oxyrinchus	» Oxyrhynchus.
» 314	» 25	Bellone	» Belone.
» 341	» 11	Hæmiptera	» Hemiptera.
» 342	» 11	Palpi	» Palpi femicordati. (Vide Emendanda pag. 824).
» 344	» 20	Mutella	» Mutilla.
» 349	» 25	rhombæo	» rhombeo.
» »	» 26	359	» 349 [?] (Vide Emendanda pag. 824, lin. 6).
» 351	» 37	cinereus	» cinereum.
» 352	» 6	duris	» dunis [?]
» 353	» 2	opacus	» auratus. (Vide Emendanda pag. 824).
» 355	» 30	poligraphus	» polygraphus.
» 369	» 6	vulguri	» vulgari.
» 373	» 7	Fn. fvec. 539	» deleatur? (Vide Emendanda pag. 824, lin. 17).
» 385	» 21	cloropus	» chloropus.
» 386	» 9	coalitavix	» coalita vix.
» 405	» ult.	Eateris	» Elateris.
» 407	» »	larvis	» larvæ.
» 412	» 22	erythrocephalus	» erythrocephalus.
» 421	» 13	Scaff.	» Schæff.
» 422	» 2	erythropterus	» erythropterus.
» 450	» 4	impositi	» impositæ.
» »	» »	cærulei	» cæruleæ.
» 463	» 28	imaculatis	» immaculatis.
» 466	» 5	Terpficore	» Terpfichore.
» 474	» 6	Meræ	» Mæræ.
» 475	» 14	obfoletæ	» obfolete.
» 512	» 2	feticornis	» fpirilinguis.
» 542	» 10	ocelto	» ocello.
» 543	» 34	gymnopterorum Larvis	» gymnopterorum, Larvæ.

Pag. 559	lin. 7	erythrocephalæ	lege erythrocephalæ.
» 560	» 25	cærulefente	» cærulefente.
» 564	» »	infeta	» infeta.
» 597	» 5	Cemiteriorum	» Cœmiteriorum.
» 600	» 14	Arnices	» Arnicæ.
» »	» 26	95. antennis	» 95. M. antennis.
» 611	» 6	»	» in.
» 633	» 23	ferrato-dontatus	» ferrato-dentatus.
» 670	» penult.	Myes	» Myæ.
» 671	» 1	Myes	» Mya.
» 708	» penult.	quis crederet	» quis non crederet.
» 722	» 27	cærulefente	» cærulefente.
» 761	» 32	Mediterrano	» Mediterraneo.
» 767	» 13	bidendata	» bidentata.
» 769	» 38	volæmanus	» volæ manus.
» 770	» 24	nigricans	» nigricante.
» 771	» 30	flavescens	» flavescente.
» 786	» 30	orbicula	» orbiculata.
» 799	» 26	ocracea	» ochracea.
» »	» 35	Testa	» Testæ.
» 819	» 5	rachios	» racheos.
» 820	» 28	subrotundi	» subrotundæ.
» »	» 29	sparsi	» sparsæ.
» 822	» 3	curculioides	» curculionoides.
» 823	» 18	513	» 531.
» 824	» 5	41	» 50.
» »	» 6	399	» 349. [?]
» »	» »	3.9	» 359. [?]
» »	» 7	59	» 58.
» »	» 10	47	» 475.
» »	» 13	242	» 342.
» »	» 16	253	» 353.
» »	» 17	359	» 373 [?]
» »	» 20	38	» 39.
» »	» 34	20	» 21.

